B. RUYS

KWEEKERIJ „MOERHEIM" Dedemsvaart.

Catalogus 1902

Voorwaarden en Opmerkingen.

PRIJZEN.

De prijzen, in dezen Catalogus genoemd, doen die van vorige opgaven vervallen. Alle artikelen worden aangeboden voor zoover zij bij ontvangst der bestellingen disponibel zijn.

Bij bestelling van zaden geldt de prijs, welke per 5 ons is genoteerd voor minstens 2½ ons; voor minder dan een half ons wordt de prijs per lood berekend. Bij planten, heestergewassen, enz. geldt de prijs per 100 voor minstens 25 stuks, per 10 voor minstens 5 stuks.

Voor grootere hoeveelheden dan in dezen Catalogus worden aangeboden, gelieve men prijsopgaaf aan te vragen.

BESTELLINGEN.

Alle bestellingen worden zoo spoedig mogelijk, doch naar volgnummer uitgevoerd. Eene opeenhooping van bestellingen in het voorjaar maakt het dikwijls onmogelijk om ze alle onmiddellijk uit te voeren, waarom een tijdige inzending niet genoeg kan worden aanbevolen.

Ingeval de uitvoering niet onmiddellijk kan plaats hebben, ontvangt men eene gedrukte kennisgeving. Bij nabestellingen gelieve men, zoo mogelijk den juisten datum op te geven van de vorige bestelling, daar het anders veel tijd en moeite kost om die te vinden en verwarringen daarvan het gevolg kunnen zijn.

Om abuizen te voorkomen gelieve men een zeer duidelijke opgave van de verlangde artikelen te doen, en daarvoor de **Bestellijst te gebruiken, die hierbij is ingesloten.** Men gelieve echter **de prijzen niet in te vullen, en brieven of mededeelingen op een afzonderlijk blaadje te schrijven,** daar deze Bestellijst dan bij de goederen als nota kan worden terruggezonden. Duidelijke opgaaf van naam en woonplaats is zeer gewenscht.

VERPAKKING.

Verpakking wordt zoo billijk mogelijk berekend en alleen dan teruggenomen wanneer de terugzending franco plaats heeft binnen één maand na de levering en met duidelijke vermelding van het adres van den afzender. Hiervoor wordt dan de helft van het in rekening gebrachte bedrag van de nota afgetrokken.

VERZENDING EN VRACHT.

De verzending geschiedt voor rekening en risico van den besteller en, tenzij daaromtrent bepaalde voorschriften zijn gegeven, op de mij meest geschikt voorkomende wijze.

Voor zoover niet van den postpakketdienst kan worden gebruik gemaakt, verdient het aanbeveling de locale middelen van vervoer op te geven.

Men heeft mij dikwijls verzocht om de bestellingen franco te verzenden, doch ik zou dit niet kunnen doen zonder de prijzen der zaden en planten aanmerkelijk te verhoogen, hetgeen natuurlijk ten nadeele der bestellers zou zijn. Ik ben evenwel bereid om als eene **tegemoetkoming in de vracht, bij elke bestelling van zaden, gratis eenig bloemzaad, en bij elke bestelling van planten en heesters, gratis eenig bloemzaad of eenige vaste planten of knolgewassen,** (alles naar mijne keus) te voegen.

BETALING.

Over het bedrag der facturen wordt gewoonlijk na drie maanden beschikt, tenzij een andere tijd van betaling is overeengekomen. Voor bedragen boven f 10.— ontvangt men, alvorens daarover gedisponeerd wordt, eene gedrukte kennisgeving. Met toezending van het bedrag per postwissel, zal men mij echter zeer verplichten en kunnen de kosten van overmaken van de rekening worden afgetrokken. Deze bedragen voor sommen van f 5.— en minder 2½ cent; van f 5.— tot f 12.50, 5 cents; van f 12.50 tot f 25.—, 10 cents enz. Gemakshalve wordt bij de meeste nota's een postwissel-formulier ingesloten, om deze wijze van betaling gemakkelijk te maken, terwijl ze mijne administratie vereenvoudigt. Men gelieve dezen maatregel evenwel niet als eene aanmaning tot betaling te beschouwen.

Van ingekomen postwissels wordt terstond per kaart bericht van ontvangst gezonden. Voor zeer kleine sommen worden ook postzegels in betaling aangenomen.

PROVISIE.

Aan Tuinbazen worden de gebruikelijke voordeelen toegekend, mits zij mij hun adres opgeven. Van Turfstrooisel, snoeimessen, étiquetten, enz. wordt geen provisie berekend.

VERANDERING VAN WOONPLAATS.

Opdat mijne Catalogi en Prijscouranten steeds geregeld kunnen worden toegezonden, wordt men beleefd verzocht mij elke verandering van vaste woonplaats mede te deelen.

BUITENLANDSCHE ORDERS.

Zendingen naar het buitenland worden met de meeste zorg verpakt in overeenstemming met den duur der reis.

Bij bestellingen uit Oost- en West-Indie, Transvaal enz. gelieve men het bedrag, vermeerderd met 20% voor emballage en frankeerkosten bij de bestelling te voegen.

KLACHTEN.

Wanneer, niettegenstaande de meest nauwlettende zorg, het een of ander door mij geleverd artikel reden tot klagen mocht geven, wordt men vriendelijk verzocht mij daarvan ten spoedigste in kennis te stellen, ten einde zoo mogelijk de oorzaak der klachten weg te nemen.

Men vindt mij ook steeds bereid, om, waar door toevallige omstandigheden iets van het gezondene mocht mislukken, dit naar billijkheid te vergoeden, zonder dat dit evenwel recht geeft tot korting op de rekening.

Uitnoodiging aan mijne begunstigers!

Belangstellenden worden beleefd tot een bezoek aan mijne kweekerijen uitgenoodigd.

Indien men van dezen Catalogus zelf geen gebruik mocht maken, zoo wordt men beleefd verzocht dien dan aan anderen ter inzage te verstrekken of af te staan.

Door het mededeelen van adressen van aan mij onbekende belangstellenden, zal men mij bijzonder verplichten.

DEDEMSVAART, Januari 1902.


B. RUYS.

Telegram-Adres: „MOERHEIM" — DEDEMSVAART.

Afdeeling I. ZADEN.

A. Groentezaden.

Voortreffelijke nieuwe groente van eigen teelt.



STOKSNIJBOON


Moerheim's Suikerslagzwaard

zonder draden.

Deze prachtige nieuwe stoksnijboon, die vóór twee jaren door mij in den handel werd gebracht, is thans reeds overal bekend en verspreid. Ik kan haar weer met vol vertrouwen aanbevelen, daar hare voortreffelijke eigenschappen haar tot de beste snijboon maken, zoowel voor den groenen pluk als voor de inmaak. Zij is buitengewoon rijkdragend en een ieder die haar heeft geproefd, zal moeten toegeven dat haar smaak die van alle andere soorten overtreft, terwijl de totale afwezigheid van draden of harde plekken een onschatbaar voordeel opleveren en men nog van deze boon kan plukken, wanneer de andere soorten reeds lang hard zijn geworden.

Per ons f 0.15, p. 5 ons f 0.60.

Nieuwe en in het vorige jaar ingevoerde Groentezaden.



Bieten, *karmijnroode Kogel.*

BIETEN, karmijnroode Kogel,

Deze nieuwe soort onderscheidt zich van alle andere ronde bieten door de zuivere prachtige donker karmijnroode kleur.

De schoone kogelronde vorm en de geheel gladde huid, geven haar een mooi aanzien en hare snelle ontwikkeling, zoowel als hare vroege rijpheid, zijn voor den groentenkweeker van zeer veel waarde, zoodat deze soort zonder twijfel zeer spoedig opgang maken zal.

Per pakje f **0 25.**

DOPPERS „Riesenkind."

Dit is een merkwaardige nieuwigheid die uit Duitschland tot ons komt. Men poot in goeden bodem ongeveer half Maart de erwten op 1 Meter afstand onderling, en plaatse bij elk een stevigen stok. Men kan dan de eerste week of zes daartusschen andere groenten verbouwen, maar dan begint de hoofdstam zich op eene ongeloofelijke wijze te ontwikkelen. Ze bereikt een omvang van 5—7 cM. en brengt, terwijl ze zelf op eene hoogte van ongeveer 80 cM. begint te bloeien, nog 4—10 bijna even sterke stengels voort, die alle op 1 Meter hoogte eveneens bloeien met trossen van 15—20 bloemen, terwijl deze laatste natuurlijk later rijp zijn dan die van de hoofdstam. Deze doorbloeiende erwtenboom, die zooals de afbeelding vertoont een wonderlijk effect maakt en welks erwten, wat de smaak aangaat, zeer door den Duitschen kweeker worden geroemd, zal juist door zijn merkwaardigen groei veel opgang maken.

Per pakje f **0.25.** (1/2 ons.)


DOPPERS „Thomas Laxton."

Zeer vroege prachtige Doperwt, uit Engeland ingevoerd. De tamelijk groote lichtgroene, gerimpelde erwten zijn van een heerlijken smaak. Zeer rijkdragend en bijzonder aan te bevelen.


Hoogte ongeveer 1 Meter.

Dit is de vroegste van alle gekreukelde doperwten. (Voor afbeelding zie Catalogus 1901.)

Per ons f **0.30**, per 5 ons f **0.90**.



Doppers „Riesenkind."



Witte Kool, allervroegste ronde Reuzen.

WITTE KOOL

allervroegste ronde Reuzen.

Deze nieuwe koolsoort brengt reeds in Juli reusachtige stevige koolen voort, en is dus een zeer groote aanwinst, daar alle andere vroege soorten slechts zeer kleine kooltjes geven. Bovendien zijn ze zeer fijnbladerig en zacht en nemen ze bij het inmaken een schoone goudgele kleur aan. Buitengewoon goede soort.

Per pakje f **0.25**.


Roode Kool

Erfurter Zwartkop.

Dit is de donkerste tot nu toe bekende roode koolsoort. De koolen zijn glimmend zwart, stevig en zwaar. Van binnen zijn ze donkerblauw, bijna zwart. Zeer aan te bevelen.

Per pakje . . . . f **0.25**.

SPRUITKOOL, Extra lage van LYON.




Spruitkool, Extra lage van Lyon.

De Fransche kweeker dezer nieuwigheid zegt, dat er tot nog toe geen enkele soort Spruitkool in de handel is gebracht, die zoo laag en zoo regelmatig van groei is.

Door haren lagen groei heeft zij een groote gehardheid tegen de strengste koude; hare opbrengst is overvloedig want de spruitjes zijn talrijk en vast.

Per pakje . . . . f **0.35**.

MELOEN (Cantaloupe) „Corallenriff".




Meloen (Cantaloupe) „Corallenriff".

Deze vroegrijpende Meloen, die een zwaarte bereiken kan van 7 kilo, heeft de schil, die van donkergroen langzaam verandert in oranjegeel, geheel bezet met grillige, hoekige uitwassen van een witte of gele kleur, zooals de afbeelding ook te zien geeft. Het vleesch is vast, groenachtig geel en van een zeldzaam heerlijke geur en smaak.

Per pakje . . . f **0.45**.

KROPSALADE, Matador.



Kropsalade, Matador.

Eene broeisalade van den eersten rang met enorm groote en buitengewoon vaste uiterst malsche kroppen wordt hiermede in den handel gebracht. Een zeer fijne smaak en een groot weerstandsvermogen zijn de beste voortreffelijkheden dezer ook als winter- en vollegrondssalade uitstekende soort.


Per pakje . . . . f **0.45**.

SCHORSENEEREN

VULCAN.

Deze uit Spanje ingevoerde soort is door haren korten afgestompten vorm en door hare koolzwarte, gladde wortels zeker eene uitstekende verbetering der oude lange.

Per pakje . . . . f **0.25.**




Schorseneeren, Vulcan.

TOMAAT „PHÄNOMEN.

Deze vroege soort, die uit Zuid-Rusland afkomstig is, is van een bijzondere vruchtbaarheid. De tamelijk groote struiken zijn van boven tot beneden geheel bezet met regelmatig gevormde vruchten. Deze zijn niet groot, geheel glad, bijna rond en van een karmijnroode kleur. Het vleesch is zeer smaakvol en geurig.

Per pakje . . . . f **0.20.**



Tomaat „Phänomen".

TOMAAT „Deensche Export".

Ofschoon deze niet tot de nieuwigheden kan worden gerekend, heb ik toch gemeend den liefhebbers dezer meer en meer gezochte vruchten geen ondienst te doen, met dezelve hier aan te bieden. Zij wordt in Denemarken op groote schaal in den vollen grond gekweekt en kan door hare groote vruchtbaarheid en buitengewone gehardheid tegen ongunstig weer niet genoeg worden aanbevolen. Duizenden van deze soort worden daar jaarlijks uitgevoerd en zijn op de buitenlandsche markten zeer gezocht.

Per pakje . . . . f **0.15.**

Collectiën Groente- en Bloemzaden

voor **Oost- en West-Indië, Transvaal** en andere overzeesche gewesten, worden op verlangen gaarne gereed gemaakt overeenkomstig het klimaat, waarvoor ze bestemd zijn. De zaden worden met de meeste zorg ingepakt in een blikken kist, die weer in een houten kist wordt geplaatst. De kosten daarvan, evenals de vooruitbetaalde vracht, worden natuurlijk in rekening gebracht.

Door uitbreiding van den Postpakket-dienst en verlaging der tarieven, behoeven de kosten niemand te weerhouden om zijne zaden direct uit het moederland te betrekken.

Gemakshalve zijn onderstaande soorten zooveel mogelijk alphabetisch gerangschikt; aan het eind der lijst van Groentezaden vindt men de zaden van keukenkruiden enz.

N.B. 1 lood of decagram = 10 gram.
1 ons of hectogram = 10 lood = 100 gram.

ANDIJVIE.


Andijvie verlangt, evenals de meeste bladgroenten, een flink gemesten grond. De gekruld-bladerige soorten zijn het meest geschikt om als salade te worden gebruikt. Zaai een weinig van de vroege soorten voor de eerste maal half April. Zoo vroeg gezaaid schiet de andijvie echter dikwijls door; dit voorkomt men door niet vóór half Juni te zaaien. De latere soorten zaaie men half Juni—Juli. Men plant de andijvie op een voet afstands onderling; zoodra de planten volgroeid zijn, bindt men ze op en na omstreeks 14 dagen zijn ze voor 't gebruik geschikt.

p. lood
Andijvie, echte vroege krop . . . . f 0.10

Deze heeft reeds uit zichzelf neiging tot kroppen, toch is het opbinden niet geheel overbodig.

p. lood
Andijvie, fijne zomerkrul . . . . f 0.10

Wordt veel gebruikt voor het maken van andijvie-salade.



Andijvie, Zomerkrul met geel hart.

p. lood
Andijvie, zomerkrul met geel hart (zie afbeeld.) f 0.15

Deze nieuwe uit Frankrijk ingevoerde soort is van binnen prachtig goudgeel.

p. lood
Andijvie, moskrul . . . . f 0.15

Met zeer fijn gekruld blad, waardoor deze soort het voorkomen van mos heeft.

p. lood
Andijvie, gewone breedblad, volhart . . . . f 0.10


Deze soort wordt het meest voor de inmaak gebruikt.

p. lood
Andijvie, echte late krop . . . . f 0.10
„ late fijne krul . . . . - 0.10
„ gekrulde van Ruffec . . . . . . - 0.15

Deze soort is matig gekruld en vooral geschikt voor laat gebruik.

ARTISJOK.


De Artisjok is eene groente, die ten onzent nog weinig wordt gebruikt. Indien men een warmen bak heeft, zaaie men reeds in Februari; de plantjes kunnen dan reeds in Mei worden uitgeplant in een diep losgewerkten, voedzamen, liefst een weinig vochtigen grond, en zullen dan hetzelfde jaar nog dragen. Op den kouden grond zaaie men in Mei. Om flinke planten te krijgen, plante men ze op een afstand van minstens 80 centim. onderling. Des winters moeten de planten tegen strenge vorst worden beschut. De oude stengels worden dicht bij de wortels afgesneden en om elke plant wordt een heuveltje van aarde gemaakt, ter hoogte van 20 centim., zorgdragende dat er geen aarde in het hart der plant komt. Bij strenge vorst bedekke men daarenboven met droog blad. De bloemhoofdjes worden vóór het ontluiken afgesneden en gestoofd gegeten.



Artisjokken.

p. pakje p. lood
Artisjok, groote groene van Laon . . f 0.10 f 0.30

ASPERSIE.



Aspersie.

Zaai in Maart of April en zorg dat de plantjes, als ze te dicht op elkaar staan, worden gedund op een onderlingen afstand van 8 à 10 cM. In 't volgende voorjaar, in Maart of April, kan men de bedden aanleggen; men zorge voor diep omgewerkten, voedzamen en goed gedraineerden grond. Plant op 2 voet afstand onderling. Het derde jaar kan men beginnen te steken; men make in 't voorjaar boven elke plant een heuveltje van 1 voet hoog, met grond uit de paden. Zoodra de spruiten zich daarboven vertoonen, slecht men het heuveltje, om de jonge scheut boven den wortelhals af te breken en daarna weer in orde te maken. In 't najaar wordt de oppervlakte der bedden weder gelijk gemaakt. Na 15 Juni mogen geen aspersies meer gestoken worden.

	p. pakje
Reuzen-Aspersie „Schneekopf"	f 0.10

Deze nieuwe Asperge kan met de beste soorten wedijveren wat zachtheid en smaak betreft, ze heeft daarenboven nog deze onschatbare eigenschap dat de kopjes, die bij andere soorten, dadelijk wanneer ze boven de grond komen, blauw worden, steeds wit blijven, ook al hebben ze reeds een hoogte van 10—15 cM. bereikt.

	p. ons	p. lood
Aspersie, vroege van Argenteuil. . . .	f 0.30	f 0.10

☞ Voor Aspersieplanten zie Afdeeling IIB.

AUGURKEN.

De Augurken verlangen een humusrijken, goed gemesten grond. Men zaaie begin Mei op bedden van 1.25 M. breedte, welke in het midden iets hooger zijn dan de zijden en op het midden waarvan men op 60 cM. afstand onderling kuiltjes maakt; in elk der kuiltjes legt men 3 zaden en bedekt deze met een weinig aarde. Bij het opkomen der plantjes behoudt men het sterkste, en snijdt de anderen onder de zaadlobben af. Een weinig verdunde gier kan zeer gunstig op den groei werken.

	p. lood
Augurken, kleine groene scherpe	f 0.10
„ „ „ gladde	- 0.10
„ verbeterde van Bourbonne	- 0.20


Uit Frankrijk ingevoerde verscheidenheid, welke zeer langwerpig van vorm, donker van kleur, en dicht met fijne stekels bezet is.

BIETEN.

Voor bieten kieze men een voedzamen, liefst in 't vorig jaar gemesten grond. Zaai in regels die 3 à 4 cM. diep en 30 cM. van elkander verwijderd zijn. De plantjes worden zoodanig uitgedund, dat ze op 25 cM. afstand onderling komen te staan. Tenzij men gaarne zeer vroege bieten wil hebben, zaaie men niet vóór eind April of begin Mei. Voor de winterprovisie bewaart men ze het best in een kuil, evenals de aardappelen.

	p. 5 ons	p. ons
Bieten, Moerheim's zwartbladerige. .	f 0.60	f 0.20

Deze verscheidenheid, door mij voor eenige jaren voor het eerst in den handel gebracht, kan niet genoeg worden aanbevolen; zij is de donkerste zoowel wat blad als wortel betreft, van alle bekende bietensoorten, terwijl de smaak die van alle anderen overtreft. Daar de wortelen niet zwaar worden, is het nuttig om deze verscheidenheid een paar weken vroeger te zaaien dan de gewone.




Bieten.

	p. 5 ons	p. ons
Bieten, gewone donkerroode	f 0.50	f 0.15
„ bleekblad	-	- 0.20
„ Non plus ultra, halflange . .	- 0.50	- 0.20
„ platronde Egyptische	-	- 0.30
„ ronde zwartroode	-	- 0.30
„ karmozijnroode kogel. Zie Nieuwigheden.		

SNIJBIET of WARMOES.

Deze groente wordt geheel op dezelfde wijze gekweekt als de bieten. Beiden behooren tot dezelfde plantensoort. Bij de eerste hebben echter door de cultuur de bladeren, bij de andere de wortelen een meerdere ontwikkeling verkregen. De kweekwijze van beide is gelijk, en verwijs ik hier dus naar hetgeen van de bieten is gezegd. Tegen het eind van September kan men reeds beginnen met telkens de meest ontwikkelde bladeren af te snijden voor het gebruik, en hiermede voortgaan tot laat in den herfst; waarom deze groente ook wel winterspinazie genoemd wordt.

Snijbiet, goudgele	per ons	f 0.15
„ **„Lucullus"**	per pakje	- 0.15



Snijbiet „Lucullus”.

Deze tot nu toe op vele plaatsen nog onbekende groente is nog steeds in weinig bruikbare soorten geteeld. De bovengenoemde is evenwel een groote aanwinst en overtreft alle andere soorten. Ze heeft een krachtige groeiwijze en de enorme fijngekrulde bladeren hebben een prachtige geelgroene kleur met witte strepen. Ongetwijfeld is deze nieuwe groente een groote aanwinst voor de keuken.

BOONEN.

Evenals alle vlinderbloemige gewassen, hebben de boonen het vermogen, door de bacteriën die zich in de knolvormige gezwellen der wortels bevinden, stikstof uit de lucht te verzamelen. Ze vereischen dus geen versch gemesten grond, doch hebben veel behoefte aan kali (potasch) welke men met succes kan toedienen in den vorm van haardasch. — **Stoksnij- en Stokslaboonen** (of princessen) zaaie men begin Mei voor de eerste maal en voor de late pluk nog eens begin Juni. Velen plaatsen de stokken kruiselings over elkander. Op deze wijze winden de ranken zich spoedig in elkander, zoodat licht en lucht niet overal vrijen toegang hebben. Ik kan daarom niet genoeg aanbevelen om elken stok afzonderlijk en recht overeind te zetten op regels welke 1 M. van elkaar verwijderd zijn, en in de regels op 50 à 60 cM. afstand onderling. Bij elken stok legt men 6 tot 10 boonen. Het is nuttig om de planten tot aan de zaadlobben aan te aarden. **Stamsnij- en Stamslaboonen** (of princessen) zijn minder gevoelig voor de koude dan de stokboonen en kan men reeds vroeger zaaien, namelijk voor de eerste maal begin April, op een warm plekje. Men dekke dan des nachts gedurende eenigen tijd met bloempotten. Indien men vervolgens met tusschenpoozen van drie weken zaait, tot half Juli, zoo kan men zich tot laat in den herfst een opeenvolgenden oogst van boonen verschaffen. De snijboonen zaaie men op 20 cM. afstand, op regels welke 50 cM. van elkander verwijderd zijn; de slaboonen op 12 cM. afstand, op regels van 40 cM. afstand onderling.

STOKSNIJBOON, Moerheim's Suikerslagzwaard zonder draden, zie voor deze geheel nieuwe groente pag. 2.

	p. 5 ons	p. ons
Stoksnijboonen, allervr. tienweeksche .	f 1.00	f 0.25

Deze wordt aanbevolen als de allervroegste en tevens rijkstdragende en heeft haar naam hieraan te danken, dat de boonen reeds geplukt kunnen worden 10 weken nadat men ze gepoot heeft, wat van geen enkele andere soort kan gezegd worden. De boonen worden tot 25 cM. lang en zijn zeer zacht.

	p. 5 ons	p. ons
Stoksnijboonen, vroege breede Veensche	f 0.45	f 0.15

Deze brengt niet zulke lange scheeden voort als de slagzwaardboonen, maar is vroeger en veel rijkdragender.

	p. 5 ons	p. ons
Stoksnijboonen, lange breede slagzwaard	f 0.55	f 0.15

Is te bekend om eenige aanbeveling te behoeven.



Stamsnijboonen, Keizer Wilhelm-reuzen,

STAMSNIJBOONEN Keizer Wilhelm-reuzen

per 5 ons f 0.60; per ons f 0.15.

De boomen dezer soort worden tot 26 cM. lang, en zooals de teekening aanduidt, is zij tevens zeer rijkdragend. Zij is zoowel voor den bak als voor den vollen grond geschikt.

	p. 5 ons	p. ons
Stamsnijboonen, lange breede echte . .	f 0.40	f 0.10
„ middelbr. lange broei .	- 0.40	- 0.10
„ vroege smalle . . .	- 0.40	- 0.10
„ „ broei	- 0.50	- 0.15
Stokslaboonen, Juli	- 0.60	- 0.15

Deze uit Duitschland ingevoerde Stokslaboon is de vroegste die tot heden bekend is. Zij is bovendien buitengewoon vruchtbaar.

	p. 5 ons	p. ons
Stokslaboonen, (princessen) gew. enkele	f 0.45	f 0.15
„ „ vroege „	- 0.50	- 0.15
„ „ **fijne trosjes**	- 0.55	- 0.20

Deze princesseboon is zeer geschikt voor de inmaak of om in bussen te worden geconserveerd, en is bovendien buitengewoon rijkdragend.

	p. 5 ons	p. ons
Stokslaboonen, (princessen) **fijne trosjes zonder draden** . . .	f 0.70	f 0.20

Deze nog betrekkelijk nieuwe soort heeft het onschatbare voordeel dat ze bij alle goede en voortreffelijke eigenschappen van de fijne trosjes ook nog geheel zonder draden is en bijzonder malsch.

	p. 5 ons	p. ons
Stokslaboonen, (princessen) enkele zonder draden	f 0.45	f 0.15
„ (princessen) groote dubbele	- 0.50	- 0.15

	p. 5 ons	p. ons
Stokslaboonen, (princessen) **dubbele zonder draden** . . .	f 0.60	f 0.15

Een der beste verscheidenheden, zeer rijkdragend, de scheeden zijn een weinig grooter dan die van de gewone enkele en zijn bijzonder malsch en zuiver zonder draden.

	p. 5 ons	p. ons
Stokslaboonen, krombek	f 0.75	f 0.20

Deze stokboonen worden in het noorden van ons land veel gebruikt, zoowel als snijboon of als slaboon.

	p. 5 ons	p. ons
Erwte-boonen, of kivietseitjes, gespikk.	f 0.30	f 0.10
Pronkboonen, witbloeiende stok . . .	- 0.30	- 0.10
„ roodbloeiende stok . .	- 0.25	- 0.10
Stamslaboonen, (princes) **allervroegste broei**	- 0.60	- 0.20

Deze verscheidenheid is de beste mij bekende broeistamboon; zij is vroeger dan eenige andere en is daarbij uitmuntend van smaak. In tegenstelling met de meeste soorten broeiboonen is zij bovendien voor den kouden grond uitmuntend geschikt, daar zij alsdan eveneens buitengewoon vroeg is, en evengoed als eenig andere, ongunstig weder kan verdragen.

	p. 5 ons	p. ons
Stamslaboonen, vroege dubbele met lange scheeden	f 0.25	f 0.10

Deze nieuwe slaboon is een der vroegste soorten voor den kouden grond, en kan ook wegens de schoongevormde scheeden niet genoeg worden aanbevolen.

	p. 5 ons	p. ons
Stamslaboonen, Hollandsche witte reuzen nieuw	f 0.50	f 0.20

Deze nieuwe soort gelijkt veel op de dubbele stamslaboon, maar is veel grooter en uitnemend van smaak.

	p. 5 ons	p. ons
Stamslaboonen (princessen) gew. enkele	f 0.25	f 0.10
„ „ groote dubbele	- 0.20	- 0.05
„ „ **fijne vroege suiker**	- 0.30	- 0.10
„ „ fijne zonder draden	- 0.45	- 0.15
„ Hinrich's reuzen . . .	- 0.25	- 0.10

Deze is een der rijkst dragende stamslaboonen. In Duitschland is deze slaboon zeer algemeen, en kan ik haar ook voor onze Hollandsche tuinen met warmte aanbevelen. Zij is tamelijk vroeg en geeft buitengewoon lange scheeden, die uitmunten door malschheid. De boonen zien er zeer eigenaardig, bont gekleurd uit, namelijk wit met rose vlekjes. Zij is ook een der smakelijkste boonen om droog te eten.

	p. 5 ons	p. ons
Stamslaboonen, nain du mont d'or . .	f 0.60	f 0.20

Fransche verscheidenheid met goudgele scheeden en bijna geheel zonder draden. Zij is vroeg en zeer rijkdragend.

	p. 5 ons	p. ons
Stamslaboonen, chocolaad bruine rotjes	f 0.25	f 0.10
„ citroengele	- 0.25	- 0.10

N.B. In antwoord op sommige aan mij gerichte vragen, diene dat **Slaboonen** ook Princessen-, Heeren-, Suiker- of Spersieboonen worden genoemd.

	p. 5 ons	p. ons
Stamslaboonen, witte weekschillen . .	f 0.25	f 0.10

Zoowel als slaboon of als droge boon zeer aan te bevelen.

	p. 5 ons	p. ons
Stamboonen, flageolet vert	f 0.30	f 0.10

Dit is een der fijnste boonen om droog te worden gegeten.

	p. 5 ons	p. ons
Stamboonen, gewone bruine	f 0.15	f 0.05
Stamboonerwten	- 0.30	- 0.10

Deze leveren gespikkelde boonen. die zacht in de kook zijn en uitmuntend voor winterprovisie.

	p. 5 ons
Tuinboonen, gewone langscheede	f 0.15
„ **vroege breede witkiem**	- 0.20

Deze verscheidenheid is de beste van alle. Zij is 8 à 10 dagen vroeger dan de gewone Haarlemmer, draagt zeer rijk en brengt breede lange afhangende scheeden voort, terwijl de boonen, daar dezelve witkiemig zijn, langer malsch blijven dan eenige andere verscheidenheid.

	p. 5 ons
Tuinboonen, breede Haarlemmer of klooster. .	f 0.25
„ lange afhanger of Leidsche . . .	- 0.25
„ **extra lange reuzen afhangers** . .	- 0.35

Deze soort is bijzonder malsch en smakelijk zoowel geschikt voor de inmaak, als om groen te gebruiken; ze is bovendien zeer rijkdragend en de scheeden bereiken eene lengte van zelfs 34 c.M., het is eene belangrijke verbetering van de lange afhangers.

	p. 5 ons
Tuinboonen, groote Engelsche Windsor . . .	- 0.25
„ groote groene Engelsche Windsor	- 0.30
„ Bunyard's, extra langscheede . .	- 0,30

Uitmuntende zeer rijkdragende Engelsche verscheidenheid, met goed gevulde scheeden.

	p. 5 ons
Tuinboonen Mazagan, voor inmaak	f 0.30

De Tuinboonen zaaie men in 't voorjaar, zoodra de grond kan worden bewerkt. Men make daartoe 2 regels op 20 cM. afstand van elkaar en 4 à 5 cM. diep. Hierin legge men de boonen 20 cM. van elkaar verwijderd, en na deze weer te hebben dichtgemaakt, make men op 90 cM. afstand van de vorige weer 2 regels enz. Om ze vroeg te kunnen plukken, kan men ook zeer dicht zaaien op een warm plekje in den tuin of onder een raam, om de jonge plantjes later uit te planten. In den open grond zaait men met tusschenpoozen van 4 weken. Tusschen de dubbele regels kan men gelijk met de boonen spinazie, radijs enz. zaaien.

CICHOREI.



Cichorei.

Zaai in April in diepen lossen en niet versch gemesten grond, en in regels die 30 cM. van elkaar en 2 cM. diep zijn. Voor uitdunnen, zoodat de plantjes in de regels op 5 cM. afstand onderling komen te staan, moet worden gezorgd. In November worden de wortelen gerooid, de bladeren boven den wortelhals afgesneden, en zijn dezelve geschikt om te worden gebleekt. Men kieze hiertoe een vorstvrije plaats uit in schuur, kelder of ouden broeibak, en men kan op verschillende wijzen te werk gaan. Altijd kieze men echter flinke wortelen uit met niet meer dan één kop. Om zeer spoedig te kunnen snijden, make men een bed van paardenmest ter dikte van 40 cM., waarop men een goede laag teelaarde van 30 cM. dik aanbrengt. Men steekt hierin de wortelen, die van onderen af op een lengte van ± 20 cM. schuin zijn afgesneden, naast elkaar op regels die 5 cM. van elkaar zijn verwijderd. Men zorge het licht op de een of andere wijze geheel buiten te sluiten en voor vorst te dekken. Na eenige weken kan men de bladeren snijden, en gestoofd of als salade gebruiken. Om kropjes van Brusselsch Witloof te verkrijgen, bedekke men na de planting het geheel met een 20 cM. dikke laag fijne bladaarde of lichten tuingrond.

Heeft men in schuur of kelder geen ruimte, zoo kan men ook een kuil maken in den tuin, en hierin op dezelfde wijze te week gaan, het geheel met droge bladeren of oude matten voor vorst en regen dekkende. Ook zonder paardenmest kan men de cichorei bleeken, doch dan duurt het langer. Heeft men een warme kas, dan heeft men een schoone

gelegenheid om onder de tabletten eenige aarde aan te brengen en hierin de wortelen te steken.

	per ons	per lood
Cichorei, gewone lange	f 0.45	f 0.10
Brusselsch witloof	- 0.45	- 0.10

ERWTEN.

Tot de vlinderbloemige gewassen behoorende, gedijen de doperwten evenals de boonen enz., het best in grond, die 't vorige jaar gemest is, en vele kalk- en kali- (Potasch) houdende bestanddeelen bevat. Evenmin moet men ze meerdere jaren achtereen op denzelfden grond kweeken. Stamdoppers legge men in 3 à 4 cM. diepe regels en op 15 cM. afstand onderling. Naarmate de soorten lager of hooger groeien, moeten de regels 30 à 40 cM. van elkaar verwijderd zijn.

De rijsdoppers (soorten die ± 60 cM. en hooger groeien) zaaie men in dubbele regels, die dan een afstand van 10 cM. onderling hebben. De erwten worden hierin dun uitgestrooid, en wel dunner, naarmate de soorten hooggroeiend zijn. Wanneer de erwten opkomen, plaatse men er rijs bij, en is het nuttig ze dan tevens een weinig aan te aarden. Voor de eerste maal zaaie men in Januari of Februari, en vervolgens om de 3 weken tot half Juni. Van af het begin van April zaaie men de late soorten.

N.B. **De verscheidenheden met * gemerkt zijn gerimpeld.**

Hoewel de hoogte in voeten bij elke soort is aangegeven, gelieve men op te merken, dat de erwten hooger groeien, naarmate de grond krachtiger, meer stikstofhoudend is.

VROEGE DOPERWTEN.

Doperwten „Riesenkind”. Zie onder Nieuwigheden.

	Hoogte in voeten.	p. 5 ons	p. ons
„ **GRADUS (Ideal)** Nieuwe	3	f 0.80	f 0.20

Deze erwtensoort heeft in mijne kweekerij zeer goed voldaan. Ze is vroeg, wordt ongeveer 80 cM. hoog en brengt een ontzettende menigte van groote scheden voort die 12—15 cM. lang zijn en ongeveer 10—11 dikke erwten bevatten. De smaak is zeer goed.

Doperwten „Thomas Laxton”. Zie onder Nieuwigheden.

	Hoogte in voeten.	p. 5 ons	p. ons
„ ***Wonder van Amerika.**	3/4	f 0.30	f 0.10

Een der vroegste en rijkstdragende stamdoppers.

Doperwten *William Hurst . . .	3/4	f 0.30	f 0.10

Eene verbeterde variëteit der voorgaande en brengt langere schokken voort.

Doperwten, gele stam of kruip . .	1/2	f 0.30	f 0.10
„ ***Bliss' Abundance** (overvloeds)	1 1/2	- 0.35	- 0.10

Zeer aanbevelenswaardig; de planten brengen eene groote hoeveelheid doperwten voort, zoodat deze verscheidenheid terecht „overvloeddopper” is genoemd.

Doperwten, Emerald Gem., vroege groene, extra . . .	1 1/2	f 0.25	f 0.10
„ Girling's extra vroege .	1 1/2	- 0.25	- 0.10

Deze beide laatste Engelsche soorten zijn buitengewoon vroeg en rijkdragend.

Doperwten, Lentedopper, vr. groene	2	f 0.30	f 0.10
„ ***Exonian,** Nieuw, zeer vr.	2 1/2	- 0.35	- 0.10

Deze uit Engeland ingevoerde doperwt kan ik ten zeerste aanbevelen als een vroege, zeer rijkdragende doperwt van uitmuntende qualiteit. Van de gekreukelde doperwten is deze een der vroegste.

Doperwten, Carters first crop, vroege extra	2 1/2	- 0.25	- 0.10
„ *Laxton's Alpha . . .	2 1/2	- 0.30	- 0.10
„ eerste vroege Mei of Prince Albert . . .	2 1/2	- 0.25	- 0.10
„ **vroege Haarlemsche** . .	3	- 0.35	- 0.10

Van de doperwten met gladden korrel is deze zonder twijfel een der vroegste en is daarbij zeer rijkdragend. Van de Hollandsche soorten kan ik deze als een der beste aanbevelen, daar bovendien de smaak zeer fijn is.

	Hoogte in voeten.	p. 5 ons	p. ons
Doperwten,* vroege groene krombek	3	f 0.30	- 0.10

Uitmuntende fijne, zeer rijkdragende doperwt.

MIDDELVROEGE OF VOLGERS.

	Hoogte in voeten.	p. 5 ons	p. ons
Doperwten* „Incomparable” . . .	5	f 0.50	f 0.15

Tamelijk vroege Engelsche Dopper. Groote witte gerimpelde erwten in kolossale scheeden. Hoogte ruim 1 1/2 M.

Doperwten „Rhum von Vietz” . .	4	f 0.60	f 0.15

Een der beste nieuwe middelvroege Doppers. De kleine scheeden, die eenigszins naar den krombekvorm neigen, zijn geheel gevuld met ongeveer 8—10 prachtige, goedgevormde erwten. 't Is een sterk soort, goed bestand tegen allerlei weersgesteldheid en ook zeer geschikt om later te zaaien.

Doperwten *„Telefoon”	5	f 0.35	f 0.10

Een der beste tamelijk vroege Doppers. De scheeden zijn enorm groot maar de erwten naar verhouding tamelijk. Prachtige, rijkdragende soort. Zeer aanbevelenswaard.

Doperwten, gewone Mei	2 1/2	f 0.25	f 0.10
„ lange krombek, beste opvolgers	4	- 0.30	- 0.10
„ **Vlijmsche krombek** . .	3	- 0.35	- 0.10

Deze soort wordt in Noord-Brabant op groote schaal gekweekt voor de Engelsche markt. Zij is enorm rijkdragend en zonder twijfel een der beste middelvroege doppers.

Doperwten, Laxton's Suprême, ronde groene	4	f 0.25	f 0.10

Deze doperwt is bijzonder rijkdragend en kan zeer goed de zomerwarmte verdragen; kan voor late doperwt zeer worden aanbevolen.

Doperwten, *Champion of England	4	f 0.30	f 0.10
„ raspers, groene ruige. .	6	- 0.30	- 0.10
„ „ gele	6	- 0.25	- 0.10

LATE DOPERWTEN.

	Hoogte in voeten.	p. 5 ons	p. ons
Doperwten „Captain Cuttle” . . .	3	- 0.70	- 0.20

Sterk groeiende Engelsche soort met groote hoekige scheeden; ongeveer 7—10 donkergroene erwten in eene scheede. Zeer rijkdragend.

Doperwten „Daisy”	± 2	f 0.50	f 0.15

Late Engelsche Doperwt, groote scheeden, zeer rijkdragend.

Doperwten *Everbearing (altijd dragende) . .	1 1/2	f 0.35	f 0.10

Deze verscheidenheid kan, evenals de Bliss' Abundancedopper, zonder rijs worden gekweekt, en onderscheidt zich zoowel door buitengewone vruchtbaarheid als door den langen duur der pluk, daar zij lang doorbloeit en telkens nieuwe peulen vormt.

Doperwten *„Gladstone” . . ruim	3 1/2	f 0.40	f 0.10


Buitengewoon goede, rijkdragende Engelsche Doperwt. Donkergroene erwten in groote scheeden, die paarsgewijze groeien.

Doperwten, groote Kaapsche groene	3	f 0.25	f 0.10
„ gewone lage groene . .	3	- 0.25	- 0.10
„ hooge groene groote . .	7	- 0.40	- 0.10
„ groote groene Keizer. .	3	- 0.35	- 0.10

Deze is uitmuntend geschikt om droog te worden gebruikt voor erwtensoep.

CAPUCIJNERS.

	Hoogte in voeten.	p. 5 ons	p. ons
Capucijners, stam	1	f 0.30	f 0.10
„ lage vroege grijze	3	- 0.25	- 0.10
„ gewone lage Kaapsche	3	- 0.25	- 0.10
„ *lage witte	3	- 0.35	- 0.10
„ *hooge witte	6	- 0.40	- 0.10
„ laagbloeiende hooge	6	- 0.25	- 0.10



Moerheim's Reuzenpeul. Natuurlijke grootte.

PEULEN.

VROEGE PEULEN.

	Hoogte in voeten.	p. 5 ons	p. ons
Peulen de Grace, echte vroege stam	1/2	f 0.60	f 0.20
„ vroege stam of kruip	1 1/2	- 0.45	- 0.15
„ extra vroege langscheede, Nieuw		- 0.60	- 0.15

Uit Frankrijk ingevoerde verscheidenheid, die bij eene proefneming in mijne kweekerij uitmuntend heeft voldaan, en die ik dus gerust kan aanbevelen. Zij is zeer vroeg en heeft daarbij zeer lange scheeden, wat van de meeste vroege peulen niet kan gezegd worden.

	Hoogte in voeten.	p. 5 ons	p. ons
Peulen, Lentepeul, uitmuntende	2	f 0.40	f 0.10
„ vroege halfstam	2	- 0.45	- 0.15
„ „ Hendriks	3 1/2	- 0.25	- 0.10
„ „ gele kwee	3 1/2	- 0.30	- 0.10
„ gewone suiker	4	- 0.30	- 0.10

	Hoogte in voeten.	p. 5 ons	p. ons
Peulen, Moerheim's reuzen	4	f 0.40	f 0.10

Deze nieuwe *in mijne kweekerij gewonnen* peul is thans reeds over de geheele wereld bekend en behoeft geen bijzondere aanbeveling meer, daar ze zich de eerste plaats onder alle peulensoorten heeft veroverd. De afbeelding toont haar reuzenvorm; ze groeit ± 4 voet hoog. Haar smaak is overheerlijk. Als een bewijs hoe sterk deze soort gevraagd wordt, kan dienen, dat ik er in het verloopen jaar circa 5 Hectare van heb geteeld, eene opbrengst gevende van ruim 6000 kilo zaaierwten, die hun weg hebben gevonden naar de meest verschillende landen.

LATE PEULEN.

	Hoogte in voeten.	p. 5 ons	p. ons
Peulen, lage grijze roodbloeiende	2 1/2	f 0.30	f 0.10
„ Ridder witte	3	- 0.45	- 0.15

Uitmuntende late rijkdragende soort.

Peulen, groote slier of krombek	5	- 0.45	- 0.15
„ wijker of zomer	6	- 0.40	- 0.15
„ hooge groene late	6	- 0.50	- 0.15

KOMKOMMERS.

Zaai omstreeks 10 à 12 Mei op een terrein dat zooveel mogelijk tegen koude winden beschut is. In de bakken kan men reeds in Januari en Februari zaaien. Niets is voor de komkommer zoo schadelijk als koude en nattigheid. Het zaaien geschiedt op dezelfde wijze als de Augurken. Evenals voor deze zorge men voor lossen goed gemesten grond. Om de vruchtbaarheid te bevorderen moet men de loten, zoodra ze 6 à 7 bladeren hebben, innijpen en aan elke plant niet meer dan 8 à 10 der grootste vruchten behouden. Het toedienen van vloeibare mest in een kuiltje bij elke plant kan vooral bij droog weder worden aanbevolen.

	p. pakje
Komkommers Rytow's Kamer	f 0.15

NIEUW! Deze komkommer kan in een pot in de kamer worden gezaaid in April. Na vier weken moet men in een grootere pot verplanten.

	p. lood	p. pakje
Komkommers, lange gele tros	f 0.10	
„ Zwijndrechtsche lange gele	- 0.30	f 0.10
„ **lange Amsterdamsche**	- 0.60	- 0.10

In de omstreken van Amsterdam wordt deze soort bijna uitsluitend verbouwd, en geeft prachtige lichtgele vruchten. Ze wordt hoofdzakelijk onder glas gekweekt.

	p. pakje
Komkommers, Hampel's verbeterde broei en volle gronds	f 0.20

Deze soort is weinig gevoelig voor den invloed van het weder en kan dus ook zeer goed voor den vollen grond worden gebruikt. Onder glas komen de schoongevormde, licht-blauw-groene wit gespikkelde vruchten evenwel beter tot haar recht. Zij is zeer rijkdragend.

p. pakje
Komkommers, extra lange gele Goliath . . . f 0.20

Eene uitmuntende soort om onder glas te kweeken. De prachtige, groote lichtgele vruchten zijn bezet met zwarte doorntjes.

p. pakje
Komksmmers, Noa's lange groene . . . . . f 0.20

Zeer milddragende soort met kolossale lange vruchten.

	p. lood	p. pakje
Komkommers, gewone lange groene . .	f 0.10	
„ Erfurter lange witte		f 0.20
„ Rollison's Telegraph, groene . .		- 0.20

Zeer milddragend en van buitengewoon schoonen vorm.

	p. lood	p. pakje
Komkommers, Japansche klimmende, *Nieuw*	f 0.15	f 0.05

Deze moet bij rijs worden gekweekt, en verdraagt beter dan eenige andere, koude en nattigheid. Terwijl bij aanhoudenden regen de vruchten van andere soorten spoedig tot verrotting overgaan, blijven die der Japansche klimkomkommer langer goed, doordat dezelve niet met den grond in aanraking komen. De smaak is echter niet zoo fijn als onze Hollandsche soorten.

KOOL.

Bloemkool. De vroege soorten kunnen moeielijk zonder bakken worden gekweekt. Men zaaie einde Augustus of begin September op voedzamen grond. Omstreeks half October neme men de plantjes op en plantte ze in een bak op 5 cM. afstand onderling, doch late, tot het begint te vriezen, de ramen er af. Ofschoon de plantjes wel eenige vorst kunnen verdragen, moet men bij strengen vorst, vooral des nachts, dekken, doch zorg dragen nu en dan bij helder weder, midden op den dag, de ramen een weinig open te zetten. In Maart plante men uit op een warm plekje in den tuin, op een onderlingen afstand van 50 cM., met tusschenpoozen van 14 dagen, en dekke in den eersten tijd des nachts met bloempotten. De Erfurter dwerg is de beste om onder glas te worden vervroegd. Indien men geen bakken ter beschikking heeft, zaaie men half April, om ze even als de Sluitkool verder te behandelen. De herfstbloemkool, zooals de uitmuntende verscheidenheden „Algiersche reuzen" en „Veitch's Autumn Giant," zaaie men begin Mei. De planten worden op 70 cM. afstand onderling uitgeplant. Zij hebben meer ruimte noodig dan de andere koolsoorten om zich goed te kunnen ontwikkelen. De kool moet steeds des morgens zoo vroeg mogelijk worden gesneden, wanneer de morgendauw er nog opligt.

De Brocoli is een soort Bloemkool en wordt gezaaid omstreeks half Mei, en in Juli uitgeplant. In het najaar bindt men de bladeren op, en zoodra het begint te vriezen, brengt men een flinke laag droog blad tusschen de planten. Zoodra de vorst voorbij is, ontbloote men de planten en make de bladeren los; zeer vroeg in 't voorjaar zullen zich dan de koolen beginnen te vertoonen.

Alle koolsoorten verlangen een diepen, niet te drogen, goed gedraineerden grond en een koele standplaats. Alleen voor de vroege kool is het goed een warm plekje in den tuin op te zoeken. Van groot nut is het om het terrein diep om te werken en in 't najaar flink met kalk te bezaaien

Roode, witte en **Savoye kool** zaait men gewoonlijk van Maart tot Mei, al naar gelang van de soorten en naarmate men de kool vroeg of laat wenscht gereed te hebben voor het gebruik. Men zaaie vooral niet te dik en zoodra de planten een dikte hebben van een ganzeveder, plant men ze uit op een onderlingen afstand van 60 cM., in alle richtingen. Bij elke plant make men een kuiltje om zoo noodig te kunnen gieten.

Spruitkool zaaie men tweemaal, nl. begin Maart en einde April. Men gaat op dezelfde wijze te werk als met de sluitkool, doch plant uit op 50 cM. afstand onderling. Men meste niet zoo zwaar als voor andere koolsoorten.

Boerenkool is een der minst veeleischende groenten, zoowel wat grondsoort als standplaats betreft. Men zaaie half Mei en plant uit op 50 à 60 cM. afstand onderling. Speciale zorgen vereischt de boerenkool verder niet.

	p. lood	p. pakje
Brocoli, vroegste Fransche witte . . .	f 0.20	f 0.10

Deze is de vroegste van alle en zeer fijn van kwaliteit.

	p. lood	p. pakje
Brocoli, vroege Engelsche witte . . .	f 0.20	f 0.10
„ Snow's white winter	- 0.20	- 0.10
Bloemkool, vroege Erfurter broei, (gegarandeerd echt) extra		- 0.25

De beste soort om te broeien. Zij is verreweg de vroegste en geen enkele andere soort overtreft haar in vastheid en witheid van kool; ze maakt zeer kleine bladeren en is daardoor zeer geschikt voor den bak.

	p. lood	p. pakje
Bloemkool, fijne vroege	f 0.20	f 0.10
„ **kortbeen Lenormand** . .	- 0.30	- 0.10

Deze is zeer vroeg en geeft flinke koolen, die niet zeer gevoelig zijn voor ongunstig weder.

	p. lood	p. pakje
Bloemkool, groote Utrechtsche kortbeen	f 0.30	f 0.10
„ vroege Langendijker . . .	- 0.35	- 0.10
„ Eclipse, vroegste Ital. Reuzen	- 0.20	- 0.10
„ Algiersche groote, late . .	- 0.60	- 0.10
„ Non plus ultra, vroege Reuzen	- 0.20	- 0.10
„ Veitch's Autumn Giant late Reuzen	- 0.20	- 0.10

De vier laatste soorten zijn afkomstig uit Italië en geven bloemkoolen van enorme afmeting. Ze moeten echter niet te dicht worden geplant.

Witte kool, allervroegste ronde Reuzen.

Zie onder Nieuwigheden.

	p. lood
Witte kool, vroegste Expres	f 0.10

Deze is zeer vroeg en geeft vaste spitsvormige koolen.

Witte kool, fijne vroege kortbeen	f 0.10
„ „ vroege spitse suikerbroods . . .	- 0.10
„ „ „ „ van Etampes . . .	- 0.10

Extra vroege, spitse soort, zeer aanbevelenswaardig.

Witte kool, spitse Winnigstädter	- 0.15



Witte kool, spitse Winnigstädter.

Deze soort geeft langwerpige, spitse en zeer smakelijke koolen. Aan de eigenaardige groeiwijze kan men ze reeds van verre herkennen.

p. lood

Witte kool, kortbeen Brunswijker groote platte f 0.10
„ „ „ groote late . . . . . - 0.10
„ „ Langedijker groote late witte . . - 0.10

In Noord-Holland wordt deze bijna uitsluitend gekweekt en bij groote massa's naar binnen- en buitenland verzonden.

p. lood

Witte kool, Yorksche vroege fijne . . . . . f 0.10
„ „ Amager, late . . . . - 0.15

Uitmuntend Deensche soort. Deze is een der beste voor wintergebruik.

Roode kool, Erfurter Zwartkop.

Zie onder Nieuwigheden.

p. lood

Roode kool, Erfurter vroege bloedroode . . . f 0.15

Vormt vaste kooltjes en is buitengewoon vroeg.

Roode kool, vroege spitse bloedroode Garfield . - 0.15

Uitmuntende uit Engeland ingevoerde verscheidenheid.

p. lood


Roode kool, Poolsche gekrulde . . . . . . f 0.15

De buitenste bladeren zijn gekruld en zij vormt mooie vaste kooltjes.

p. lood

Roode kool, fijne Utrechtsche zwart-roode . . f 0.15
„ „ gewone donkerroode groote . . . - 0.10
„ „ groote late . . . . - 0.10

Kapperkool, groote met blauwe randen . . . - 0.15



Savoye Kool.

p. lood

Savoye kool, vroege van Aubervilliers . . . f 0.15

Deze soort is zeer vroeg, geeft extra mooie, groote kool en is sterk gekruld. Zeer aan te bevelen.

p. lood

Savoye kool, platte groote gele extra . . . . f 0.15
„ „ fijne gele . . . . - 0.10
„ „ Bloemendaalsche gele . . . . . - 0.10
„ „ fijne vroege groene . . . . . - 0.10
„ „ Sutton's Tom Tumb, zeer fijne donkergroene gekrulde . . . - 0.15
„ „ Victoria, fijn gekrulde . . . . - 0.15

Een der fijnste groene savoye koolen van middelmatige grootte, zeer vast en goed bestand tegen de koude.

p. lood

Savoye kool, groote groene late . . . . . . f 0.10
„ „ Noorsche groote groene late . . - 0.10

Deze is de laatste en tegen de strengste koude bestand. Vormt extra groote koolen, die tegen den winter een roodachtigen tint krijgen.

p. lood

Savoye kool, kleine groene met geel hart . . f 0.15

p. pakje p. lood

Savoye kool, IJzerkop . . . . . . f 0.10 f 0.30


Nieuwe uit Duitschland ingevoerde soort, die zeer vast is en vanbinnen geel.

p. lood

Savoye kool, van Limay . . . . f 0.15

Deze soort is zeer laat en eveneens winterhard. De bladeren zijn zeer grof gekruld.

Spruitkool van Lyon (Zie Nieuwigheden).



Spruitkool „Hercules."

Zooals de afbeelding toont brengt deze prachtige Spruitkool eene zeer groote menigte spruitjes voort, die bijzonder stevig en van een heerlijken smaak zijn. Zoowel om de kwaliteit als om de groote hoeveelheid spruitjes zeer aan te bevelen.

Spruitkool „Hercules" . . . . . per pakje f 0.15

p. lood

„ Brusselsche hooge . . . . f 0.10
„ „ lage . . . . - 0.10
„ **Augburth** . . . . - 0.15

Buitengewoon rijkdragende verscheidenheid. De stengel is meestal van onderen tot boven bezet met bizonder vaste kogelronde spruitjes. In hoogte varieert zij tusschen de beide vorige soorten. Zij is in vele opzichten aanbevelenswaardig.

p. lood


Boerenkool, lage groene gekrulde . . . . . f 0.10
„ middelhooge groene gekrulde . . - 0.10
„ hooge groene gekrulde . . . . . - 0.10
„ bonte of dessertkool in alle kleuren - 0.20

Zeekool . . . . - 0.20

Een zeer smakelijke groente, die in Engeland in groote hoeveelheden wordt geteeld, om des winters of vroeg in 't voorjaar te worden; gebruikt. Zij moet evenals de Cichorei gebleekt worden; haar smaak heeft eenige overeenkomst met de asperge en wordt ook op ongeveer dezelfde wijze toebereid.

KOOL- of KNOLRAPEN.

Deze zijn slechts eene verscheidenheid van de kool. Terwijl men van Sluitkool de tot een krop gegroeide bladeren nuttigt, en van Bloemkool, den in wording zijnden bloemstengel, zoo wordt van de Koolrapen de knolvormig vergroeide stengel of wortel als groente gebruikt, naar gelang deze zich boven of onder den grond tot een knol vormt. Die welke boven den grond groeien, worden gewoonlijk Koolrabi of Glaskoolrapen genoemd, in onderscheiding van de gewone Koolrapen (onder den grond). Beide groepen worden op dezelfde wijze gekweekt. Men zaaie omstreeks half Mei. Wanneer men vroeger zaait, zoo worden ze, indien ze niet jong worden gebruikt, onsmakelijk en stokkerig op schotel. Beide soorten kunnen worden verplant, op onderlingen afstand van 35 à 40 cM., ofschoon het beter is de gewone koolrapen terstond ter plaatse te zaaien en later uit te dunnen. Wat den aard van den grond betreft zijn ze niet zoo kieskeurig als de koolsoorten.



Koolraap.


p. lood

Koolrapen, vroege witte riembladerige . . . . f 0.10

Deze is buitengewoon vroeg.

Koolrapen, vroege gele ronde . . . . - 0.10
„ gewone witte . . . . - 0.10
„ „ gele . . . . - 0.10
„ groote gele blauwkop . . . . . - 0.10
„ groote gele groenkoppige . . . . - 0.10
„ Rutabaga of Zweedsche . . . . - 0.10

KOOLRABI of GLASKOOLRAPEN.



Koolrabi.

p. lood

Koolrabi, vroegste witte Erfurter Dreienbrunnen f 0.15

De knollen dezer soort blijven zeer klein. In Duitschland worden ze onder glas gekweekt; men kan evenwel de jonge plantjes in den kouden bak doen overwinteren en buiten uitplanten.

p. lood

Koolrabi, Weener kleinbladerige fijne blauwe . f 0.15
„ „ „ „ witte . . - 0.15
„ gewone groene glas. . . . . - 0.10
„ „ blauwe „ . . . . - 0.10

Deze 5 soorten groeien alle b o v e n den grond.

MELOENEN en CANTALOUPEN.

Meloenen zaaie men einde Januari of begin Februari in den warmen bak in rijkelijk gemesten vruchtbaren grond. Na 4 weken zaaie men nog eens, daar bij strenge vorst het eerste zaaisel dikwijls mislukt, vooral wanneer men bij donker weder of sneeuw niet dikwijls genoeg lucht kan geven. Omstreeks 4 weken na het zaaien worden de plantjes verspeend op een onderlingen afstand van 12 à 13 cM., eveneens in een warmen bak. Zoolang de plantjes in dien bak staan, moet men zooveel mogelijk lucht geven. In Maart (voor het tweede zaaisel in April) snoeit men ze boven het tweede blad in en brengt ze ter plaatse. De beide vertakkingen, die zich nu bij elke plant zullen vormen, laat men groeien totdat zij elk 8 à 10 bladeren hebben, waarna men ze tot boven het zesde blad innijpt. In 't begin van Mei zal men bij een goede behandeling op deze wijze de eerste vruchten kunnen plukken. Bij het kweeken van Meloenen is het van het grootste belang er voor te zorgen, dat de temperatuur in de bakken meestijds hooger is dan 12 graden Celcius. Vooral tegen dat de vruchten rijp zijn is een hooge temperatuur zeer gewenscht.

Meloen „Corallenriff", zie onder Nieuwigheden.

p. pakje

Meloen, Ananas d'Amérique (groen vleesch) klein . . . . f 0.20
„ Berlijnsche net, zeer groot. . . . . - 0.20
Algemeen bekende soort.
„ de Cavaillon (rood vleesch) . . . . - 0.20
Late soort met groote vruchten.
„ de Honfleur (geel vleesch) . . . . - 0.20

Een der grootste meloenen, welke bij gunstig weder ook in den vollen grond rijp wordt.

p. pakje

Meloen, Keizerin Augusta Victoria . . . . f 0.35

Deze Cantaloup-Meloen is zeer gemakkelijk te kweeken en bijzonder rijkdragend. De vrucht heeft een gemiddeld gewicht van $2^1/_2$ - 3 kilogram, en een dunne donkergroen gestreepte schil, die wanneer ze rijp wordt een gele kleur aanneemt. De vorm is rond, terwijl het roodachtig oranjegele vleesch een zachte aromatische geur bezit.

p. pakje

Meloen, Wonder van Amerika . . . . . . f 0.30

De vruchten van deze Muskaat-Meloen zijn tamelijk groot, langwerpig ovaal van vorm en voorzien van een fijn net. Het vleesch is sappig, groenachtig, zeer geurig en zoet. Heerlijke tafelvrucht.

p. pakje

Meloen, hybride Vallerand . . . . f 0.20

Uitmuntende uit Frankrijk ingevoerde variéteit met langwerpige groengestreepte vruchten en donker, zeer sappig vleesch.

p. pakje

Cantaloup, d'Alger . . . . f 0.20

De schil van deze soort is wit met donkergroene vlekken. Het vleesch is dik, saprijk, geurig en altijd zeer zoet. Zeer aanbevelenswaardig.

p. pakje

Cantaloup, noir des Carmes . . . . f 0.20

Een der vroegste meloenen, die het gemakkelijkst gekweekt wordt, terwijl de donkergroene, somtijds bijna zwarte vruchten, een bijzonder fijnen, geurigen smaak hebben.

p. pakje


Cantaloup, Prescott fond blanc . . . . . . f 0.20

De groote vruchten hebben een witachtige, groengevlekte schil, die meestal van uitwassen is voorzien. Zeer saprijk.

PETERSELIE.

Om gedurende den ganschen zomer overvloed van Peterselie te kunnen snijden, zaait men in Maart en vervolgens in Mei en Juli, liefst op een half beschaduwde plaats. Het zaad moet niet diep onder den grond worden gewerkt. De beste methode is om op regels te zaaien, die 20 à 30 cM. van elkaar zijn verwijderd. Men dunne vooral de jonge plantjes uit, zoodat ze voldoende ruimte hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Het zaad heeft dikwijls meer dan een maand noodig om te ontkiemen.

	p. lood
Peterselie, gewone snij	f 0.10
„ fijne krul	- 0.10



Peterselie, non plus ultra.

	p. lood
Peterselie, non plus ultra (met varenachtige blaadjes)	f 0.15
„ wortel	- 0.10
	p. pakje
„ **dwerg-perfection**	f 0.15

In vorm, kleur en smaak is deze soort onovertroffen. De bladen zijn fijn en sierlijk gekruld, de vorm is gedrongen, vol en dicht en gelijkt op een halven bol.

POMPOENEN.

De Pompoenen of eetbare Kalabassen worden in ons land nog zeer weinig als groente gebruikt. In sommige landen, vooral in Engeland, worden ze daarentegen zeer veel gegeten en niet ten onrechte gewaardeerd. Daar ze vrij gemakkelijk te kweeken zijn, kan ik ze dus ten zeerste aanbevelen, en dengenen, die ze niet kennen, aanraden om er de proef eens mee te nemen. Ze hebben evenals de komkommers een zeer voedzamen grond noodig. Het verdient bovendien aanbeveling om den grond 40 cM. diep uit te graven, het liefst langs muur of schutting en daarin een laagje paardenmest aan te brengen. Men vult aan met goeden tuingrond, liefst gemengd met compostaarde. Omstreeks half Mei maakt men op 3 voet afstands ondiepe kuiltjes, in elk waarvan 3 pitten worden gelegd en met zeer weinig grond bedekt. Indien ze alle drie opkomen, behoude men het sterkste plantje en snijde de overigen weg. Indien men vreest voor nachtvorsten, bedekke men de plantjes, zoolang ze niet te groot zijn, met bloempotten. Als ze pas beginnen te klimmen, moet men ze nu en dan aan het latwerk vastbinden.

	p. pakje
Pompoenen, groote gele reuzen . . .	f 0.20

De vruchten dezer verscheidenheid worden dikwijls meer dan 50 kilo zwaar. Men moet ze echter niet te rijp laten worden.

	p. pakje
Pompoenen, Vegetable Marrow	f 0.20


De fijnste soort die in Engeland veel wordt gebruikt.

Sierkalabassen of **Pompoenen**, zie onder de rubriek Bloemzaden: „Zaden van klimplanten."

POSTELEIN.

De postelein houdt van een lichten doch voedzamen grond, en is zeer gevoelig voor koude, zoodat men in den open grond niet moet zaaien vóór begin Mei. Men zaait uit de volle hand of op regels, die dan 15 cM. van elkaar verwijderd moeten zijn, zorgdragende dat het zaad slechts weinig door den grond worde bedekt. Uitdunnen is aan te bevelen. evenals veelvuldig gieten bij droog weder. Om ze een mooie gele kleur te doen verkrijgen, giete men tweemaal per dag in de volle zon, eenige dagen voor dat men begint te snijden. Wil men gedurende den geheelen zomer Postelein in den tuin hebben, zoo zaaie men telkens met tusschenpoozen van 4 weken, totdat men begin Augustus voor de laatste maal zaait.

	p. 5 ons	p. ons
Postelein, gewone groene	f 1.15	f 0.25
„ „ gele	- 1.15	- 0.25
„ breedblad gele	- 1.30	- 0.30



Winterpostelein.

	p. lood
Winterpostelein, (Claytonia perfoliata) . . .	f 0.20

Deze wordt op dezelfde wijze behandeld als de gewone Postelein.

PREI.

De prei heeft, indien men deze groente goed wil kweeken, een flink gemesten grond noodig. Men zaait voor de eerste maal begin Maart op een kweekbed. Zoodra de plantjes de dikte hebben van een pijpesteel, verplant men ze op 20 cM. afstand, in regels die 30 cM. van elkander verwijderd zijn. Vóór het planten worden de wortels ingekort en de uiteinden der bladeren afgesneden. Men laat een gedeelte der

planten op het kweekbed staan; deze zullen dan zeer vroeg voor het gebruik geschikt zijn. Indien men zeer zware prei wenscht te kweeken moet men de regels 10 cM. wijder maken en de uiteinden der bladeren nu en dan inkorten. Door aanaarden worden de stengels over een grootere lengte wit en wordt dus het eetbare gedeelte grooter. Dezelfde resultaten kan men ook verkrijgen door te planten in voren van 10 cM. diep. Zoodra de plantjes geworteld zijn, dient men ze hierin vloeibare mest toe, terwijl men na een paar weken den grond weer gelijk maakt. Voor de tweede maal zaait men einde April, doch alleen winterprei. Deze planten zullen in 't voorjaar niet zoo spoedig doorschieten als de vroeger gezaaide. Om in het voorjaar het doorschieten te voorkomen, neme men ze op en kuile ze dicht opeen in diepe voren.

	p. lood
Prei, lange Fransche zomer	f 0.10
„ dikke Brabantsche winterprei	- 0.10
„ „ Leidsche	- 0.10
„ **Reuzen van Carentan**	- 0.15

Wordt buitengewoon dik en is evenals de Leidsche prei tegen den strengsten winter bestand.

RABARBER.

In Engeland vooral wordt deze groente op groote schaal gekweekt, en daar zij kan worden gebruikt in het voorjaar als er nog weinig andere groente is, verdiende zij ook in ons land meer algemeen te worden aangeplant.

De Rabarber verlangt een diep losgewerkten, goed gemesten grond. Indien men er prijs op stelt mooie gelijksoortige planten te hebben, moet men ze kweeken door wortelstek, want door zaaiing krijgt men gewoonlijk eenige verbastering. Men kan echter zaaien in Maart of April, op regels die ± 30 cM. van elkaar verwijderd zijn. Voor uitdunnen en schoonhouden moet natuurlijk worden gezorgd.


Wil men aanplanten voor het gebruik, zoo geve men de planten een tusschenruimte van 1 meter. Eerst een jaar na de planting kan men beginnen de bladsteelen te snijden. Indien men het licht afsluit door een oude kist of ton of op andere wijze, zoodat de steelen eenigszins gebleekt worden, zoo verbetert dit den smaak. De Rabarber laat zich zeer gemakkelijk forceeren. Men neemt de planten op en plaatst ze in kisten of bakken, waar men maar een matige warmte heeft. Men moet den grond vrij vochtig houden. De zaadstengels moeten intijds worden afgesneden, daar anders de planten te veel verzwakken. De „Paragon" brengt echter geen zaad voort, en is derhalve zeer aan te bevelen.

	p. lood
Rabarber, Queen Victoria, grootbladerige . . .	f 0.15
„ Royal Albert	- 0.20
„ Paragon (geeft geen zaad)	-

Voor **Planten** zie afd. II: „Planten voor den moestuin."

RADIJS.

In de bakken kan men radijs zaaien in Januari en Februari. Op den kouden grond begint men hiermede bij open weder in 't laatst van Februari, voor de tweede maal zaaie men 3 weken later, en vervolgens gedurende den geheelen zomer, zelfs tot laat in den herfst, geregeld om de veertien dagen. In de warme zomermaanden kieze men daartoe een koel en beschaduwd terrein. Zoodra de plantjes opkomen, moeten ze, op plekken waar ze te dicht staan, worden uitgedund. In vele tuinen wordt dit nagelaten, doch dit verzuim is dan gewoonlijk oorzaak, dat ze slechts dunne, spillige wortels voortbrengen. Al naar gelang den tijd des jaar, kan men de radijs 4 à 6 weken nadat gezaaid is, gebruiken.



Radijs „Triumph-broei."

	per ons	per lood
Radijs Triumph-broei. *Nieuw!* . . .	f 0.70	f 0.15

De knol is kogelrond, wit, met horizontale scharlakenroode strepen. Deze soort is echter nog niet geheel constant, maar levert toch een vrij groot aantal echte knollen op, die iedere tafel tot sieraad strekken. — Ofschoon eigenlijk voor de bak bestemd is ze toch ook geschikt voor den vollen grond.

Radijs „IJskegel" *Nieuw* . . . . Per lood f 0.15

Zooals de naam reeds aanduidt heeft deze radijssoort de vorm en de doorschijnende kleur van een ijskegel. De smaak is zeer pikant en maakt haar tot een van de beste soorten.

	p. ons	p. lood
Radijs, „Erste Ernte." *Nieuw!* Ovale vorm	f 0.40	f 0.10
„ **non plus ultra** of ronde scharlakenroode kortlof broei, extra	- 0.40	- 0.10
„ rozeroode kortlof broei . . .	- 0.35	- 0.05
„ scharlakenroode witpuntige broei	- 0.45	- 0.10
„ ronde witte kortlof broei . . .	- 0.35	- 0.05
„ „ scharlakenroode . . .	- 0.35	- 0.05
„ „ roode gewone	- 0.30	- 0.05
„ „ witte „	- 0.25	- 0.05
„ „ roode witpuntige . . .	- 0.35	- 0.05
„ „ gele	- 0.25	- 0.05
„ halflange roode witpuntige . .	- 0.35	- 0.05
„ „ scharlakenroode . .	- 0.35	- 0.05

RAMENAS.

De Ramenas is eene verscheidenheid van de Radijs, doch de meeste varieteiten nemen veel grootere afmetingen aan dan deze, indien men ze laat doorgroeien. De zomer-ramenas wordt gezaaid in Maart en April, doch schiet dikwijls door, waarom men met de winter-ramenas gewoonlijk meer succes heeft. Deze wordt niet vóór Juni gezaaid. Men zaait de

ramenas op regels die 40 cM. van elkaar verwijderd zijn, en men dunt de jonge plantjes zoodanig uit, dat ze op 20 cM. afstand in de regels komen te staan. Men late de wortels niet te dik worden, daar ze dan den aangenamen smaak verliezen. In een koelen kelder kan men de winter-ramenas tot in het voorjaar in zand bewaren.


	p. lood
Ramenas, witte delicatesse	f 0.10

Uitmuntende vroege soort.

Ramenas, ronde zwarte zomer	- 0.10
„ halflange rozeroode chineesche zomer	- 0.10
„ fijne Weener gele zomer	- 0.10
„ ronde zwarte winter	- 0.10
„ lange zwarte winter	- 0.10

RAPEN of KNOLLEN.

Deze gedijen in bijna elken grond. Het best echter op terrein dat het vorige jaar gemest is. Vooral op lichte gronden is het zeer nuttig in het najaar den grond met kalk te bezaaien en dan om te spitten. De vroege soorten zaaie men op een beschutte plaats in 't laatst van Februari of begin Maart en vervolgens telkens om de drie weken tot half Mei. Van af Juni tot Augustus neemt men de latere verscheidenheden. Wanneer men voor de laatste maal zaait is het echter beter om weder Meirapen te nemen. Men zaait uit de volle hand of op regels; volgens de laatste methode maakt men de regels op 25 cM. afstand van elkaar. Voor voldoend uitdunnen moet vooral worden gezorgd, daar men anders geen flinke knollen kan verwachten.



Rapen, Roodkoppige v. Milaan.

	p. lood
Rapen, roodkoppige witte van Milaan	f 0.10

De vroegste raap, die tot heden bekend is met bijzonder dunne schil en zeer fijn van smaak.

	p. lood
Rapen, witte van Milaan	f 0.10

Deze soort heeft zeer veel overeenkomst met de vorige, maar de schil is zuiver wit; ze is ook zeer vroeg en fijn.

	p. ons.	p. lood
Rapen, Italiaansche, vroege witte Mei		f 0.15
„ Münchener fijne vroege witte roodkoppige		- 0.10
„ Vertus (marteau) halflange witte roodkoppige		- 0.10
„ platte witte Mei	- 0.30	- 0.05
„ halflange witte Hilversumsche		- 0.10
„ lange Nijmeegsche witte		- 0.10
„ ronde witte Herfst		- 0.05
„ „ gele „	- 0.15	- 0.05
„ „ witte roodkoppige	- 0.20	- 0.05
RAAPSTELEN . . . p. 5 ons f 0.70	- 0.15	- 0.05

Deze zaaie men in Februari of Maart. Daar men deze groente gewoonlijk te dicht zaait moet hierop vooral worden gelet.

SALADE.

Kropsalade verlangt, evenals de meeste bladgroenten, een goed gemesten grond. Om gedurende den geheelen zomer kropsalade te kunnen snijden, moet men dikwijls zaaien en voor elk jaargetijde de daarvoor meest geschikte soorten nemen. Om vroeg kropsalade te kunnen hebben, zaaie men half September en wel vroege roodrand of bonte Chili. Zoodra de plantjes 3 à 4 bladeren hebben, plant men ze op een beschutte plaats of liever nog in een kouden bak op 10 cM. afstand van elkaar. De ramen moeten, totdat het begint te vriezen, niet op den bak worden gelegd; slechts bij strenge vorst mag worden gedekt, terwijl men veel lucht moet geven. Een dun laagje sneeuw maakt het bedekken ook van de planten die op den kouden grond overwinteren, overbodig. In Maart begint men zoodra het weder zulks toelaat, met het uitplanten op een warme plaats en op 25 cM. afstand onderling. Reeds in Mei beginnen de eerste kroppen zich te vertoonen. Voor het vervroegen in den bak zaaie men eveneens in September, doch kieze dan uitsluitend broeisoorten. Om een opeenvolging van kroppen te verkrijgen, moeten de planten niet alle tegelijk worden uitgeplant. In Maart wordt weder op den kouden grond gezaaid, doch vooral niet te dik. Een gedeelte der plantjes worden uitgeplant, terwijl men de andere van afstand tot afstand laat staan; deze laatste zullen dan eenigen tijd eerder beginnen te kroppen dan de andere. Begin April zaait men nog weer een vroege soort en begint in de laatste helft van April met de latere verscheidenheden te zaaien, met 3 weken tusschentijds, tot einde Juli. De zomerkropsla wordt op 30 cM. afstand onderling uitgeplant.

Snijsalade wordt gewoonlijk in Maart en April gezaaid en wel uit de volle hand of op 10 cM. van elkaar verwijderde regels. Men behoeft er verder geen zorg aan te besteden dan schoonhouden. De Fransche latuw wordt van Januari tot Maart in den bak gezaaid. De **pluksalade** is eene verscheidenheid tusschen de snij- en kropsalade in. Zij is zeer vroeg en geeft dik gezaaid ook eene uitmuntende snijsalade. De losse kroppen die zij vormt (wanneer deze de ruimte hebben om zich te ontwikkelen) leveren gestoofd eene uitmuntende groente. **Bindsalade** wordt in Mei en Juni gezaaid en geheel op dezelfde wijze behandeld als de kropsalade; alleen moet ze evenals de andijvie worden opgebonden, om het geel worden der binnenste bladeren te bevorderen. De teelt der **veldsalade** is zeer eenvoudig; men zaaie einde Augustus of begin September, en zorge bij tijds voor voldoend uitdunnen. Zij groeit in bijna elken niet te drogen grond.

	p. lood
Kropsalade, Wheelers's Tom Thumb, beste broei	f 0.15
„ vroege kleine gele broei	- 0.10
„ „ „ roodrand	- 0.10
„ gewone groote gele	- 0.10
„ bonte Chili, echt	- 0.15

Op alle gronden, doch vooral op zandgrond, is deze soort de kropsalade bij uitnemendheid. Zij kan gedurende den geheelen zomer worden gezaaid en vormt groote zeer malsche kroppen, die niet spoedig doorschieten. De bladeren zijn eenigszins roodachtig gerand.


	p. lood
Kropsalade, Berlijnsche witte	f 0.10
„ Rotterdammer blanke	- 0.10
„ Duitsche groote gele	- 0.10
„ Zwijndrechtsche groote	- 0.15
„ Zeeuwsche blanke	- 0.10
„ Goudforellen	- 0.15
„ Nansen, groote late en ook voor wintergebruik	- 0.15

		p. lood
Kropsalade,	Perpignaner Dauerkopf	f 0.15
„	Erfurter groote gele reuzenkrop .	- 0.15

Deze uit Erfurt ingevoerde kropsalade vormt buitengewoon groote vaste kroppen en laat aan duurzaamheid en zachtheid niets te wenschen over.

Kropsalade Matador. Zie Nieuwigheden.

		p. 5 ons	p. ons
Snijsalade,	Fransche latuw	f 0.90	f 0.20
„	blanke dunsel, fijne vroege	- 0.70	- 0.15
„	kruldunsel	- 0.90	- 0.20



Californische pluksalade.

		p. lood	p. ons
Pluksalade,	Amerik. roodrand	f 0.15	f 0.50
„	Australische gele	- 0.15	- 0.50
„	Calisornische gele	- 0.15	- 0.70
Veldsalade,	groote N.-Holland p. 5 ons f 0.60		- 0.15
„	donkergroene met vol hart .	- 0.05	- 0.20

Bij deze verscheidenheid groeien de bladeren in rozetjes, zoodat zij gelijken op kleine kropjes. Door hare malschheid munt zij bijzonder uit.

	p. lood
Veldsalade, Goldherz. *Nieuw!*	f 0.20

Deze plant onderscheidt zich hierdoor van de andere soorten, dat, terwijl de buitenbladeren groen blijven, het geheele midden een goudgele kleur heeft; vandaar de naam „Goldherz." De bladeren zijn zeer malsch en heerlijk van smaak.

		p. lood
Molsalade,	verbeterde extra vroege	f 0.30
„	„ volhart	- 0.25

Van deze beide soorten heeft de eerste de eigenschap van zeer vroeg te zijn, terwijl de andere een groote menigte bladeren voortbrengt en zich zeer gemakkelijk laat bleeken. De kweekwijze van molsla is zeer eenvoudig. Men zaait ze in Maart of April en verplant ze in Mei of Juni op regels, die 35 cM. van elkaar verwijderd zijn. Men kan ze bleeken door in den herfst op elke plant een bloempot te zetten of het bed met zand te bedekken. Zij kan echter ook als de cichorei worden bahandeld.



Bindsalade.

	p. lood	p. ons
Bindsalade, geelbladerige	f 0.15	f 1.—

SCHORSENEEREN.

Zaai einde Maart op regels die 20 cM. van elkaar verwijderd zijn. De plantjes worden tot op 10 cM. afstand onderling uitgedund. De schorseneer verlangt een voedzamen, ofschoon niet versch gemesten grond, welke diep moet zijn omgespit. Op koude en zware gronden zaaie men omstreeks half Augustus. De jonge plantjes zijn niet zeer gevoelig voor vorst, en beginnen vroeg in 't voorjaar weer te groeien; deze worden zwaarder dan die, welke in 't voorjaar zijn gezaaid. Gewoonlijk kan men echter, door in 't voorjaar te zaaien, reeds in 't najaar flinke wortels verkrijgen, vooral als men Reuzenschorseneeren zaait. Als alle wortels in 't voorjaar niet zijn gebruikt, kan men de overgeblevene laten staan, en kunnen ze in 't volgend najaar nog worden gebruikt, ofschoon ze niet zoo malsch en smakelijk zijn als de eenjarige.

		p. ons
Schorseneeren,	gewone zwarte	f 0.40
„	**lange zwarte Russische Reuzen**	- 0.50
„	**Vulcan.** Zie Nieuwigheden.	

SELDERIJ.

De selderij houdt van een frisschen, voedzamen, goed gemesten grond, die liever vochtig dan droog moet zijn. Het zaad moet evenals dat van de Peterselie lang in den grond liggen eer het opkomt.

Tuin- en Snijselderij zaait men begin April op den kouden grond. Bij aanhoudende droogte moet men zoo noodig gieten. Als de plantjes 4 à 5 blaadjes hebben, worden ze verplant en vereischen dan verder geen bizondere zorgen.


Bleekselderij. Om vroeg planten te kunnen hebben, zaaie men in Februari onder glas, of (als men daarvoor geen bak disponibel heeft) einde Maart in den open grond. Als de plantjes nog klein zijn worden ze in den bak verspeend en na een week of 4 op den kouden grond uitgeplant. In de meeste tuinen wordt de bleekselderij in diepe voren geplant; om dit met succes te kunnen doen, moet men hoog gelegen terrein en een dikke laag teelaarde hebben, daar anders de planten licht gaan kwijnen. Meer is het daarom aan te bevelen om op bedden te planten met 3 regels welke 30 cM. van elkaar verwijderd zijn. In de regels behoudt men denzelfden afstand tusschen de planten onderling. Daar men voor het bleeken veel aarde noodig heeft, laat men tusschen de bedden een strook grond open van 75 à 80 cM. breed, welke men voor radijs, spinazie enz. kan benuttigen. Wanneer de planten bijna haar volkomen wasdom hebben bereikt, bindt men bij droog weder de bladeren van elke plant bij elkaar en strooit met een schop de aarde uit de

overgebleven ruimte, tusschen de planten, zoodat ze ongeveer tot op de helft zijn ingegraven. Na een dag of tien begraaft men ze zoodanig onder de aarde dat alleen de toppen der bladeren zichtbaar zijn. Na een veertien dagen zijn ze geschikt voor de keuken, en daar ze in dien toestand niet lang kunnen duren moet men niet te veel planten tegelijk bleeken en telkens met 14 dagen tusschenpoozen.

Knolselderij wordt op dezelfde wijze gezaaid als de vorige, doch opdat de knol zich flink kan ontwikkelen moeten de planten een weinig meer ruimte hebben, en plante men uit op 40 cM. afstand in alle richtingen. Om zware knollen te verkrijgen wordt aanbevolen, om gedurende den zomer een paar malen de horizontale wortels met een spade af te steken, zorg dragende de dieper liggende niet te beschadigen. Indien men ze vóór den vorst in een koelen kelder plaatst kan men ze gedurende den geheelen winter bewaren.

p. lood

Tuinselderij, fijne snij . . . . f 0.10
„ gewone snij . . . . - 0.10



Bleekselderij, Engelsche grove.

p. lood

Bleekselderij, Engelsche grove . . . . f 0.15
„ **Golden Self blanching** . . . . - 0.15
„ White Plume . . . . - 0.15
Knolselderij, dikke kortlof . . . . - 0.10
„ **Reuzen van Praag** . . . . . . - 0.15

Brengt buitengewoon groote knollen voort.

SJALOTTEN.

Men plante de sjalotten zoo vroeg mogelijk na den winter op regels die 25 centim. van elkaar verwijderd zijn, terwijl de bolletjes op 10 centim. afstand onderling komen te staan, zorgdragende dat de bovenste helft derzelve boven den grond uitkomt. Ze vereischen een voedzamen doch liefst niet versch gemesten grond. Begin Juli kan men ze optrekken en vóórdat men ze naar een drooge plaats of zolder brengt, laat men ze eenige dagen in de zon drogen.

p. kilo

Sjalotten, om te planten . . . . f 0.30

SPINAZIE.

Van deze algemeen bekende groente valt weinig bizonders te vermelden. De zomerspinazie en reuzenspinazie zaaie men in Februari, Maart en April, telkens om de 2 à 3 weken; de winterspinazie in September tot begin October, en wel op 25 cM. van elkaar verwijderde regels. Om een goede opbrengst te verkrijgen moet flink worden gemest.

p. 5 ons

Spinazie, breedblad, scherpzaad zomer . . . . f 0.20
„ „ rondzaad winter . . . . - 0.20
„ **Reuzenblad van Viroflay** . . . . . - 0.50
„ laat doorschietende . . . . - 0.30
„ Victoria, donkergroene zomer . . . - 0.40

Uitmuntende soort voor den zomer, die niet spoedig doorschiet.

Overblijvende Spinazie (Rumex Patientia)
per ons f 0.30, per lood f 0.10

Deze behoort tot hetzelfde geslacht als de Zuring en wordt geheel op dezelfde wijze gekweekt.

Nieuw-Zeelandsche Spinazie
(Tetragonia expansa) per lood f 0.10

Wordt gezaaid in Mei en vereischt weinig zorg.

STACHYS TUBERIFERA.

Deze groente werd vóór eenige jaren uit Japan ingevoerd doch heeft niet aan de hooggespannen verwachting, namel. dat zij spoedig de aardappel zou verdringen, beantwoord. Toch is zij niet geheel te verwerpen, dewijl ook de kweekwijze hoogst eenvoudig is. Men plant de knolletjes, die des winters in zand worden bewaard, in Maart of begin April uit op onderlingen afstand van 30 à 40 cM. Einde October zijn ze voor 't gebruik geschikt. Ze worden toebereid op dezelfde wijze als schorseneeren. Ook kan men ze evenals Augurkjes in 't zuur leggen.

Stachys tuberifera, Japansche Andoorn, p. 5 ons f 0.20

TOMATEN.

Zonder kunstmatige warmte kan de Tomaat zich in ons land niet volkomen ontwikkelen. Omstreeks half Maart zaaie men in een warmen bak, en zoodra de plantjes 3 bladeren hebben, worden ze in een anderen bak verspeend op 12 cM. afstands in alle richtingen. In 't begin van Mei neemt men over dag de ramen af om de planten langzamerhand aan de lucht te gewennen. In de laatste helft van Mei plant men ze uit in den open grond. Om het zetten der vruchten te bevorderen, moeten de loten nu en dan worden ingenepen. Zoodra de vruchten zich hebben gezet, moet men dikwijls gieten.

Tomaten „Phänomen", zie onder Nieuwigheden.



Tomaten, vroege roode dwerg.

	p. pakje
Tomaten, vroege roode dwerg	f 0.15
„ groote roode	- 0.15
„ groote gele	- 0.20
„ **President Garfield**	- 0.20

Reuzen-tomaat; groeit tot 2 meter hoog en brengt enorme scharlakenroode vruchten voort.

	p. pakje
Tomaten, vroege voor den vollen grond	f 0.20

Deze soort kan buiten op een warm plekje worden gekweekt, mits vroeg uitgezaaid. Zij is zeer rijkdragend en geeft goed gevormde vruchten.

	p. pakje
Tomaten, Perfection	f 0.20

Wordt buitengewoon groot; vruchten rond en levendig rood gekleurd.

	p. pakje
Tomaten, à tige raide de Laye	f 0.20

Deze wordt ook Boom-tomaat genoemd, daar zij stevige, stijlovereind staande stengels heeft, en dus niet behoeft te worden opgebonden.

	p. pakje
Tomaten, Mikado	f 0.20

Met kolossale scharlakenroode vruchten.

TUINKERS.

De Tuinkers zaait men gewoonlijk in Februari en Maart, ofschoon men dezelve gedurende den geheelen zomer kan zaaien, doch dan liefst op eenigszins beschaduwd terrein. Geene plant is gemakkelijker te kweeken dan deze.

	p. 5 ons	p. ons	p. lood
Tuinkers, gewone	f 0.40	f 0.15	f 0.02⁵

UIEN.

De Ui is een der weinige groenten, die men met succes eenige jaren achtereen op denzelfden grond kan kweeken, indien men er de noodige zorgen aan besteedt. Voor bemesting moet men vooral geen ruwe bestanddeelen nemen, zooals versche stalmest enz. Kippen- of duivenmest, guano- of goed verteerde stalmest is het meest aan te raden. Wanneer de grond voor het zaaien gereed is, wordt aanbevolen om een mengsel van roet en zout er zeer dun over te zaaien. Men zaait uit de volle hand of op regels, welke dan, naar gelang der soorten, 10 tot 15 cM. van elkaar moeten verwijderd zijn, zorgdragende dat het zaad niet te diep door den grond worde bedekt. De plantjes worden tot op 10 à 12 cM. afstand onderling uitgedund. Om zeer vroeg uien te hebben. zaait men in de laatste helft van Augustus tamelijk dik. Gedurende den winter beschut men ze tegen koude en schrale winden, door eenig erwtenrijs zorgvuldig over de bedden te leggen. Indien men deze plantjes vroeg in 't voorjaar, zoodra de grond dit toelaat, verplant op 30 cM. van elkaar verwijderde regels en 15 cM. onderlingen afstand, zoo zijn ze bij een goede behandeling reeds in Augustus voor 't gebruik geschikt. Voor deze methode eigent zich in 't bijzonder de Zwijndrechtsche groote gele, die een enorme grootte kan verkrijgen. De kleine witte uitjes voor den inmaak zaait men in Maart vrij dik, en indien men regelmatig gezaaid heeft, behoeft men niet te dunnen; deze kunnen reeds in Juli geoogst worden.

	p. lood
Uien, platte stroogele N.-Hollandsche	f 0.10
„ „ **groote gele Zwijndrechtsche**	- 0.15

Voor *planten* dezer soort zie onder afdeeling II. B. Groenteplanten.

	p. lood
Uien, platte bloedroode Hollandsche	f 0.10
„ bruine Zeeuwsche	- 0.10
Uien, groote witte Fransche	f 0.10
„ vroege witte St. Jans (inmaak)	- 0.15
„ kleine zilverwitte Italiaansche (inmaak)	- 0.15
„ Lissabonsche witte	- 0.10
„ groote ronde Madera	- 0.15
„ Zittauer ronde gele reuzen	- 0.10
„ Reuzen van Rocca	- 0.15
„ **Egyptische** of **Rocambole,** kleine bollen om uit te planten, per ons	f 0.40

Deze laatste verscheidenheid heeft een zeer eigenaardige groeiwijze. Men plant de bolletjes in het voorjaar op denzelfden afstand als gewone uien. Ze brengen dan tegen het najaar flinke uien voort. Deze kan men gedurende den winter bewaren, de grootste kan men dan gebruiken, en de kleinste worden in het voorjaar uitgeplant. Deze brengen dan het volgende jaar in plaats van zaad, boven aan de stengels kleine bolletjes voort, die dan weer worden uitgeplant om groote uien te leveren

WATERKERS.

De Waterkers is eene plant, die in sommige streken van ons land ook in 't wild voorkomt, vooral op vochtige plaatsen. Men zaait op een vochtige plaats in April, zorgdragende veel te gieten, daar ze zonder veel water niet dien aangenamen geur heeft. In Engeland vooral wordt de Waterkers veel gebruikt met een weinig zout bij het ontbijt. De smaak is zeer geurig en het is een zeer gezonde groente.

	p. lood
Waterkers	f 0.20

WORTELEN.

Wortelen zaaie men, evenmin als alle wortelgroenten, niet op versch gemesten grond, daar ze anders dikwijls scheef groeien en splijten. In den bak zaaie men voor de eerste maal einde December, en vervolgens half Januari en half Februari. Men neme alleen de broeisoorten. Op deze wijze kan men de keuken van April tot Juni van wortelen voorzien. In den open grond zaait men voor de eerste maal in de maand Maart een der broeisoorten. Om een geregelde opeenvolging van jonge malsche wortelen in den tuin te kunnen hebben, moet men dit alle vier weken herhalen, en telkens die verscheidenheden nemen welke voor den tijd des jaars het meest geschikt zijn. Het zaaien geschiedt zoowel uit de volle hand als op rijen, die men dan dicht naast elkaar kan maken. Na het zaaien moet de grond flink worden aangetreden, daar anders de zaadkorrels door de kromme haren waarmee ze voorzien zijn, niet genoeg met de aarde in aanraking komen. Wanneer de plantjes 3 à 4 blaadjes hebben, dunt men ze zoodanig uit dat ze een onderlingen afstand van 3 à 4 cM. hebben, waarna het goed is nog eens aan te treden. In 't begin van Juli zaait men voor de laatste maal, en van dit of van een der laatste zaaisels kan men dikwijls gedurende een groot gedeelte van den winter smakelijke jonge wortelen plukken, indien men ze met een dikke laag droge bladeren voor den vorst bedekt. De winterwortelen zaait men in Mei.

	p. ons	p. lood
Wortelen, Parijsche ronde roode broei	f 0.50	f 0.10
„ **Amsterd. halflange stomppuntige roode broei**	- 0.60	- 0.10

Voor den broeiteelt is deze de wortel bij uitnemendheid, en wordt door geen enkele andere soort overtroffen. De schoon gevormde roode stomppuntige wortelen hebben bijna geen hart en munten uit door zoeten en aangenamen smaak. Ook kan zij zeer goed op den kouden grond worden gezaaid, en is dan eveneens zeer vroeg. Door deze uitmuntende hoedanigheden wordt zij terecht hoe langer zoo meer gezocht.

	p. ons	p. lood
Wortelen, korte roode deuvik of broei .	f 0.45	f 0.10
„ dubbele deuvik	- 0.60	- 0.10
„ halflange van Carentan . .	- 0.50	- 0.10

Uitmuntende stomppuntige wortel, zoowel voor de bak als voor den vollen grond, die vroeg rood wordt.

	p. ons	p. lood
Wortelen, Zwijndrechtsche vroege korte roode	f 0.50	f 0.10
„ Utrechtsche korte roode . .	- 0.50	- 0.10
„ vroege fijne roode glas . .	- 0.60	- 0.10
„ halflange stomppuntige roode van Nantes	- 0.50	- 0.10
„ Hoornsche halflange roode .	- 0.40	- 0.10
„ halflange stomppuntige . .	- 0.40	- 0.10

Voor herfstgebruik en voor winterwortel is deze bizonder geschikt.

	p. ons	p. lood
Wortelen, Brunswijker halflange . . .	f 0.40	f 0.10
„ Nijmeegsche lange roode winter	- 0.40	- 0.10
„ Leidsche „ „ „	- 0.40	- 0.10
„ Friesche stompe „ „	- 0.50	- 0.10
„ witte of patinaken	- 0.15	- 0.05

ZURING.

Men zaait in April op regels en dunt na eenigen tijd zoodanig uit dat de planten 20 centim. van elkaar verwijderd komen te staan. Twee maanden nadat men gezaaid heeft, kan men reeds beginnen eenige bladeren te plukken. In ons land wordt de zuring echter hoofdzakelijk vroeg in 't voorjaar gesneden. Ofschoon men de zuring zeer goed uit zaad kan kweeken, is het toch raadzamer om planten te nemen met enkel mannelijke bloemen, daar deze geen zaad voortbrengen en daardoor een grooteren opbrengst aan forsche breede bladeren geven. Voor die planten zie Afd. II. B. Planten voor den moestuin.

	p. lood
Zuring, breedblad of nobel	f 0.15

DIVERSE ZADEN.

	p. ons	p. lood
Anijs	f 0.20	f 0.05
Basilicum		- 0.10
Boonenkruid	- 0.20	- 0.05
Cardonzen . . . . p. pakje f 0.20		
Citroenkruid		- 0.15
Dessertblad (Malva Crispa)		- 0.10
Dille		- 0.10
Dragon Russische . . p. pakje f 0.30		

Deze komt veel overeen met de echte overblijvende dragon, doch heeft niet die aangename geur. De echte dragon brengt nooit rijpe zaden voort, en kan alleen door stekken of afleggers worden gekweekt. Voor planten zie Afd. II. B. Planten voor den moestuin.

	p. ons	p. lood
Kervel	f 0.30	f 0.10
Komijn	- 0.30	- 0.10
Lavendel		- 0.15
Lepelblad		- 0.10
Lieve-vrouwe-bedstroo p. pakje f 0.15		- 0.60
Majoraan		- 0.15
Melde		- 0.05
Mosterd		- 0.10
Peper, Spaansche		- 0.10
Pimpernel		- 0.10
Raapstelen . . . . p. 5 ons f 0.70	- 0.15	
Rozemarijn		- 0.25
Salie		- 0.15
Snijmoes, blauwe Groninger	- 0.15	- 0.05
Thijm		- 0.20
Venkel		- 0.10
Wijnruit		- 0.15

B. LANDBOUWZADEN.

GRASZADEN.

(Voorloopige prijzen.)

Daar de prijzen niet voor **begin Februari** definitief worden vastgesteld, verschijnt eerst tegen dien tijd mijn prijscourant van Gras- en Klaverzaden. Tot het verschijnen van deze prijscourant gelden de hieronder vermelde voorloopige prijzen.

Voor het aanleggen van weiden gelieve men dienaangaande met mij in correspondentie te treden, en daartoe de grootte van het terrein, en de gesteldheid van den bodem op te geven. Ook dient het te worden in aanmerking genomen, of men blijvend weiland wenscht of den wisselbouw toepast. Opgaaf der benoodigde soorten, hoeveelheden en prijsopgaaf wordt door mij gaarne verstrekt, en alle mogelijke inlichtingen daaromtrent gegeven.

Voor minstens 10 Kilo graszaad wordt de prijs per 100 Kilo berekend.

	p. 100 kilo	p. kilo
Engelsch Raygras, Lolium perenne	f 30.—	f 0.35
Italiaansch „ „ italicum	- 35.—	- 0.40
Westerwoldsch Raygras	- 40.—	- 0.50
Fioringras, Agrostis stolonifera . .	- 100.—	- 1.20
Vossestaart, Alopecuris pratensis .	- 110.—	- 1.25
Reukgras, Anthoxanthum odoratum	- —.—	- 5.80
Fransch Raygras, Avena elatior .	- 90.—	- 1.10
Kamgras, Cynosurus cristatus . .	- 180.—	- 2.—
Kropaar, Dactylus glomerata . . .	- 70.—	- 0.85
Hard Zwenkgras, Festuca duriuscula	- 70.—	- 0.85
Rood Zwenkgras, Festuca rubra .	- 72.—	- 0.85
Schapegras, Festuca ovina . . .	- 70.—	- 0.85
Beemdlangbloem, Festuca pratensis.	- 105.—	- 1.20
Thimotheegras, Phleum pratense .	- 55.—	- 0.65
Boschbeemdgras, Poa nemoralis . .	- 280.—	- 3.—
Veldbeemdgras, „ pratensis . .	- 60.—	- 0.75
Ruwbeemdgras, „ trivialis . .	- 110.—	- 1.30
Gazongras, in de beste soorten gem.	- 80.—	- 0.95

KLAVERZADEN.

(Voorloopige prijzen.)

	p. kilo
Noord-Brabantsche roode	f 1.—
Rozendaalsche roode	- 1.20
Inlandsche witte	- 1.10
Luzerne Provencer	- 1.—
Zweedsche bastaard	- 1.20
Incarnaat	- 0.50
Gele Hoppeklaver	- 0.50

ZADEN VAN WORTELGEWASSEN.

	p. kilo	p. ons
Mangelwortelen, Groninger extra lange roode	f 0.50	f 0.10
„ **Mammouth roode reuzen**	- 0.55	- 0.10
„ extra lange gele reuzen	- 0.55	- 0.10
„ Golden Tankart	- 0.65	- 0.10
Suikerwortelen, Silezische witte	- 0.45	- 0.10
„ rosékoppige	- 0.50	- 0.10
„ Jaapjespeen, rose	- 0.50	- 0.10
„ Verbeterde klein-Wanzlebèner	- 0.80	- 0.15
Koolrapen, groote gele blauwkop	- 1.50	- 0.20
„ gewone gele	- 1.50	- 0.20
„ Engelsche Swedes	- 1.50	- 0.20
Knollen of Rapen, gewone gele herfst	- 1.—	- 0.15
„ „ „ Hollandsche witte roodkop	- 1.40	- 0.20

	p. ons	p. kilo
Turnips, lange witte roodkoppige	f 1.20	f 0.20
„ groote gele „	- 1.20	- 0.20
Voederwortelen, Nijmeegsche lange roode	- 3.60	- 0.40
„ groote roode paarde of koepeen	- 2.50	- 0.30
„ lange witte of pinksternakels	- 0.90	- 0.15

ZADEN voor den GROENVOEDERBOUW.

(Voorloopige prijzen.)

	p. 100 kilo	p. kilo
Esparsette, (Onobrychus sativa)	f 30.—	f 0.40
Lathyrus sylvestris Wagneri, (per ons f —.—)		- —.—
Lupinen, blauwe (Lupinus angustifolius)	- 15.—	- 0.20
„ gele, (Lupinus luteus)	- 12.—	- 0.20
„ overblijvende, (Lupinus polyphyllus)	- —.—	- 2.25
„ witte, (Lupinus albus)	- —.—	- —.—
Mais, Amerik. Paardentand	- —.—	- —.—

De prijs hiervan kan eerst in Februari of Maart worden opgegeven.

	p. 100 kilo	p. kilo
Chineesche Radijs, (Raphanus sativus oleiferus)	f 80.—	f 1.—
Serradella, (Ornithopus sativus)	- —.—	- —.—
Spurrie, gewone (Spergula arvensis)	- 24.—	- 0.35
„ reuzen („ maxima)	- 26.—	- 0.35
Wikke, gewone (Vicia sativa)	- 25.—	- 0.35
Zandwikke, (Vicia villosa)	- 40.—	- 0.50

C. BLOEMZADEN.

Tot versiering onzer bloemtuinen komen hoe langer zoo meer de éénjarige Zomerbloemen in gebruik, en m. i. zeer terecht. Door doelmatige keuze der soorten en elkaar opvolgende uitzaaiingen kan elk bloemenliefhebber, die een eenigszins gunstig gelegen stukje tuingrond heeft, zich gedurende den geheelen zomer tot laat in den herfst van bloemen voorzien, ook zonder dat hij over een serre of broeibak kan beschikken.

Collectiën Bloemzaden.

Voor hen die met de keuze der soorten minder goed bekend zijn, heb ik evenals vorige jaren eenige collectiën samengesteld van verschillende soorten Zomerbloemen, waaronder Asters, Zomerviolieren, Balsaminen, Portulaca, Klimplanten, Stroobloemen of Immortellen, Siergrassen enz. tegen de volgende uiterst lage prijzen.

Collectie						
Collectie	A.	10 pakjes in 10 soorten,	Zomerbloemen	naar mijne keus	f 0.90
„	B.	20 „ „ 20 „	„	„ „ „	- 1.50
„	C.	40 „ „ 40 „	„	„ „ „	- 2.50
„	D.	10 „ „ 10 „	Stroobloemen of Immortellen	„ „ „	- 0.80
„	E.	10 „ „ 10 „	Klimplanten	„ „ „	- 0.80
„	F.	10 „ „ 10 „	welriekende Zomerbloemen	„ „ „	- 0.80
„	G.	10 „ „ 10 „	Siergrassen	„ „ „	- 0.80
„	H.	12 „ „ 12 „	voor bijenvoeder (elk 10 gram)	„ „ „	- 1.25

N.B. Van de bloemzaden **kan geen kleinere hoeveelheid dan één pakje** worden afgeleverd, daar deze te voren worden afgewogen en gereedgemaakt en het dus te tijdroovend zou zijn om in den drukken tijd van de verzending halve pakjes te maken.

De beste nieuwe Invoeringen voor 1902.

AQUILEGIA HELENAE.

per pakje f **0.50**.



Aquilegia Helenae.

Prachtige kruising tusschen A. flabellata nana alba en A. Coerulea van 30 - 40 cM. hoog, met sierlijk blad, dat aan Coerulea doet denken en met groote, elegante bloemen van eene prachtige diep blauwe kleur, met witte bloemkelk. Goed bestand tegen koude, voortreffelijke snijbloem, ook zeer geschikt om te forceeren.

Surprise Aster „Sonnenlicht."

per pakje f **0.60**.



Surprise Aster „Sonnenlicht."

Met deze soort wordt de eerste werkelijk zuiver gele Aster van schoone zwavelgele kleur in den handel gebracht, welke in geen enkelen tuin en bij geen Astervriend ontbreken mag, wegens hare voortreffelijkheid als snijbloem en sierplant. De groeiwijze is even als die der oude Chrysanthemum-Asters en de bloemen ongeveer als die van de Juweel-Asters. Deze soort behoeft geen verdere aanbeveling om als nieuwigheid van den eersten rang betiteld te worden.



Comeet-Aster, Kaiserin Friedrich.


COMEET-ASTER, Kaiserin Friedrich.

per pakje . . . f **0.50**.

Als eene reuzenbloemige pot-Comeet-Aster beveelt de winner deze nieuwe sneeuwwitte dwerg-Aster aan. De bloemen hebben eene doorsnede van 10—12 cM., zijn hoog gewelfd en van het zuiverste wit. De vorm is gedrongen en forsch. De schoone middelbloemen gezeten op bizondere krachtige stengels, zijn omgeven door 8—12 schoongevormde nevenbloemen, schitterend evenals de veeren eener zwaan. Zij brengt eene schitterende totaalindruk teweeg, zoodat deze eene der beste nieuwe invoeringen van dit jaar is.

STRALEN-ASTER, donkerblauw,

per pakje . . . f **0.45**.




Stralen-Aster, donkerblauw.

Van deze zoo algemeen bemind geworden Aster-vorm, met hare interressante, naaldvormige bloembladen, wordt hiermede eene nieuwe kleur ingevoerd, welke zich zeker vele vrienden verwerven zal.

Begonia semperfl. hybr. fl. pl.

per pakje f **0.25**.



Begonia semperfl. hybr. fl. pl.

Nieuwe dubbele variëteit van onze bemind gewordene Begonia Semperflorens. De kleuren variëeren van het zuiverste wit tot diep donkerrood en zijn zoowel geschikt voor beplanting van groepen als voor potcultuur.

Belles perennis delicata fl. pl.

Per pakje . . . . f **0.40**.



Bellis perennis delicata fl. pl.


De dichtgevulde bloemen dezer nieuwe soort zijn roodachtig wit met helder purperen centrum, eene zeer schoone en zachte kleur.

Zoowel geschikt voor groepen als ook voor snijbloem.

De zaailingen geven circa 60 °/₀ echte planten.

CELOSIA SPICATA.

Per pakje . . . . f **0.35**.



Celosia spicata.

Deze prachtige plant, welke men in langen tijd niet gezien heeft verschijnt dit jaar weer in den handel. Ze vormt slanke forsche rechtopgroeiende pyramiden van circa

75 cM. hoog. Uit den krachtigen hoofdstam ontwikkelen zich 20 tot 30 zijtakken, met sappig, groene bladeren en ieder dezer zijtakken eindigt in eene 6 tot 10 cM. lange aar. Bij het begin van den bloei is de kleur hiervan helder rose, terwijl bij het verdere ontwikkelen der bloemen, de onderste bloempjes in zilverwit overgaan, waardoor eene hoogst interesante kleurencombinatie ontstaat. De bloemen blijven zelfs bij ongunstig weer zeer lang goed en kunnen gebruikt worden zoowel voor snijbloemen als om te droogen, terwijl de planten geschikt zijn voor potcultuur zoowel als voor den vollen grond.

Chrysanthemum maximum praecox.

Nieuwe vroegbloeiende grootbloemige Marguerite.

Per pakje . . . . f **0.45.**

Deze nieuwe Chrysanthemum maximum is, wat grootte betreft, gelijk aan de oude bekende vorm. Zij heeft echter het groote voordeel ruim 3 weken eerder te bloeien, wat haar eene zeer hooge waarde geeft.



Chrysanthemum maximum praecox.



Dianthus Heddewigi nobilis.

Dianthus Heddewigi nobilis

„KONINGSANJELIER"

per pakje f **0.20.**

Nieuwe invoering van verleden jaar van groote waarde. De bloemen zijn enkel, van schitterende kleuren in purperroode en heldere schakeeringen, eigenaardig gedraaid en gefranjerd en dikwijls tot 10 cM. in doorsnede. De planten groeien hoog en leveren een bij uitstek geschikt bindmateriaal. De bloemen blijven afgesneden onberispelijk schoon gedurende acht dagen. Met recht de schoonste van alle enkele Anjelieren.

Erigeron Grandifl. elatior.

(Afbeelding zie onder Vaste Planten.)

per pakje f **0.45.**

Deze uit Noord-Amerika afkomstige nieuwe varieteit draagt reeds in Mei op circa 30—40 cM. hooge bloemstengels hare prachtige schoongevormde mat-lilakleurige straalbloemen. Eene vaste plant van hooge waarde in een tijd waarin bloemenmateriaal schaars is.

Onopordon bracteatum.

per pakje . . . . . f **0.20.**



Onopordon bracteatum.

Zeldzame uit Klein-Azië ingevoerde plant met schoone zilverwitte van stekels voorziene bladeren, welke 50 tot 60 cM. lang zijn en omstreeks 20 cM. breed. In het tweede jaar ontwikkelt zich uit het dichte bladerenrozet een circa 2 M. hooge bloemstengel op regelmatige afstanden bezet met 20 tot 30 bloemknoppen, die voor en na met eene purperlilakleur bloeien. Door hare schoone zilverwitte bladeren is deze zeer geschikt voor gazonplant of voor groepen voor houtpartijen.

Primula Arctotis hybriden,

Ronsdorfer Hybriden.

per pakje . . . . . f **0.50.**



Primula Arctotis hybr. Ronsdorfer Hybriden.

Door kruising tusschen Primula Arctotis Alba en beste Alpen-Primula's is een geheel nieuw Primula-ras ontstaan. De planten groeien gedrongen en krachtig en brengen zeer vroeg in het voorjaar kortgesteelde dichte bloemtrossen voort. De kleur variëert van het zuiverste wit door alle schakeeringen van rose en lila tot het helderste karmijn- en purperrood. Ook crême, zwavelgele en goudgele kleuren bevinden zich er tusschen.

Rudbeckia bicolor superba semiplena,

per pakje . . . . . f **0.45**.




Rudbeckia bicolor superba semiplena.

Uitmuntende snijbloem. De bloemen hebben een doorsnede van 6—8 cM. en zijn gedeeltelijk halfdubbel, gedeeltelijk goed gevuld. Ze zijn op lange losse stengels gezeten en goudgeel van kleur met helder bruine vlekken.

Viola tricolor maxima Psyche,

per pakje . . . . . f **0.90**.



Viola tricolor maxima Psyche.

Prachtige nieuwigheid van violetblauwe kleur met witte regelmatig gekrulde randen en schoone groeiwijze.

De voornaamste Nieuwe Invoeringen van het vorige jaar.




Arctotis grandis.

ARCTOTIS, grandis

per pakje . . . . . f 0.40.

Deze prachtige, uit Zuid-West-Afrika ingevoerde plant wordt zeer gemakkelijk gekweekt en groeit ongeveer 70 cM. hoog. Zij bloeit den ganschen zomer tot laat in den herfst met groote bloemen, die een doorsnede hebben van 7—8 cM. De straalbloemen zijn zuiver wit met een smalle, gele ring van onderen, terwijl de helderblauwe met witte meeldraden bezette schijfbloemen daarbij prachtig afsteken. De min of meer vederachtige bladen zijn witachtig behaard.






Aster, Koning Humbert, wit.

ASTER, Koning Humbert, wit, . . per pakje f 0.65

Deze schoone reuzen-Dwerg-Comeet-Aster wordt ongeveer 30 cM. hoog en brengt eene menigte zuiver witte kolossale bloemen voort, die een doorsnede van 12 cM. bereiken.

PHOENIX-ASTER „Jungfräulein" . per pakje f 0.45

De nieuwe klasse van de Phoenix-Asters gelijkt het meest op de Victoria-Asters, maar de bloemen zijn schooner gebouwd, en meer en hooger gewelfd. De bovengenoemde heeft eene prachtige witte, licht rose getinte kleur. Voor snijbloemen zeer aan te bevelen.



Struisveder-Aster.

STRUISVEDER-ASTER, zalmkleurig rose, vroegbloeiend,


per pakje . . . . f 0.45.

De bloemen hebben een doorsnede van 10—12 cM. en ze bloeit met de allervroegste soorten.

STRUISVEDER-ASTER, roodachtig lila, p. pakje f 0.35

„ „ **helder blauw,** „ „ - 0.35

Deze nieuwe kleuren van de Struisveder-Aster verdienen een plaats naast de in het vorige jaar in den handel gebrachte.



Chrysanthemum carinatum „Stern von Thüringen."

CHRYSANTHEMUM CARINATUM, „Stern von Thuringen" . . . . per pakje f 0.35

Deze prachtige nieuwigheid bloeit den geheelen zomer tot de vorst komt, met stervormige bloemen, die zuiver wit, geel, purper- of karmijnrood gekleurd zijn. Deze nieuwe variëteit sluit niet zooals de andere Chrysanthemum carinatum variëteiten de bloemen des nachts, maar blijft dag en nacht gelijk. Hierdoor en ook door hare zeldzame schoonheid zeer geschikt voor bouquetten.

GLORIA-DAHLIA's, DUBBELE . . per pakje f 0.35.

Deze geheel nieuwe klasse van Dahlia's brengt eene groote menigte bloemen voort, die, hoewel alle dubbel, geheel verschillend zijn van vorm en grootte, zoodat de doorsnede varieert tusschen 3 en 8 cM. De kleuren zijn evenals die van andere klassen, terwijl ze zoowel effen als gestreept voorkomen. Wanneer men zaait Maart-April, bloeien ze in September; stekplanten zijn natuurlijk vroeger.



Erigeron aurantiacus hybridus.

ERIGERON aurantiacus hybridus, . per pakje f 0.45

Een aanbevelenswaardige hybride van de reeds vroeg in het voorjaar bloeiende Erigeron aurantiacus, die in tegenstelling met deze, niet maar één of twee, maar eene groote menigte bloemen voortbrengt op de ± 30 cM. hooge bloemstengels. De bloemen zijn minstens even groot en hebben de prachtige kleuren als wit, roserood, geel, oranje, enz. Overblijvende plant.



Gloria-Dahlia's, dubbele.



Dianthus stellaris flore pleno, dubbele Ster-Anjelier.

DIANTHUS STELLARIS FLORE PLENO, dubbele Ster-Anjelier, ... per pakje f 0.35.

Wat de kleur aangaat kunnen deze Anjelieren wedijveren met de bekende Heddewigii-variëteiten, terwijl de vorm oneindig veel sierlijker en schooner is. Ze bloeien zeer lang, van eind Juni tot September.

GAILLARDIA grandiflora foliis aureo-variegatis, per pakje . . . f 0.45


Eene variëteit van de winterharde, grootbloemige Gaillardia grandiflora. De bladeren zijn evenwel goudgeel gemarmerd en gevlekt, wat men reeds bij de zaailingen kan opmerken wanneer de plantjes nog heel klein zijn; ja zelfs is het bij de knoppen soms reeds te zien.

LATHYRUS ODORATUS Mont Blanc p. pakje f 0.50

Prachtige, zeer vroeg bloeiende variëteit met groote zuiver witte bloemen. De planten zijn over het algemeen niet zoo forsch gebouwd als de andere soorten, terwijl ze evenwel slanker en sierlijker zijn. De bloemen komen geheel uit de grauwgroene smalle bladeren te voorschijn, zoodat ze een zeer schoon effect maken.



Gaillardia grandiflora foliis aureo-variegatis.



Lathyrus odoratus Mont Blanc.



Papaver paeoniflorum Miss Sherwood.

PAPAVER paeoniflorum, Miss Sherwood p. pakje f 0.40


Aan de krachtige, 90 cM. hooge planten verschijnen boven het schoone grauwgroene loof de groote enkele bloemen, die van het hart tot het midden zuiver wit zijn en van daar tot den rand licht rose. Komt zuiver uit zaad. Zeer aan te bevelen voor bouquetten.



Papaver Rhoeas nanum.

PAPAVER Rhoeas nanum, . . . per pakje f 0.45.

Deze Papaver groeit niet hooger dan ongeveer 50 cM. De bladen zijn helder groen en fijn ingesneden, terwijl op de talrijke, slanke bloemstengels groote, enkele bloemen prijken, van een doorsnede van 8—10 cM., welker bloembladen een ronde vorm hebben. De kleur is rose, scharlakenrood en oranje. Zeer geschikt voor randen of ook voor potcultuur.



Pyrethrum roseum hybridum grandiflorum.

PYRETHRUM ROSEUM

hybridum grandiflorum,

per pakje f 0.45.

De Pyrethrum-hybriden zijn genoeg bekende overblijvende planten, zoodat ze weinig aanbeveling behoeven. Deze variëteit heeft boven anderen dit voordeel dat de bloemen kolossaal groot zijn zoodat ze zelfs een doorsnede van 10 cM. bereiken. De kleur varieert van rose tot karmijnrood.

TROPAEOLUM

lobbianum hederaefolium,

per pakje f 0.50.

Zeer schoone nieuwe variëteit met bladeren van een donkere metaalkleur, die een eigenaardig contrast vormen met de scharlakenroode bloemen, die in groote menigte zich vertoonen. Ze komt goed op uit zaad. Zeer geschikt voor plantenhangers, potten ez.

ZADEN VAN ZOMERBLOEMEN.

Bij bestelling van bloemzaden is het voldoende om alleen het nummer en de hoeveelheid op te geven.

H. beteekent Hoogte.

ADONIS.

De Adonis-soorten laten zich zeer gemakkelijk kweeken; men zaait ze op de perken in de laatste helft van April H. 50 cM.

1. **aestivalis,** *Zomer-Kooltje vuur,* vuurrood. Bloeitijd Juni-Sept. . . p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
2. **autumnalis,** *Herfst-Kooltje vuur,* donker bloedrood. Bloeit Juli-Oct. p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

AGERATUM MEXICANUM.

Men zaaie de Ageratums in begin Februari in den warmen bak en zorge voor eenige malen verspenen en langzamerhand afharden, totdat men ze einde Mei of begin Juni op de perken uitplant. Ze laten zich ook goed gebruiken voor potcultuur. Bloeit Juni-Sept. H. 20 cM.

3. **Imperial Dwarf blue,** donkerblauw, p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10
4. „ „ **white,** wit, p. lood f 0.25 p. pakje f 0.10
5. **Little Dorrit,** laag met kleine donkerblauwe bloemen, p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10
6. **nanum luteum,** geel . . . . . . p. pakje f 0.10

AGROSTEMMA.

Hemelroosje met helder gekleurde bloemen. Kan einde April in den vollen grond worden uitgezaaid. Bloeit Juli-Sept. H. 30 cM.

7. **coeli-rosa fimbriata nana,** prachtig purperrood p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

ALONSOA.

De Alonsoa's worden in Maart-April in den bak gezaaid, onder glas gespeend en in Mei uitgeplant. Zoodra de planten 15 cM. hoog zijn, nijpt men de uiteinden der stengels in om het bloeien te bevorderen. Bloeit Juli-Sept.

8. **Warscewiczii,** schitterend rood, H. 60 cM. p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10
9. **linifolia,** scharlakenrood, H. 30 cM. p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

ALYSSUM.

Voor randen om bloemperken is dit plantje zeer geschikt. Men zaait het in April in den vollen grond, zorgende dat het zoodanig wordt uitgedund, dat de plantjes 20 à 25 cM. van elkaar komen te staan. Wanneer men na het bloeien de takjes inkort, herhaalt zich later de bloei. Bloeit Juni-Sept. H. 20 cM.

10. **Benthami,** wit . . , ... p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05, p. ons f 1.25

10*a*. **Benthami compactum,** wit welriekend, p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

AMARANTHUS.

De Amaranthussoorten worden in April in den bak gezaaid, onder glas verspeend en in Mei buiten uitgeplant. Ze vereischen evenals alle bladplanten een rijk gemesten grond. Bloeit Juli-Sept.

11. **caudatus,** *Kattestaart,* met lange donkerroode bloemtrossen, H. 90 cM. p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
12. **Henderi** met zwartroode bladeren, H. 60 cM. p. pakje f 0.10
13. **hybridus Princess of Wales,** prachtige bonte bladeren, H. 60 cM. . . p. lood f 0.50, p. pakje f 0.15
14. **Margaritae,** zeer laag, schoone varieteit, H. 30 cM. p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
15. **salicifolius,** met smalle franjeachtige bladeren, H. 30 cM. . . p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10
16. **superbus,** langwerpig ronde bladeren, bloedrood met heldergelen rand, H. 60 cM. p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05

ANAGALLIS.

Men zaaie einde April in den vollen grond. Door hare heldere bloempjes, die blauw en rood gekleurd zijn, en hare lage groeiwijze, is de Anagallis zeer geschikt voor randen en perken. Bloeit Juli-Sept. H. 15 cM.

17. **grandiflora,** in kleuren gemengd, p. lood f 0.35 p. pakje f 0.10

ANCHUSA.

De prachtige hemelsblauwe bloemen hebben een zuiver wit hart. Wanneer men voorjaars in den bak uitzaait, begint ze in Juli te bloeien. Men kan echter ook in Augustus uitzaaien, de planten onder glas doen overwinteren en in 't voorjaar uitplanten. Ze beginnen dan reeds in April te bloeien. H. 75 cM.

18. **Capensis,** Kaapsche Vergeet-mij-niet, p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05

ANTIRRHINUM.

De bekende Leeuwenbekjes zaait men Maart-April en na eenige malen verspeend te hebben, kan men ze in Mei uitplanten. Men kan ze ook in het najaar zaaien, zoodat men dan het volgend zomer sterkere planten heeft. Ze vereischen veel warmte en een goeden bodem. Bloeit Juli-Oct.

19. **majus,** hooggroeiende, in gem. kleuren. H. 45 cM. p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10
20. „ „ 6 pakjes in 6 kleuren f 0.60
21. „ **nanum Tom Thumb,** dwergachtige leeuwenb., in schoone kleuren gemengd. H. 15 cM. p. lood f 0.40, p. pakje f 0.15
22. **majus nanum Tom Thumb,** 6 pakjes in 6 kleuren f 0.60

ARNEBIA.

Men zaaie in April in den bak en plante in Mei uit. Het eigenaardige dezer plant is dat vijf bruine vlekken, die zich bij het ontluiken der bloemen vertoonen, na eenige dagen geheel verdwijnen. Bloeit Juli-Oct. H. 60 cM.

23. **cornuta,** geel met bruine vlekken, p. pakje f 0.30

ARCTOTIS grandis, zie Nieuwe invoeringen van het vorige jaar.

ASPERULA.


Lief plantje, dat in Mei kan worden uitgezaaid en dat bijna den geheelen zomer met ontelbaar vele hemelsblauwe bloempjes bloeit. H. 30 cM.

24. **azurea setosa** . . p. lood f 0.10, p. pakje f 0.05, p. ons - 0.85

ASTER SINENSIS fl. pl.



Dwerg Chrysanthemum Aster.



Triumph Aster.

De Asters zijn buitengewoon dankbare bloemen, die in elken grond kunnen worden gekweekt, mits niet te schraal. Ze worden in Maart onder glas uitgezaaid en zoodra ze twee blaadjes hebben, verspeend. Na eenige weken plant men ze in potten, waarin men ze laat staan totdat ze op de perken gezet worden. Men kan ze ook half Mei buiten uitzaaien en later uitdunnen. De hooggroeiende soorten moeten natuurlijk iets wijder geplant worden dan de lagere.

De Asters kunnen zeer gemakkelijk, zelfs wanneer ze in vollen bloei zijn, verplant worden, waardoor men ze uitnemend kan gebruiken voor het beplanten van perken waarop vroegbloeiende planten gestaan hebben.

BLOEITIJD JULI—OCTOBER.

Hooge soorten 60 cM. — Middelh. 45 cM. — Dwerg 30 cM.

25. **hooge,** *Japansche,* in kleuren gem., p. pakje f 0.30

Deze hebben groote naaldvormige bloemen.

26. **hooge,** *Paeonie-perfection,* in kleuren gemengd. p. lood f 1.30, p. pakje f 0.20
27. „ „ „ 6 pakjes in 6 kleuren - 0.60

De bloemen dezer verscheidenheid hebben veel overeenkomst met pioenrozen en zijn zeer schoon en regelmatig gevormd.

28. **hooge,** *Juweel* of *Bal* in kleuren gemengd p. lood f 1.30, p. pakje f 0.20
29. „ „ „ „ appelbloesem „ „ - 0.20
30. „ „ „ „ karmijnrood „ „ - 0.20
31. „ „ „ „ donkerrose „ „ - 0.20
32. „ „ „ „ donkerblauw „ „ - 0.20

De bloemen dezer Asters zijn kolossaal groot en bolrond gevormd.

33. **hooge,** *Imbriquée-Pompon,* in kleuren gemengd p. lood f 1.30, p. pakje f 0.20
34. „ „ „ 6 pakjes in 6 kleuren - 0.60

Deze hebben de eigenaardigheid dat de bloempjes meer dakpansgewijze over elkaar liggen. Ze zijn niet zoo groot als de vorige.

35. **hooge,** *Ring* of *Kroon,* in kleuren gemengd p. lood f 1.30, p. pakje f 0.20
36. „ „ „ „ 6 pakjes in 6 kleuren - 0.60

Deze Asters hebben Pioenvormige bloemen en wit hart.

37. **hooge,** *Rozen* in kleuren gemengd p. lood f 1.10, p. pakje f 0.15
38. „ „ 6 pakjes in 6 kleuren - 0.60

Deze soort heeft groote dubbele bloemen met bloembladeren die naar buiten regelmatig dakpanvormig over elkaar liggen en naar binnen iets omgebogen zijn als bij de Pioenen.

39. **hooge,** *Straal.* NIEUW! gemengd p. pakje f 0.25
40. „ „ helderrose . . . . „ „ - 0.30
41. „ „ wit . . . . . . „ „ - 0.25

41*a*. „ *Struisveder,* schitterend rose „ „ - 0.45

Deze prachtige Aster-variëteit is voor alle bloemenliefhebbers een groote aanwinst. De groeiwijze is kandelabervormig en de bloemen maken met hun lange bloembladen een ongeëvenaard sierlijk effect. Voor bouquetten is deze nieuwigheid onontbeerlijk; de afbeelding kan men vinden onder de nieuwe bloemzaden van het vorige jaar, waar van deze Aster-groep nieuwe kleuren worden aangeboden.

42. **hooge,** in soorten gemengd, p. lood f 1.25, p. pakje f 0.20

ASTERS (vervolg).

43. **middelhooge,** *Diamant,* in kleuren gemengd, p. lood f 1.30, p. pakje f 0.20
44. „ „ 6 pakjes in 6 kleuren - 0.60

Prachtige soort met groote dakpanachtig gevormde bloemen. Constant in vorm en hoogte. H. 35 cM.

45. **middelhooge,** *Victoria,* in kleuren gemengd, p. lood f 2.—, p. pakje f 0.25
46. „ „ 6 pakjes in 6 kleuren - 0.60

Deze klasse heeft groote en sterk gevulde bloemen die eenigszins plat gevormd zijn.

47. **middelhooge,** *Komeet,* in kleuren gemengd, p. lood f 1.30, p. pakje f 0.20
48. „ „ 6 pakjes in 6 kleuren - 0.60

Deze hebben smalle bloembladeren en maken daardoor een zeer los effect.

49. **middelhooge,** *Mandarijn,* in kleuren gemengd, p. lood f 1.10, p. pakje f 0.20
50. „ „ 6 pakjes in 6 kleuren - 0.60

Schoone halfhooge soort, rijk vertakt met tamelijk groote dubbele bloemen.

51. **middelhooge,** *Meteor,* in kleuren gemengd, p. lood f 0.90, p. pakje f 0.15
52. „ „ 5 pakjes in 5 kleuren - 0.60


Deze rijkvertakte Aster vormt een regelmatig gevormde bloemenkogel van ± 40 cM. doorsnede, geheel overdekt met ronde dubbele dakpanachtig gevormde bloemen.

53. **middelhooge,** *Mignon,* m. pracht. sneeuww. bloemen p. lood f 1.75, p. pakje f 0.25
54. „ in soorten gemengd, p. lood f 1.30, p. pakje f 0.15
55. **dwerg,** *Chrysanthemum,* in kleuren gemengd, p. lood f 1.35, p. pakje f 0.20
56. **dwerg** *Chrysanthemum,* 6 pakjes in 6 kleuren f 0.70

De Chrysanthemum-asters kunnen onder de schoonste Asters worden gerekend; zij bloeien zeer rijk met zeer groote bloemen en kunnen zoowel voor potkultuur als voor bloemperken worden aanbevolen.

56*a*. **dwerg-Comeet-Perfection,** rose, p. pakje f 0.35
56*b*. „ „ „ zuiver wit „ - 0.30

Deze Aster bloeit zeer vroeg en terwijl ze niet hooger groeit dan 20 cM., hebben de bloemen een middellijn van 12 cM. Uitmuntende soort voor potkultuur en voor perken.



Dwerg Comeet Perfection Aster.

57. **dwerg** *Humbolt,* in kleuren gemengd, p. lood f 2.00, p. pakje f 0.20
58. „ „ 6 pakjes in 6 kleuren f 0.70

Prachtige klasse met sterken groei en schoonen vorm. Zeer groote Pioenvormige bloemen.

Koning Humbert-Aster,
Zie Nieuwe invoeringen van het vorige jaar.

59. **dwerg** *Victoria,* in kleuren gemengd, p. lood f 2.00 p. pakje f 0.20

Deze bloeien evenals de middelhooge Victoria-Asters, doch groeien niet hooger dan 30 cM.

60. **dwerg** *Verbeterde Bouquet-Pyramide,* p. lood f 1.50, p. pakje f 0.15
61. „ „ *Bouquet-Pyramide* 6 pakjes in 6 kleuren f 0.70

Deze klasse heeft eene meer pyramidaal gevormde bloeiwijze.

62. **dwerg** *Triumph,* scharlakenrood . p. pakje f 0.25
63. „ „ wit (nieuw) . . „ „ - 0.25

De Triumph-asters zijn de laagstgroeiende van alle; de bloemen zijn kolossaal groot en maken met hare smalle bladeren een schoon effect.

64. **dwerg** in soorten gemengd, p. lood f 0.75 p. pakje f 0.10

Phoenix-Asters, „Jungfräulein,"
Zie Nieuwe invoeringen van het vorige jaar.

BALSAMINEN zie **Impatiens.**

BARTONIA.

Dit schoone plantje groeit het best op een drooge zonnige standplaats voor den wind beschut. Daar het zich niet gemakkelijk laat verplanten moet men het in Mei buiten uitzaaien. Bloeitijd Juli-Oct.

66. **aurea,** helder geel. H. 90 cM. p. lood f 0.10, p. pakje f 0.05
67. „ **nana,** goudgeel. H. 45 cM. p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05

BIDENS.

Met fluweelachtige zwartroode bloemen. Men zaait ze in Maart in den warmen bak of in Mei op den kouden grond. In 't laatste geval verschijnen de bloemen natuurlijk veel later. Bloeitijd Juli-Oct. H. 60 cM.

68. **atro-sanguinea** (*Dahlia Zimapani*), p. lood f 0.90, p. pakje f 0.15

BRACHYCOME.

De Brachycome's zijn zeer schoone planten met levendig gekleurde bloemen. Men kan ze op den kouden grond zaaien in April-Mei. Wil men ze laat in bloei hebben zoo kan men nog half Juni zaaien. Bloeitijd Juni-Sept. H. 15 cM.

69. **iberidifolia,** . . . . p. lood f 0.45, p. pakje f 0.10
70. „ **alba,** wit . „ „ - 0.45, „ „ - 0.10
71. „ **rosea,** rose „ „ - 0.90, „ „ - 0.15

BROWALLIA.

Wanneer men deze schoone zomerbloem in Mei zaait bloeit zij vanaf Juli totdat het begint te vriezen. H. 45 cM

72. **Czerwiakowski**, blauw, p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10
73. **elata coerulea nana**, laaggroeiend blauw, p. lood f 0.60, p. pakje f 0.10

CACALIA.

Men zaaie deze omstreeks half April buiten. De bloemen zijn zeer geschikt voor bouquetten. Bloeit Juni—Sept. H. 45 cM.

74. **songhifolia**, bloedrood, p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05

CALANDRINIA.

De Calandrinia's moeten in April-Mei op de perken worden uitgezaaid, want de plantjes laten zich niet verspenen. Bloeit Juli-Oct. H. 30 cM.

75. **discolor** . . . . p. lood f 0.50, p. pakje f 0.10
De bloemen zijn violet-rose met gele meeldraden.
76. **umbellata**, laaggroeiend, p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10
De bloemen dezer soort zijn donker purper-violet. Als dit plantje in vollen bloei is, ziet men slechts ééne schitterende kleur.

CALENDULA.

De Goudsbloemen zijn zoo algemeen bekend, dat hieraan weinig is toe te voegen; ze worden in April gezaaid. Bloeitijd Juni-Sept. H. 30 cM.

77. **officinalis fl. pl. Meteor**, p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
Oranje-geel gestreepte variëteit.
78. **officinalis grandifl. fl. pl.** p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
Gewone algemeen bekende Goudsbloem met donker oranje-kleurige bloemen.
79. **officinalis Prins v. Oranje** p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
Donker oranje, geel gestreept.
80. **officinalis sulph. fl. pl.** p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
Deze heeft groote, zuiver gele, dicht gevulde bloemen.

CALLIOPSIS.

De Calliopsis zaaie men in April. Wil men ze vroeg in bloei hebben, zoo moet men in Maart onder glas zaaien. Het zijn zeer dankbaar bloeiende planten. Bloeitijd Juni-Sept.



Calliopsis bicolor nana.

81. **bicolor**, geel met bruin, H. 90 cM., p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

CALLIOPSIS (vervolg).

82. **bicolor hybrida fl. pl.**, in kleuren gemengd, H. 45 cM., p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05
Met dubbele prachtige bloemen.
83. „ **nana**, H. 30 cM., p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05
84. **Drummondi**, met lange bloemstelen, H. 45 cM. p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05

CALLIRHOE.

Deze wordt in April gezaaid. Bloeitijd Juni-Sept. H. 60 cM.

85. **liniariloba**, purperkleurig lila, p. lood f 0.50, p. pakje f 0.10

CAMPANULA.

Deze lieve klokjes worden in April-Mei gezaaid en vereischen weinig bijzondere zorg. Bloeitijd Juni-Juli.

86. **Loreyi fl. albo**, wit, H. 20 cM. p. lood f 1.—, p. pakje f 0.10
87. „ „ **coerulea**, blauw, H. 20 cM. p. lood f 1.—, p. pakje f 0.10
88. **macrostyla**, met groote bekervormige bloemen, H. 60 cM., p. lood f 1.30, p. pakje f 0.10
De kleur der bloemen is violet gestreept op witten grond
89. **speculum**, in nuances van wit, blauw en lila, H. 30 cM., p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05
90. „ **fl. pl.**, met dubbele bloemen in gemengde kleuren, H. 30 cM., p. lood f 0.60, p. pakje f 0.10

CANNABIS.

Deze schoone bladplant groeit ongeveer 2.50 M. hoog en is zeer geschikt voor ruime groote perken. Ze wordt in den vollen grond uitgezaaid, ongeveer in het einde van April.

91. **gigantea**, *Chineesche Reuzenhennep*, p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

CENTAUREA.

Deze schoone algemeen bekende Korenbloemen kunnen in Mei op den kouden grond worden uitgezaaid en later worden uitgedund. Men kan ze ook eerder (de laatste helft van Maart) in den bak uitzaaien en ze in potjes verspeenen op een afstand van 25 à 30 cM. Bloeitijd Juli-Oct.

92. **Americana**, *Reuzenkorenbloem* met enorme lila bloemen, H. 90 cM., p. lood f 0.45, p. pakje f 0.10
93 **Cyanus**, *Korenbloem*, in gem. kleuren, H. 45 cM. p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
94. „ **fl. pl.**, met dubbele bloemen in gem. kleuren, H. 45 cM., p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05
95. „ **Kaiser Wilhelm**, donkerblauw, H. 45 cM. p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05
96. „ **nana compacta**, laaggroeiend in vele kleuren, gem., H. 15 cM., p. pakje f 0.15
97. „ **imperialis**, gem. kleuren . „ „ - 0.20

Nieuwe grootbloemige korenbloem, ontstaan uit een kruising van Centaurea Margaritae met Centaurea moschata. De plant wordt 1 M. hoog en is bedekt met langstelige schoongevormde bloemen, die wat vorm en geur betreft, geheel met Centaurea Margaritae overeenkomen, doch dubbel zoo groot zijn. De kleur der bloemen varieert tusschen wit, lila, rose en purperrood. Daar de afgesneden bloemen zeer lang goed blijven en zij veel langer doorbloeien dan andere Centaurea's, ook zelfs bij ongunstig weder, kan deze nieuwigheid niet genoeg worden aanbevolen.

CENTAUREA (vervolg)

98. **Margaritae**, nieuwe grootbloemige zuiver witte verscheidenheid, H. 45 cM. . . . p. pakje f 0.15
99. **odorata**, H. 45 cM. p. lood f 0.75, p. pakje f 0.10

Met purperkleurige groote bloemen die eene heerlijke geur bezitten, zeer schoon voor bouquetten

100. **odorata Chamaeleon**, H. 45 cM. p. lood f 1.10, p. pakje f 0.20

Nieuwe grootbloemige variëteit, de kleur is zwavelgeel, iets rose getint.

101. **suaveolens** gele welriekende korenbloem, H. 60 cM. p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10
102. **Victoria**, H. 15 cM. p. lood f 0.50. p. pakje f 0.10

Deze zeer laaggroeiende variëteit is zeer schoon en bizonder geschikt voor randen.

CENTRANTHUS.

Dit schoone 20 à 25 cM. hoog groeiende plantje vormt door de vele vertakkingen een dichte bloemenmassa. De bloempjes zijn wit of rood en zeer schoon. Men kan ze Maart-Mei buiten uitzaaien Bloeitijd Juli-Aug.

103. **macrosiphon nanus**, gemengd, p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05

CHEIRANTHUS ANNUUS Fl. Pl., VIOLIEREN.

Voor Zomerviolieren moet den grond liefst voor den winter worden bewerkt. Men bemeste vooral niet met versche mest, maar met geheel verteerde stalmest of afval. De zomerviolieren worden in Maart in den warmen bak gezaaid, eenige malen verspeend en langzamerhand afgehard. In Mei op de perken geplant beginnen ze reeds half Juni te bloeien.

In April zaaie men de herfst-violieren die op dezelfde wijze worden behandeld en einde Augustus beginnen te bloeien. De Winter-violieren worden half Juni gezaaid en vóór November in den kouden bak gebracht. Ze beginnen dan in November te bloeien en men heeft slechts te zorgen ze vorstvrij te houden. Gewoonlijk bevinden zich 20 à 25 °/₀ enkele bloemen tusschen de Violieren. H 30 à 45 cM.

Zomer-Violieren.

104. **grootbl. Engelsche** p. lood f 2.20, p. pakje f 0.20
105. „ „ 6 pakjes in 6 kleuren - 0.60
106. **Weisse Perle**, Nieuw . . . . p. pakje - 0.30

Zeer laaggroeiend met groote sneeuwwitte bloemen.

107. **doorbl.**, gemengd p. lood f 2.—, p. pakje f 0.20
108. „ . . . . 6 pakjes in 6 kleuren - 0.70
109. „ **Dresdener**, gem., p. lood f 3.—, p. pakje - 0.30
110. „ „ 6 pakjes in 6 kleuren - 0.70
111. **grootbl. Pyramide** . . . . . p. pakje - 0.25
112. „ „ 6 pakjes in 6 kleuren - 0.70
113. „ **Princess May** lichtgeel, p. pakje - 0.40
114. **dwerg-Pyramide**, gemengd . . „ „ - 0.30
115. „ „ donkerbloedrood „ „ - 0.45
116. „ „ 6 pakjes in 6 kleuren - 0.90
117. **Victoria Bouquet** gemengd . . p. pakje - 0.30
118. „ „ 6 pakjes in 6 kleuren - 0.70

Prachtige klasse, die regelmatig gevormde bloemenpyramiden voortbrengt. Zeer geschikt voor potcultuur.

CHEIRANTHUS ANNUUS Fl. Pl. (vervolg).

Herfst-Violieren.

119. **grootbl.**, gemengde kleuren . . p. pakje f 0.20
120. „ . . . . 6 pakjes in 6 kleuren - 0.85
121. **Schotsche**, gemengd . . . . . p. pakje - 0.40
122. „ . . . 4 pakjes in 4 kleuren - 0.80

Winter-Violieren.

123. **grootbl.**, gemengde kleuren . . p. pakje f 0.20
124. „ . . . . 6 pakjes in 6 kleuren - 0.80



Grootbloemige Winterviolier Keizerin Elisabeth.

124a. **grootbl. Keizerin Elisabeth** . . p. pakje f 0.40

Deze kandelaber-vormige plant wordt ongeveer 50 cM. hoog. Alle takken zijn bedekt met prachtige helder-karmijnrose bloemen, zoodat de geheele plant een schoon pyramidevormig bouquet schijnt, welks schoonheid nog verhoogd wordt door de eigenaardige frischgroene bladeren. Zij bloeit vroeg en is weinig onderhevig aan den invloed van het weer.

125. **Witte van Nizza**, vroegbloeiend . p. pakje f 0.25
126. **dwerg-Bouquet**, gemengd . . . „ „ - 0.25
127. „ „ . . 5 pakjes in 5 kleuren - 0.90

CHEIRANTHUS CHEIRI, MUURBLOEMEN.

De muurbloemen worden gewoonlijk in Mei of Juni op den kouden grond uitgezaaid, in Juli op een nieuw bed verspeend, waar men ze laat staan tot in den herfst. Men kan ze dan in potten zetten om ze zeer vroeg in bloei te hebben, of ook buiten op de perken uitplanten op 40 à 50 centim. afstand van elkaar. Deze welriekende bloemen groeien in elken grond, mits niet al te vochtig en 't liefst aan den voet van een muur, aan welke omstandigheid zij haar naam te danken hebben. De afgesneden bloemen blijven lang goed en de knoppen ontluiken zelfs geheel, indien men slechts het water nu en dan ververscht. Bloeitijd April—Juni.

CHEIRANTHUS CHEIRI, MUURBLOEMEN.

128. **enkele vroegbloeiende Parijsche**, gemengd, H. 45 cM. p. lood f 0.35, p. pakje f 0.10

Deze bloeien reeds het eerste jaar, wanneer men ze in April buiten uitzaait.

129. **hooge dubbele**, gemengde kleuren, H. 60 cM. p. lood f 2.25, p. pakje f 0.30
130. „ „ 6 pakjes in 6 kleuren f 0.75
131. **lage dubbele dwerg**, gem. kleuren, H. 30 cM. p. lood f 2.75, p. pakje f 0.30
132. „ „ „ 6 pakjes in 6 kleuren f 0.90

CHEIRANTHUS MARITIMUS, ZEEVIOLIEREN.

Dit plantje groeit in bijna elken grond en onderscheidt zich door snellen groei en groote rijkbloeiendheid, zelfs in dicht aan zee gelegen tuinen, waar anders niet vele bloemen gelukken. Men zaait ze vrij dicht in April-Mei en dunt ze zoodat de planten ± 10 centim. tusschenruimte hebben. Bloeitijd Juli-Aug. H. 15 cM.

133. **rood**, ... p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
134. **carmineus splendens**, karmijnrood, p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05

CHRYSANTHEMUMS.

Ofschoon de eenjarige *Chrysanthemums* niet zoo algemeen gewaardeerd worden als de bekende tot dit geslacht behoorende overblijvende kamerplanten, verdienen ze toch een plaatsje in onzen bloementuin, daar ze zeer dankbaar en gemakkelijk te kweeken zijn. Men zaait ze April—Mei; de planten zijn dan einde Mei of begin Juni gereed om met een kluitje op de perken te worden gezet. Men kan ze ook in potten kweeken en om ze vroeg in bloei te hebben kan men in September zaaien, waarna men ze op tijd verspeent en in het voorjaar uitplant. De carinatum-variëteiten moeten dan onder glas worden overwinterd.
Bloeitijd Juni—October.



Chrysanthemum carinatum Chamaeleon.

CHRYSANTHEMUMS. (Vervolg.)

135. **carinatum Chamaeleon**, NIEUW! p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

Als de kolossale bloemen dezer prachtige nieuwe variëteit zich pas openen is de grondkleur der straalbloemen licht bronskleurig met een schitterend purperroode rand. De zwartroode schijfbloemen zijn weer door een goudgelen rand omgeven. Na eenige dagen verandert de bronskleur in een prachtig Isabella-geel. De verschillende kleuren maken een ongemeen schoon effect. Hoog 60 cM.

136. **carinatum Dunnetti album plenum**, H. 60 cM., p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10

Prachtige dubbelwitte snijbloem.

137. **carinatum Dunnetti versicolor, fl. pl.**, in gem. kleuren, H. 60 cM., p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10
138. „ **aureum fl. pl.**, geel, H. 60 cM., p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10
139. „ **Golden Feather**, met goudgele bladeren, H. 60 cM., p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05
„ **Stern von Thüringen**, zie Nieuwe invoeringen van het vorige jaar.
140. **coronarium fl. pl.**, dubbele gemengd, H. 30 cM., p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05
141. „ **pomponicum album plenum**, dubbel wit, H. 45 cM., p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05
142. „ **pumilum luteum fl. pl.**, NIEUW! H. 20 cM., p. pakje f 0.25

Zeer laag en met kleine gele dubbele bloemen. Prachtig!

143. **carinatum fimbriatum fl. pl.**, H. 30 cM., p. pakje f 0.15
144. **inodorum plenissimum**, dubbel wit, H. 30 cM., p. lood f 0.50, p. pakje f 0.10

CLARKIA.

De Clarkia's kunnen in April direct op de perken worden gezaaid of eerst op een bed en in Mei uitgeplant worden. De planten moeten een tusschenruimte hebben van pl. m. 20 centimeter. Vooral de dubbele verscheidenheden zijn zeer schoon en aan te bevelen. Ook uitnemend geschikt voor kuipen of potten; bloeitijd Juni—Sept.

145. **elegans fl. pl.**, in gemengde kleuren, H. 45 cM., p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
146. „ „ „ **Purple king**, purperkleurig, H. 45 cM., p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05
147. „ „ „ **Salmon Queen**, zalmkleurig, H. 45 cM., p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05
148. „ **nana rosea**, laaggroeiend, rose, H. 30 cM., p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10
149. **pulchella**, in gemengde kleuren, H. 45 cM., p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
150. „ **purpurea fl. pl.**, NIEUW!!! H. 45 cM., p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10

Met prachtige dubbele purperkleurige bloemen.

COLLINSIA.

De Collinsia bicolor en multicolor kan men in April op de perken zaaien, ze bloeien dan Juni—Aug. Door hare vroolijke kleuren maken ze een aardig effect. Ook kunnen ze uitnemend worden gebruikt voor potcultuur om ze voor 't venster of op een balcon te plaatsen.

De Collinsia Verna moet men half September op de perken zaaien om ze in 't voorjaar vroeg in bloei te hebben. Hoogte 30 cM.

COLLINSIA (vervolg).

151. **bicolor alba**, zuiver wit, p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
152. „ **carnea**, vleeschkl., „ „ - 0.15, „ „ - 0.05
153. „ **major**, lila en wit, „ „ - 0.15, „ „ - 0.05
154. **multicolor**, wit, violet, lila en rose, p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
155. **verna**, wit m. hemelsbl., „ „ - 0.30, „ „ - 0.10

COMMELINA.


Ofschoon deze plant overblijvend is en knollen voortbrengt evenals de Dahlia's, zoo wordt zij meestal als eenjarig behandeld. In Maart uitgezaaid in den warmen bak, onder glas verspeend en in Mei uitgeplant, bloeit zij in Juli. Wanneer men de knollen vorstvrij overwintert, beginnen ze reeds in Juni te bloeien. Hoogte 45 cM.

156. **coelestis**, helderblauw, p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

CONVOLVULUS.

In Frankrijk Dag-schoone (Belle de Jour) genoemd, behooren de Convolvulus met hare levendige bloemen tot de dankbaarste zomerbloemen Men zaait ze op de perken in April. Bloeitijd Juli-Sept. H. 30 cM.

157. **tricolor**, blauw, wit en geel, p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
158. „ **fl. albo**, wit „ - 0.15, „ „ - 0.05
159. „ **fl. rosea**, rose „ - 0.15. „ „ - 0.05
160. „ **kermesinus violaceus**, karmijn violet, p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
161. „ **unicaulis**, grootbl. blauw, p. lood f 0.15, p. pakje 0.05




Convolvulus tricolor compactus.

162. **tricolor compactus** NIEUW! . p. pakje f 0.20

Onder dezen naam kwam verleden jaar voor het eerst eene laaggroeiende vorm van de algemeen bekende *Kruipende Winde* in den handel. Zij is even gemakkelijk te kweeken en even rijkbloeiend als deze. Bovenstaande afbeelding, die gemaakt is van eene photografie, doet zien, dat zij ook zeer geschikt is voor potplant. De bloemen komen voor in alle kleuren, nuances van zuiver wit tot donker violet. Men kan het zaad zoowel in den kouden grond als ook in potten of in den bak uitzaaien.

COSMIDIUM.

Deze plant heeft fijn blad met op lange dunne stengels gezeten bloemen. Zij wordt gezaaid in Maart-April in den warmen bak, onder glas verspeend en in Mei uitgeplant. Bloeitijd Juni-Sept. H. 75 cM.



Cosmidium Burridgeanum.

163. **Burridgeanum**, donkerbruin met goudgelen rand, p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05

CREPIS.

Dit plantje vereischt zeer weinig zorg. Men zaaie einde April buiten. De bloemen hebben een zacht rose kleur. Bloeitijd Juni—Sept. H. 30 cM.

164. **rubra** . . . . p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05


CUPHEA.

Men zaait in Maart in den bak; de plantjes worden onder glas verspeend en in Mei buiten uitgeplant. Men kan ze ook voor potcultuur gebruiken. Bloeitijd Juni-Oct. H. 30 cM.

165. **platycentra**, langwerpige vermiljoenroode bloemen, p. pakje f 0.30
166. **miniata**, hoogroode bloemen. Zeer schoon „ - 0.10

CYNOGLOSSUM.

De bloemen komen veel overeen met die der witte Vergeet-mij-niet, terwijl het blad grijsgroen is. Voor randen om perken met donkere bladeren, b.v. Canna's, is deze plant uitnemend geschikt, daar zij dan zeer schoon uitkomt. Zij groeit in bijna elken grond. Men zaait in Maart-April op de perken. Bloeitijd Juni-Sept. H. 30 cM.



Cynoglossum linifolium.

CYNOGLOSSUM.

167. **linifolium**, *Witte Onschuld*, p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

DAHLIA.

Voor groote losse bouquetten, die tegenwoordig zoo zeer in de mode komen, zijn de enkele Dahlia's uitnemend geschikt. Vooral de enkele Cactus Dahlia's met eenigszins gebogen en gedraaide bloembladen zijn zeer elegant.
Men zaait de Dahlia's in den warmen bak in Maart en hardt ze af onder glas, waarna men ze einde Mei buiten uitplant. Men plant ze ± 2 voet uit elkaar. Voor randen om heesterperken of voor groote perken maken ze een schoon effect. Bloeitijd Juli—Oct.

dubbele Gloria, zie *Nieuwe invoeringen van het vorige jaar*.

168. **variabilis, enkelbloemige Dahlia's** in gem. kleuren, H. 90 cM., p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10
169. „ **dwerg**. H. 45 cM. . „ „ - 0.15
170. „ **striata**, enkelbl. gestreept. H. 60 cM. p. pakje f 0.15
171. „ **fl. pl.**, dubbele grootbloemige in kleuren gemengd. H. 60 cM. p. pakje f 0.25
172. „ **cactus**. H. 90 cM. . „ „ - 0.30

DATURA.

Men zaaie in April onder glas of in Mei buiten. De plantjes kunnen op ongeveer 35 à 40 cM. worden verspeend en hebben veel zon noodig en een goeden bodem. Bloeitijd Juli—Augustus.

173. **fastuosa Huberiana plena**, grootbloemig dubbel, in kleuren gemengd. H. 90 cM. p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10
174. **humilis Golden Queen**, zeer schoon. H. 60 cM., p. lood f 0.55, p. pakje f 0.20

DELPHINIUM.

De Riddersporen moeten in Maart-April direct op de perken worden uitgezaaid, want zij knnnen niet tegen verspenen. Men dunt ze zoodanig uit, dat ze op een voet afstand komen te staan. Het zijn zeer sterke planten, die in 't najaar uitgezaaid, zonder bedekking overwinteren. Men heeft ze dan 't volgende jaar vroeger in bloei.

175. **Ajacis**, lage dubbele *dwerg- of kandalaber Riddersporen* gem. H. 30 cM., p. lood f 0.70, p. pakje f 0.20
176. **Ajacis**, gewone lage *Riddersporen*. H. 30 cM. p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10
177. „ dubbele hooge *Riddersporen*, H. 90 cM. p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10
178. „ *KeizerRiddersporen*. H. 75 cM., p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10
179. **cardiopetalum roseum**, helder rozenrood. H. 30 cM. p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05

DIANTHUS.

De eenjarige *Anjelieren* zijn zeer dankbare rijkbloeiende planten. Om ze echter gedurende een groot gedeelte van den zomer in bloei te hebben moet men ze op verschillende tijdstippen zaaien. Ze laten zich zeer gemakkelijk met een kluitje verplanten, ook al zijn ze reeds op het punt om te bloeien. Door in April in den bak en in Mei buiten te zaaien en een gedeelte te verplanten en het andere niet, kan men ze lang achtereen in bloei hebben.

DIANTHUS (vervolg).

180. **chinensis fl. pl.** *Dubbele Anjelieren* of *Chineesche Anjers* in prachtsoorten gemengd, p. lood f 0.35, p. pakje f 0.10
181. **imperialis fl. pl.**, Keizeranjers, p. lood f 0.35, p. pakje f 0·10
182. **Heddewigi** „ „ *Diadeem Anjers*, in prachtsoorten gemengd, p. lood f 0.45, p. pakje f 0.15
183. „ **albus, Koningin van Holland**, NIEUW! zuiver wit met gele bloemen, p. lood f 1.50, p. pakje f 0.30
184. **laciniatus fl. pl.**, in de prachtigste kleuren gemengd . . . p. lood f 0.40, p. pakje f 0.15



Dianthus Stellaris.

184a. **Dianthus Stellaris**, *Ster-Anjelier*, per pakje f 0.35

De talrijke Dianthus-variëteiten zijn reeds sedert langen tijd zeer gezocht en zijn zoowel om hare schoonheid als om hare gemakkelijke kweekwijze algemeen bemind. Deze nieuwe soort evenwel overtreft door hare hoedanigheden de meeste andere. Ze heeft deze eigenaardigheid, dat, zooals uit de afbeelding te zien is, elke bloem de vorm heeft van een ster met 5 à 6 stralen. Ze bloeit voortdurend van midden Juni tot begin October en bezit alle prachtige kleuren van de Dianthus Heddewigi-klasse, waaruit ze afkomstig is.

Stellaris fl. pl. Zie *Nieuwigheden van het vorige jaar*.

ERODIUM.

Aardig plantje dat meestal dient voor versiering van rotsen en het best op steenachtige plaatsen groeit. Men zaaie in April of Mei en verspeent de plantjes op 40 à 50 cM. afstand. Bloeit in Juni—Juli met schoone violetkleurige bloemen. H. 15 cM.

185. **gruineum** . . . p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

ESCHSCHOLTZIA.

Zeer gemakkelijk te kweeken en weinig eischende Zomerbloemen, die liever niet moeten worden verplant, maar direct op de perken uitgezaaid in April. Ze moeten voldoende worden uitgedund en komen een volgend jaar gemakkelijk weer op.



Eschscholtzia.

186. **californica,** heldergeel, p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05
187. „ **alba,** wit, p. lood f 0.20, p. pakje - 0.05
188. „ **Rose Cardinal,** rose. p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10
189. **Douglasii,** NIEUW!! . . . . p. pakje f 0.10

Uit Californië ingevoerde nieuwe variëteit, die niet genoeg kan worden aanbevolen, daar zij, gelijktijdig met andere Eschscholtzia's uitgezaaid, 14 dagen vroeger bloeit. De bloemen hebben eene zuivere goudgele kleur met een weinig donkerder hart; het loof is grijsgroen en zeer fijn.

190. **hybrida Mandarin,** van binnen oranje, van buiten rood . . . . p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10
191. **maritima,** heldergeel met donkeroranje vlekken, p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

EUCHARIDIUM.

Dit laaggroeiend plantje heeft veel overeenkomst met de Clarkia's en laat zich ook zeer gemakkelijk kweeken in elken grond, die echter niet al te vochtig mag zijn. Men zaait ze half April en zorgt dat ze worden uitgedund zoodanig dat de planten ± 15 cM. tusschenruimte hebben. Bloeitijd Juni-Aug. H. 15 cM.

192. **Breweri,** . . . p. lood f 0.90, p. pakje f 0.20

GAILLARDIA.

De bloemen dezer plant zijn geheel gevuld en komen voor in alle levendige nuances van geel en bruin. Zij zijn uitnemend geschikt voor bouquetten. Ze kunnen einde April buiten worden uitgezaaid, doch in den bak gezaaid beginnen ze reeds in Juni te bloeien.

193. **Amblyodon atrosanguinea,** met schoone donkerroode bloemen, H. 60 cM. p. lood f 0.20 p. pakje f 0.10

GAILLARDIA (vervolg).

194. **picta Lorenziana,** in gem. kleuren, H. 45 cM. p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

GILIA.

De bloemen van dit mildbloeiende plantje zijn geel, purperachtig en violet gekleurd. Men zaait in April en dunt de plantjes uit, zoodat ze 10 à 12 cM. tusschenruimte hebben. Bloeitijd Juli-Aug. H. 30 cM.

195. **tricolor nana compacta,** p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

GODETIA.

De Godetia's laten zich zeer gemakkelijk kweeken. Men zaait ze begin April op een bed en zoodra de plantjes sterk genoeg zijn, worden ze uitgeplant op de perken met een tusschenruimte van 40 centim. Nog beter is het om ze in 't laatst van September te zaaien men verplant ze zoodra mogelijk op een warm plekje in den tuin waar ze overwinterd worden. In 't voorjaar worden ze dan met kluitjes op de perken gezet. Bloeitijd Juni-Sept.



Godetia Duchess of Albany.

196. **Bijou,** H. 15 cM. p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

Een der laagst groeiende Godetia's. Deze is zeer rijkbloeiend en de bloemen zijn wit met scharlakenroode vlekken.

197. **Duchess of Albany,** H. 30 cM. p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

Algemeen bekende grootbloemige witte verscheidenheid.



Godetia Perle Blanche.

GODETIA (vervolg).

198. **Perle Blanche,** H. 20 cM.
p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

Laaggroeiende vorm van de voorgaande eveneens met groote witte bloemen

199 **Lady Albemarle,** H. 30 cM.
p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

Deze is zeer rijkbloeiend. Als de plant in vollen bloei is, ziet men niets dan groote helderroode bloemen.

200. **Lady Satin Rose,** rose, zeer schoon, H. 30 cM.
p. lood f 0.20 p. pakje f 0.10

201. **Mandarin,** zacht geel, H. 30 cM.
p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

202. **The Bride,** zuiver wit met hoog rood afgezet, H. 45 cM. . . p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

GYPSOPHILA.

Dit is een der schoonste fijnste bloemen voor bouquetten. De fijne licht rose bloempjes zijn op draadvormige stengels gezeten. Ze kunnen ook evenals Immortellen worden gedroogd. Men kan ze in April op den kouden grond uitzaaien. Bloeitijd Juni-Aug. H. 45 cM.

203. **elegans,** *Gipskruid,* p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

HELIANTHUS.



Helianthus cucumerifolius.

De zonnebloemen vereischen uiterst weinig zorg. Men zaait in April-Mei en men kan ze al dan niet verplanten. Ze moeten echter flink ruimte hebben en voor den wind van een stok worden voorzien. In Hongarije worden de Zonnebloemen op groote schaal gekweekt voor oliebereiding en voor kippevoer. Bloeitijd Juli-Oct.

204. **annuus fl. pl.,** gewone dubbele *Zonnebloem,* H. 120 cM. p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

205. „ **Primrose Coloured,** heldergeel, H. 120 cM. p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

206. **cucumerifolius.** H. 120 cM.
p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

Een der schoonste van alle Zonnebloemen voor bouquetten; zij bloeit met tallooze goudgele bloemen tot laat in den herfst.



Helianthus cucumerifolius Orion.

207. **cucumerifolius „Orion"** NIEUW!! p. pakje f 0.15

Deze eenjarige zonnebloem is gewonnen uit de bekende variëteit „Stella" en heeft bloemen, die door hare gedraaide bloembladeren eenigszins aan Cactus-Dahlia's doen denken. Voor bouquetwerk is deze soort uitnemend geschikt. H. 120 cM.

208. **cucumerifolius Stella.** H. 90 cM.
p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

Bekende grootbloemige verscheidenheid.

209. **macrophyllus gigantheus.** *Reuzenzonnebloem.*
H. 240 cM. p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

210. **nanus fol. var.** H. 90 „ „ „ - 0.30, „ „ - 0.10

Lage, bontbladerige variëteit.

IBERIS.

Deze planten kunnen in April op een bed worden gezaaid om later op de perken te worden uitgeplant met 30 centim. tusschenruimte. Men krijgt echter mooier en rijkbloeiender planten, wanneer men half September zaait en in den kouden bak overwintert om ze in April op de perken uit te planten. Bloeitijd Juli-Sept. H. 30 cM.

211. **cononaria Empress,** zuiver wit,
p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

212. „ **princeps.** NIEUW!! „ „ - 0.25

Deze, uit de Iberis Empress gewonnen variëteit is slechts 10—15 cM. hoog. Zij vormt zeer schoone bloemtrossen, even krachtig als die van de hooggroeiende soort, met zuiverwitte bloemkelkjes die sterk afsteken bij het donkergroene loof, en ten getale van 4 of 5 als bij een kandelaber rondom den middelstam staan. De bloem blijft lang goed en zij kan gebruikt worden in perken zoowel als in afzonderlijke potten.

212*a*. **amara,** wit . . p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

213. **umbellata,** in gemengde kleuren,
p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

214. „ **carminea,** karmijnrood,
p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10

215. „ **Rose Cardinal,** NIEUW!!
p. lood f 1.—, p. pakje f 0.20

Zeer schoon, helder rose karmijn.

IMPATIENS BALSAMINA, BALSAMINEN.

De Balsaminen, die genoeg in onze tuinen bekend zijn, worden gewoonlijk in Mei op de perken gezaaid en zoodanig uitgedund, dat ze ± 30 cM. tusschenruimte hebben. Ze laten zich ook gemakkelijk verplanten. Bloeitijd Juli—Sept.

IMPATIENS BALSAMINA, BALSAMINEN.

216. **Dwerg,** dubbele, in vele kleuren gemengd, H. 20 cM., p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10
217. **Rozen,** dubbele, in vele kleuren gemengd, H. 45 cM., p. lood f 0.75, p. pakje f 0.15
218. **Camellia,** dubbele, in vele kleuren gemengd, H. 45 cM., p. lood f 0.75, p. pakje f 0.15
219. **Victoria,** dubbele, in vele kleuren gemengd, H. 45 cM., p. lood f 0.75, p. pakje f 0.15

LATHYRUS ODORATUS CUPIDO.

Deze laaggroeiende nieuwe soort Lathyrus, die niet klimt zooals de andere, is eerst sedert kort uit Amerika ingevoerd en heeft overal veel opgang gemaakt. Ze is buitengewoon rijkbloeiend en kan in April buiten worden uitgezaaid.
Bloeitijd Juni-Aug. Hoogte 20 cM.

220. **wit** . . . . . p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10
221. **rose met wit** . „ „ - 0.20, „ „ - 0.10

(Voor andere Lathyrus-soorten zie onder: „Klimplanten".)

LEPTOSIPHON.

Dit schoone laaggroeiende plantje is zeer rijkbloeind. Een perk er van ziet er in den bloeitijd uit als een bloemtapijt. De bloemen komen voor in verschillende nuances van geel, rood, karmijnrood, enz.
Men zaait op de perken in April en zorgt er voor op tijd uit te dunnen, daar de planten pl. m. 15 cM. tusschenruimte moeten hebben. Bloeitijd Juli—Sept. Hoogte 15 cM.

222. **hybridus,** in gem. kleuren p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10

LEPTOSYNE.

Deze is een der snelst groeiende zomerbloemen. Onder glas bloeit zij reeds binnen 2 maanden, nadat zij gezaaid is. De eenvoudigste kweekwijze is echter om ze buiten uit te zaaien begin Mei. De bloemen zijn helder goudgeel.
Bloeitijd Aug.—Sept.

223. **martima,** H. 30 cM., p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10
224. **Stillmanni,** H. 60 cM. . . . . „ „ - 0.25

Met fijn ingesneden bladeren en zeer schoone, op lange stelen gezeten goudgele bloemen.

LINARIA.

Schoon voor bouquetten. De bloemen zijn geel en bronsachtig violet gekleurd. Men zaait half April en plant de plantjes in boschjes bij elkaar op de perken met een tusschenruimte van ± 25 cM. Nog beter is het om in September te zaaien en onder glas te overwinteren.
Bloeitijd Jul-Sept. Hoogte 30 cM.

225. **aparinoides splendens,** p. lood f 0.25, p. pakje f 0.05
226. **maroccana,** purperviolet, zeer schoon, p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

LINUM.

De schitterend roode kleur maakt dit plantje zeer geschikt voor bloemperken. Men zaait begin Mei en dunt zoodanig, dat de plantjes 20 cM. van elkaar verwijderd komen te staan.
Bloeitijd Juli-Sept. Hoogte 30 cM.

227. **grandiflorum,** *rood Vlas,* p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

LOBELIA.

De Lobelia's zijn genoeg bekend, zoodat elke aanbeveling overbodig geacht kan worden. Voor randen en mozaiekperken vormen zij onmisbaar materiaal. Men zaait begin April in den warmen bak en verspeent ze eveneens onder glas en plant ze einde Mei op de perken. Om voller bosjes te krijgen plante men liefst eenige plantjes bij elkaar. Men kan ze ook nog in Mei op een warm plekje buiten uitzaaien, doch ze beginnen dan natuurlijk later te bloeien.
Bloeitijd Juli-Oct. Hoogte 15 cM.

228. **erinus Kaiser Wilhelm,** helder blauw, p. lood f 1.—, p. pakje f 0.10
229. „ **Prima Donna compacta,** donker rood, p. pakje f 0.20
230. „ **Crystal Palace compacta,** blauw, de donkerste van alle, p. lood f 1.10, p. pakje f 0.10
231. „ **Goldelse,** met goudgeel blad, p. pakje f 0.20
232. „ **White Gem,** de schoonste witte, p. lood f 1.—, p. pakje f 0.10
233. „ **pumila splendens,** NIEUW!! p. p. f 0.20

Zeer schoon laaggroeiende variëteit, donker purper violet gekleurd met zuiver wit hart.



Lobelia erinus tricolor.

233*a*. **Lobelia erinus tricolor „Colibri."** p. pakje f 0.20
233*b*. „ „ „ **„Papegaai"** „ „ - 0.20

Deze beide soorten hebben de eigenaardigheid, dat zij drie kleuren vertoonen, zooals de afbeelding aanduidt. De eerste heeft een zachtrose grondkleur en een wit oog, terwijl de onderste bloembladen donkerkarmijnroode vlekken hebben. De var. „Papegaai" heeft een donkerblauwe grondkleur.

LUPINUS.

De meeste Lupinen-soorten worden half April buiten uitgezaaid. Ze kunnen niet tegen verplanten. Alleen L. Hartwegi, die uit Mexico is ingevoerd en niet goed tegen ongunstig weer kan, moet men bij verkiezing in kleine potjes uitzaaien onder glas en voorzichtig met kluit verplanten. Eene eigenaardigheid der Lupinen is, dat ze 's avonds de bladeren dichtvouwen.

LUPINUS (vervolg).

234. **nanus albo coccineus**, Bloeitijd Juni-Juli, H. 30 cM., . . p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

Laaggroeiend met van wit in karmijnrood overgaande bloemen.

235. **Cruikshankskii**, Bloeitijd Juli-Oct., H. 1 M., p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

Met groote blauwe welriekende bloemtrossen.

236. **Hartwegi** met rose en witte bloemen, H. 60 cM., Bloeit. Juli-Oct., p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05.

237. **hybridus fl. pl. President Cleveland**, met dubbele driekl. bloemen, Bloeitijd Juni-Aug., H. 60 cM. p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

238. **luteus Romulus**, laag, geel. Zeer schoon, H. 30 cM. Bloeit. Juli-Sept. p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

MALOPE.

Hooggroeiende plant met groote rose purperrood gevlekte bloemen. Zij moet in Mei buiten worden uitgezaaid en vereischt zeer weinig zorg. Bloeitijd Juli-Aug. H. 75 cM.

239. **grandiflora**, . . p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

MATRICARIA.

De Matricaria's of dubbele Kamillen moet men in Maart of April onder glas uitzaaien en in Mei buiten uitplanten. Ze worden veelal voor randen om perken gebruikt. Bloeitijd Juli-Oct.

240. **alba plenissima**, met zeer dubbele zuiverwitte bloemen, H. 45 cM. p. lood f 0.40, p. pakje f 0.15

241. **eximia Goldball**, H. 30 cM. . . p. pakje f 0.25

Nieuw met tallooze goudgele bloempjes, zeer geschikt voor randen.

242. **eximia aurea Tom Thumb**, geel, H. 30 cM. p. lood f 0.75, p. pakje f 0.15

MESEMBRIANTHEMUM.

De Mesembrianthemums kunnen einde Mei buiten worden gezaaid; men geve de planten een tusschenruimte van 20 à 25 cM., door op tijd uit te dunnen. Wanneer men ze in Maart in den warmen bak zaait, later verspeent en in Mei uitplant bloeien ze vroeger. H. 15 cM.

243. **crystallinum**, *IJskruid*, Bloeitijd Juni-Juli, p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

Eigenaardige bladplant, die geheel bedekt is met kristalachtige blaasjes, waardoor ze er als bedekt met ijs uitziet. Ze wordt veel gebruikt als hangplant in potten.

244. **tricolor**, Bloeitijd Juni-Sept. p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

De schoone rose bloemen openen zich alleen volkomen in de volle zon.

245. **tricolor album**, wit, Bloeitijd Juni-Sept., p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

MIMULUS.

De Mimulus-soorten worden in den warmen bak in Mrt. uitgezaaid, onder glas verspeend en in Mei buiten uitgeplant. Daar het zaad zeer fijn is moet men het niet met aarde bedekken, doch eenvoudig aandrukken en een weinig begieten. Zoodra mogelijk moeten de plantjes worden verspeend. Door hare levendige kleuren zijn deze planten zeer gezocht ook voor potcultuur. Bloeitijd Juni-Sept.

MIMULUS (vervolg).



Mimulus gracilipes.

246. **cupreus**, koperkl. oranje, H. 45 cM., p. pakje f 0.25

247. **gracilipes**, NIEUW! . . . . . „ „ - 0.20

Deze zeer bizondere variëteit is uit Californië ingevoerd; ze is 15—20 cM. hoog, heeft heldergroene lancetvormige bladen en vormt bloemen van $2^1/_2$ cM. middellijn. Deze laatste zijn karmijnrood met donkere vlekken aan den bovenrand, terwijl het hart wit is met roode aderen en stippen.

248. **hybridus grandiflorus Feuerkönig**, vuurrood met geel, purper gevlekt, H. 30 cM. p. pakje f 0.20

249. **moschatus compactus**, *Muskusplant*, H. 15 cM. p. pakje f 0.20

250. **tigrinus**, met schoone getijgerde bloemen, H. 30 cM. p. pakje f 0.15

MIRABILIS.

Deze planten hebben zeer opvallende bloemen in allerlei kleuren en nuances. Ze worden in April in den warmen bak uitgezaaid en in Mei op de perken geplant. Men kan ook in Mei buiten uitzaaien, doch dan bloeien ze later. De knollen die zij vormen kunnen op dezelfde wijze als de Dahlia's worden overwinterd en des voorjaars weer worden uitgeplant. Bloeitijd Juli-Aug.

251. **Jalapa**, *Nachtschoone*, in vele kleuren gemengd, H. 60 cM. p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

252. „ **Tom Thumb**, zeer laaggroeiend in vele kleuren gemengd, H. 30 cM. p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

NEMESIA.

De schoone groote bloemen dezer nieuwe uit Engeland ingevoerde plant bloeien in verschillende kleurschakeeringen van wit en geel tot oranje en karmijnrood. De plant moet echter met eenige zorg worden behandeld en in Maart onder glas worden uitgezaaid. Bloeitijd Juli-Aug.

253. **strumosa Suttoni**, . H. 30 cM. p. pakje f 0.30


254. „ „ **compacta nana**, H. 20 cM. p. pakje f 0.20

Laaggroeiende, zeer rijkbloeiende variëteit.

NEMOPHILA.

Door hare zoo frissche en teere kleuren zijn deze planten zeer aantebevelen voor vroege perken. In den bloeitijd zijn ze als met een tapijt van bloemen overdekt. Ze worden in Maart of April op de perken gezaaid en bij het uitdunnen zorge men dat de planten 15 à 20 cM. tusschenruimte behouden. Bloeitijd Juni-Aug. H. 20 cM.

NEMOPHILA (vervolg).



Nemophila maculata.

255. **atomaria Holborn Bleubell,** donkerblauw, p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10
256. „ **discoidalis,** donkerbruin met witten rand, p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
257. **insignis,** lichtblauw met wit, p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
258. **maculata,** wit met donkerviolette vlekken. p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

NICOTIANA.

De verschillende siertabak-soorten worden liefst in den warmen bak uitgezaaid en niet vóór begin Juni uitgeplant. N. affinis kan ook in Mei buiten worden gezaaid, doch bloeit dan wat later. Bloeitijd Juni-Aug.

259. **affinis,** witbloeiende *Siertabak,* H. 75 cM., p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

De bloemen dezer soort zijn zeer welriekend.

260. **colossea,** *Reuzentabak,* H. 240 cM., p. pakje f 0.20
261. **macrophylla gigantea,** „ 120 „ „ „ - 0.15

De beide laatste soorten zijn bladplanten en maken als zoodanig in groepen bij elkaar geplant een verrassend effect.

262. **sylvestris,** NIEUW!! . . . . p. pakje f 0.10

Zeer schoon voor alleenstaande plant, maar toch maakt deze groep het mooiste effect. Ze groeit 8 voet hoog en bloeit met zuiver witte lange, eenigszins neerhangende bloemen.

NIGELLA.

Dit plantje is zoo algemeen bekend, dat elke beschrijving overbodig kan geacht worden. Men zaait buiten half April. Bloeitijd Juni-Aug. H. 30 cM.

263. **damascena,** *Juffertje in 't groen,* p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

NYCTERINIA.

Laaggroeiend plantje, dat in Maart onder glas moet worden gezaaid. Bloeitijd Juni-Sept. H. 15 cM.

264. **selaginoides,** zeer rijkbloeiend en welriekend, p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

De kleur der bloemen gaat van zuiverwit over in licht rose of violet; in 't midden oranjegevlekt.

OENOTHERA.

Deze plant kan zich zeer forsch ontwikkelen. Men zaait in Maart-April in den kouden bak en plant in Mei uit op onderlingen afstand van 75 cM. Men kan ook einde April buiten uitzaaien.

De bloemen hebben een fijnen geur en blijven, afgesneden, zeer lang goed, terwijl de knoppen zich nog openen. Eene eigenaardigheid van deze plant is nog dat de bloemen zich eerst geheel openen in den namiddag. Bloeitijd Juli-Oct.

265. **Lamarckiana,** H. 90 cM., p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
266. **rosea mexicana** . . „ „ - 0.45, „ „ - 0.10

Zeer lage, slechts 20 cM. hooggroeiende variëteit met karmijn-rose bloemen.

OXALIS.

De Oxalis-soorten zijn zeer dankbaar bloeiende plantjes, die zeer veel voor randen worden gebruikt en ook geschikt zijn voor potcultuur. Men kan ze einde April of in Mei buiten uitzaaien en zorge bij het uitdunnen ± 15 cM. tusschenruimte te behouden. Bloeitijd Juli-Sept. H. 15 cM.

267. **rosea delicata,** helder rose . . p. pakje f 0.15
268. **tropaeoloides,** bruinbladerig met gele bloemen, p. pakje f 0.10

PAPAVER.

De Papavers behooren tot de meest bekende en beminde zomerbloemen. De bloemen komen voor in allerlei kleurennuances. Ze laten zich zeer gemakkelijk kweeken; men zaait ze half April op den kouden grond en zorgt voor behoorlijk op tijd uitdunnen. Ze kunnen niet tegen verplanten. Bloeitijd Juli-Sept.

269. **Danebrog,** scharlakenrood met zilverwitte vlekken. H. 45 cM., p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
270. **Hookeri,** enkele in gem. kleuren. H. 60 cM. p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10
271. **Mephisto,** donkerscharlakenrood met zwart violette vlekken, H. 60 cM. p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
272. **Murselli fl. pl. The Mikado,** dubb. wit met karmijn gestr. bloemen. H. 60 cM. p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10
273. **paeoniflorum fl. pl.** dubbel in vele kleuren gemengd. H. 60 cM. p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

paeonifl. Miss Sherwood, zie Nieuwe Invoeringen van het vorige jaar.

Rhoeas nanum, zie Nieuwe Invoeringen v/h. vorige jaar.

274. **Rhoeas Shirley,** enkele in gem. kleuren. H. 60 cM. p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10
275. **Somniferum fl. pl.,** in kleuren gemengd. H. 90 cM. p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
276. „ **nanum fl. pl.** in kleuren gem. H. 45 cM. p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

PERILLA.

De Perrilla's kunnen onder de beste sierbladplanten worden gerekend en worden dikwijls gebruikt voor randen om hooggroeiende bloemperken, als b v. Canna's Dahlias enz. Ze maken dan een zeer schoon effect. Men zaait ze einde Maart in den warmen bak, verspeent ze onder glas, terwijl ze dan in Mei kunnen worden uitgeplant.


277. **nankinensis,** bekende bruinbladerige sierplant. H. 45 cM. . . p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
278. **nankinensis macrophylla crispa compacta,** met groote sterk gekrulde bladeren. H. 30 cM. p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10
279. **nankinensis, microphylla nigricans** met fijne zwartroode bladeren, H. 30 cM. p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

PETUNIA.

De Petunia's kunnen zonder twijfel tot de schoonste bloeiende planten worden gerekend, dank zij de groote verscheidenheid en de meest schitterende kleuren en vormen harer bloemen. Zij bloeien den geheelen zomer aanhoudend door. Men kan ze voor allerlei doeleinden gebruiken, zooals voor perken, balcons, groote tuinvazen, versiering van oude muren en ruïnen enz. en vooral wat betreft de grootbloemige en dubbele soorten voor potcultuur.

Daar de kweekwijze doodeenvoudig is behoeft dit niemand af te schrikken om ze te zaaien. In Maart of April zaait men in een lauwwarmen bak in potten of zaaipannen gevuld met lichten tuingrond. Men moet ze later onder glas verspenen en na eenige weken uitplanten, hetzij in potten, hetzij op den kouden grond zoodra het weer dit toelaat. Op de perken moet men ze niet dichter planten dan 50 cM. Nog valt bij het zaaien op te merken, dat de zeer fijne zaden bijna of in 't geheel niet met aarde mogen worden bedekt. Indien men geen bak ter zijner beschikking heeft, kan men ook in potten in de kamer zaaien, om ze, zoodra de plantjes sterk genoeg zijn, te verplanten. Bij deze planten, vooral bij de dubbele valt nog op te merken, dat men niet zooals dit zoo dikwijls geschiedt bij het verspenen of verplanten de mooiste en zwaarste planten uitzoekt, daar deze meesttijds bloemen van mindere qualiteit voortbrengen. Men kan van de mooiste soorten ook planten overwinteren in kamer of serre en dan in 't voorjaar stekken. Bloeitijd Juli-Oct. H. 45 cM.

280. **hybrida**, gewone in schoone kleuren gemengd.
p. lood f 0.50, p. pakje f 0.10



Petunia hybr. grandifl. fimbriata.

281. **hybrida compacta nana multiflora**, laaggroeiend, karmijnrood met witte ster geteekend. H. 20 cM.
p. lood f 2.10, p. pakje f 0.15
282. **hybrida grandiflora**, grootbloemige prachtsoorten gemengd . . . . p. pakje f 0.20
283. **hybrida grandiflora alba**, zuiverwit p. pakje f 0.25
284. „ „ **rosea**, rose „ „ - 0.20
285. „ „ **Purperkönig**, nieuw.
p. pakje f 0.30
286. „ „ **fimbriata**, gekartelde in de schoonste grootbloemige soorten, p. pakje f 0.15
287. **hybrida grandiflora superbissima**, zeer schoon,
p. pakje f 0.20
288. „ „ „ **Favoriet** roselila, wit gestreept . . . . . p. pakje f 0.60

PETUNIA (vervolg.)

289. **hybrida grandiflora superbissima Venus**, karmijnrood met wit, p. pakje f 0.60
290. „ „ **fl. pl.**, dubbel grootbl. prachtsoorten gem. p. pakje f 0.70
291. „ „ **fimbriata fl. pl.**, gekartelde gemengd . . . . p. pakje f 0.75

N.B. De dubbele Petunia's geven ± 25 % dubbele bloemen.

PHACELIA.

Zeer schoon plantje met satijnblauwe klokvormige bloemen; ook uitnemend geschikt voor randen. Men zaait in April-Mei op de perken en geve bij het uitdunnen de plantjes eene tusschenruimte van circa 25 cM. Bloeitijd Juli-Sept. H. 30 cM.

292. **campanularia** . p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10
292a. **tanacetifolia**, . „ „ - 0.15, „ „ - 0.05
Prachtig bijenvoeder-gewas.

PHLOX DRUMMONDI.

De *Phlox Drummondi* kan zonder twijfel tot de schoonste en dankbaarste zomerbloemen worden gerekend. Door het groote aantal varieteiten, dat thans bestaat, maar waaruit ik echter alleen de beste en meest uiteenloopende heb gekozen, kan men met deze planten de meest kleurrijke perken maken. De kweekwijze is zeer eenvoudig. Men kan ze zaaien op den kouden grond in April-Mei, en bij het uitdunnen de planten eene tusschenruimte van ± 15 centim. laten behouden. Ook zaait men ze in Maart-April in den kouden bak; zoodra de planten eenige blaadjes hebben, kan men ze op de perken zetten en ze dan wat meer ruimte geven, b.v. 25 centim. Om laat in het najaar nog Phloxbloemen te kunnen snijden voor bouquetten, zaait men ook nog in 't begin van Juni. Bloeitijd Juli-Oct. H. 45 cM., de lage soorten 20 cM.

293. **in schoone kleuren gemengd**,
p. lood f 0.50, p. pakje f 0.10
294. **cuspidata**, met spits toeloopende bloembladen in schoone kleuren gem., p. lood f 0.80, p. pakje f 0.15
295. **fimbriata**, m. franjeachtige bloembladeren in schoone kleuren gemengd, p. lood f 1.10, p. pakje f 0.20
296. **grandiflora**, grootbloemige prachtsoorten gemengd,
p. lood f 0.70, p. pakje f 0.10
297. „ **alba**, zuiverwit, p. lood f 0.80, p. pakje f 0.15
298. „ **atropurpurea**, p. lood f 0.80, p. pakje f 0.15
299. „ **Brillant**, rose, p. lood f 0.95, p. pakje f 0.20
300. „ **Striata coerulea**, blauw gestreept,
p. lood f 1.20. p. pakje f 0.20
301. „ **carnea**, vleeschkleur,
p. lood f 0.95, p. pakje f 0.20
302. „ **isabellina**, isabellageel,
p. lood f 1.10, p. pakje f 0.20
303. „ **kermesina albo-oculata**, karmijnrood met wit oog, p. lood f 0.80, p. pakje f 0.15
304. „ **vermiljoen-scharlakenrood**, nieuw,
p. pakje f 0.20
305. „ **violacea albo-oculata**, violet met wit oog,
p. lood f 0.80, p. pakje f 0.15
306. „ **splendens**, schitterend scharlakenrood met wit oog, p. lood f 0.80, p. pakje f 0.15
307. „ 6 pakjes in 6 soorten f 0.60

PHLOX DRUMMONDI (vervolg)

308. **grandiflora nana compacta,** prachtige lage soorten gemengd, p. lood f 1.80, p. pakje f 0.20
309. „ **nana compacta atropurpurea,** purperrood p. lood f 2.70, p. pakje f 0.30
310. „ „ **compacta coccinea,** (Feuerball) p. lood f 2.75, p. pakje f 0.30
311. „ „ **compacta coerulea stellata,** nieuw, helderbl. m. wit oog, p. pakje f 0.30
312. „ „ **compacta nivea,** (Schneeball), p. lood f 1.80, p. pakje f 0.20
313. **Heynholdi,** gemengd. p. lood f 2.75, p. pakje f 0.30
314. **hortensiaeflora,** in vele kleuren gemengd, p. lood f 0.75, p. pakje f 0.15

PORTULACA.

Voor bloemperken kunnen de Portulaca's met hare levendig gekleurde bloemen, vooral op zonnig gelegen plaatsen, niet genoeg worden aanbevolen. Hetzij men buiten zaait of in den bak, moet er steeds aan worden gedacht, dat dit zaad weinig of niet met aarde mag worden bedekt. Wil men direct op de perken zaaien, zoo doe men dit niet dan na half Mei bij gunstig weder. Zekerder is men evenwel wanneer men in den bak zaait omstreeks half April en ze ook na het verspenen onder glas houdt. Men kan de plantjes dan half Mei of begin Juni, naar gelang van het weder op de perken zetten en zorge voor een afstand van 15 à 20 cM. Bloeitijd Juli—Sept.

315. **grandiflora,** enkele in vele kleuren gem., kruipend, p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10
316. „ . . . 6 pakjes in 6 kleuren f 0.60
317. „ **Bedmanni,** zuiver wit met purperkleurige vlekken, p. lood f 0 50, p. pakje f 0.15
318. „ **compacta,** gemengd, NIEUW! p. pakje f 0.20

Deze soort, welker groeiwijze zeer gedrongen is, levert eene overvloedige menigte bloemen. Zij bloeit reeds zeer vroeg en duurt den geheelen zomer. Wegens hare schoonheid zeer aan te bevelen.

319. **grandiflora plenissima,** dubbele prachtsoorten gemengd, p. lood f 4.50, p. pakje f 0.30
320. „ **plenissima,** 6 pakjes in 6 kleuren f 0.80

RESEDA.

De Reseda's zijn zoo algemeen bekend, dat hierover niet veel behoeft te worden gezegd. Men zaait in den vollen grond in de eerste helft van Mei. Om het lang doorbloeien te bevorderen moet men geregeld de uitgebloeide takjes afsnijden. Bloeitijd Juni-September.

321. **odorata grandiflora,** *gewone Reseda,* H. 30 cM., p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
322. „ „ **compacta Juweel,** NIEUW! H. 20 cM., p. lood f 2.75, p. pakje f 0.25

Lage variëteit met groote goudbronskleurige bloemtrossen.

323. **odorata grandifl. compacta nana Victoria,** H. 20 cM., p. lood f 0.45, p. pakje f 0.10

Laaggroeiend, met roodbruine bloemtrossen.

324. **odorata Crimson Queen,** grootbloemig rood, H. 30 cM., p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10
325. „ **eximia,** wit, H. 30 cM., p. lood f 0.45, p. pakje f 0.10

RESEDA (vervolg).

326. „ **Machet,** gedrongen groeiwijze met groote roode bloemen, H. 20 cM., p. lood f 0.60, p. pakje f 0.15
327. „ „ **goudgeel,** nieuw, H. 20 cM., p. lood f 0.45, p. pakje f 0.10



Reseda Goliath.

327*a*. **Goliath** . . . . , p. pakje f 0.45

Deze **Reseda odorata maxima** heeft eene gedrongene kandelaber-vormige groeiwijze. De helder roode bloemstruiken groeien recht opwaarts en hebben bij eene lengte van 18 cM. menigmaal een doorsnede van 6½ cM. Deze variëteit stelt zoowel door haar schitterende kleur als door haar ongeëvenaarde geur zoozeer alle Reseda-soorten in de schaduw, dat ze zonder eenig voorbehoud de schoonste van allen mag genoemd worden.

De bloemen blijven wanneer ze afgesneden zijn, in water 8—10 dagen goed.

328. **odorata Victoria,** donkerbruinrood, H. 30 cM., p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

RICINUS.

Voor groote perken zijn deze reusachtige snelgroeiende bladplanten ten zeerste aan te bevelen. Ze hebben een eenigszins tropisch voorkomen; wil men ze goed tot ontwikkeling zien, zoo moet men den grond flink mesten. Men zaait de pitten half Mei op den kouden grond.

329. **borboniensis arboreus**, *Wonderboom*, H. 120 cM. p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

330. **Gibsoni** . . . . „ „ - 0.15, „ „ - 0.05

Deze variëteit, die tot 3 Meter hoog kan groeien, heeft prachtige donkerroode bladeren met metaalachtigen glans.

331. **sanguineus** . . p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05


Groeit tot 2 Meter hoog en heeft bloedroode vruchten.

332. **Zanzibariensis**, H. 150 cM., p. lood f 0.15, p. p. f 0.05

Met groote lichtgroene witgenerfde bladeren, die ± 70 cM. breed worden.

SALPIGLOSSIS.

Deze planten hebben zeer schoone, grillig gekleurde bloemen; zij laten zich niet gemakkelijk verplanten en worden begin Mei op een warm plekje uitgezaaid. Bloeitijd Juli-Sept.



Salpiglossis variabilis.

333. **variabilis grandiflora**, in vele kleuren gemengd, H. 75 cM. . . p. lood f 0.50, p. pakje f 0.15

334. **variabilis nana**, in vele kleuren gemengd, H. 30 cM. . . p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

SALVIA.

De Salvia's kunnen in het voorjaar in kas of bak gezaaid worden, om in Mei buiten te worden uitgeplant. Ze bloeien het eerste jaar uit zaad van Juli tot het gaat vriezen, maar ze zijn half vaste planten.

335. **coccinea** . . . p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

Groeit ongeveer 30 cM. hoog, en heeft schoone vuurroode bloemen.

336. **coccinea lactea**. Variëteit der voorgaande, met zuiver witte bloemen, p. lood f 0.50, p. pakje f 0.15

SANVITALIA.

Dit plantje is zeer geschikt voor randen. Men zaait in April in den bak, verspeent onder glas en verplant ze in Mei met een tusschenruimte van pl. m. 40 cM. Bloeitijd Juli—Sept. H. 55 cM.

337. **procumbens plenissima compacta**, p. pakje f 0.10

Met schoone dubbele zwart met geel gekleurde bloemen.

SAPONARIA.

Kruipend plantje, dat zeer rijk bloeit. Men zaait op den kouden grond in Maart of April. Bloeitijd Juli-Oct. H. 15 cM.

338. **multiflora**, rose, p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05

339. „ **alba**, wit, p. lood f 0.20, p. pakje f 0.05

340. „ **Scarlet Queen**, scharlakenrood, p. lood f 0.25, p. pakje f 0.05,

SCABIOSA.

De *Scabiosa's* laten zich uiterst gemakkelijk kweeken. Men zaait ze in April-Mei hetzij direct op de perken, of eerst op een bed om ze later uit te planten. Ze hebben dit voordeel, dat het verplanten zonder eenig nadeel kan geschieden, en men kan daarmede zelf wachten tot dat de eerste bloemen verschijnen. Een paar malen flink begieten is voldoende om de planten te laten doorgroeien. Men geeft ze een tusschenruimte van 40 centim. Bloeitijd Juli-Oct.

341. **atropurpurea candidissima plena**, H. 60 cM. p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

Dubbele bloemen; extra mooi voor bouquetten.

342. **major atropurpurea grandiflora compacta fl. pl.**, H. 30 cM. p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

Met groote dubbele bloemen in vele kleuren gemengd.

243. **atropurpurea maxima plena**, met zeer groote en dubbele bloemen in vele kleuren gem., H. 60 cM. p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

344. **atropurpurea nana plena**, laag in vele kleuren gem., H. 30 cM. p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

345. „ **nana plena**, *zwartbruin*, H. 30 cM. p. lood f 0.20, p. pakje 0.10

SCHIZANTHUS.

Deze planten hebben zeer eigenaardig gevormde en fraai gekleurde bloemen, die eenigszins aan vlinders doen denken, waardoor ze zeer gezocht zijn, voor bouquetten. Men zaait in April-Mei op den kouden grond. Ook kan men ze met succes in potten kweeken. Bloeitijd Juli-Oct.

346. **pinnatus Tom Thumb**, laaggroeiend in gem. kleuren, H. 30 cM. p. lood f 0.15, p. pakje f 0.10

347. **retusus**, met roode bloemen H. 60 cM. p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

348. „ **albo-maculata**, rood met witte vlekken, H. 60 cM. p. lood f 0.40, p. pakje f 0.15

SEDUM.

Dit plantje groeit slechts 7 à 8 cM. en brengt lieve kleine blauwe bloempjes voort. Men kan buiten uitzaaien. Zeer schoon voor randen en mozaiek vakken. Bloeitijd Juni-Juli.

349. **coeruleum**, . . . p. pakje f 0.20

SENECIO.

Uitmuntend plantje voor randen, dat bijna op elken grond groeit. Men zaait in April-Mei op den kouden grond en geve bij het verplanten minstens 40 à 50 centim. tusschenruimte, waardoor de planten zich beter zullen ontwikkelen dan wanneer ze te dicht staan. De afgesneden bloemen blijven in water zeer lang goed. De bloemen komen voor in de meest verschillende nuances van rose, lila, violet, rood tot wit. Bloeitijd Juli-Oct. H. 20 cM.

350. **elegans nanus plenissimus**, in vele kleuren gemengd, p. lood f 0.55, p. pakje f 0.10

351. „ **plenissimus**, in kleuren gemengd, p. lood f 0.45, p. pakje f 0.10

352. „ **pomponicus fl. pl.**, in gemengde kleuren, p. lood f 0.60, p. pakje f 0.10

Allerliefste variëteit met dubbele kleine ronde bloemen.

SILENE.

Daar de *Silene's* tot de vroegst bloeiende planten behooren, worden ze veelvuldig gebruikt voor het beplanten van voorjaarsperken waarvoor ze door den grooten rijkdom van bloemen uitnemend geschikt zijn. Als een perk hiervan in vollen bloei is, ziet men letterlijk niets dan bloemen. Ofschoon men ze ook wel in 't voorjaar kan zaaien, en ze dan natuurlijk later bloeien, voldoet najaarszaaiing het best. Men zaait einde Juli of Augustus, verspeent de plantjes op 15 centim. afstand en plant ze begin October op de perken met een tusschenruimte van 30 centim. Men moet ze met dennetakken of ander licht materiaal voor strenge vorst dekken. Bloeitijd Mei of Juli.

353. **pendula compacta**, rood H. 15 cM.
p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

354. „ „ **alba**, wit H. 15 cM.
p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

355. „ „ **fl. pl.**, dubbel rose H. 15 cM.
p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

356. „ „ **foliis aureus** goudgeel H. 15 cM.
p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

357. „ **Bonnetti**, donkerpurperrood H. 30 cM.
p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

358. „ **ruberrima**, donkerrood H. 30 cM.
p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

STATICE.

De bloemen dezer fraaie planten zijn zeer schoon voor bouquetten. Wanneer men de bloemstengels afsnijdt en op eene donkere droge plaats onderstboven ophangt totdat ze droog zijn, blijven ze zeer lang goed en zullen de bloemen hare natuurlijke kleur behouden, evenals de Immortellen. Zij wordt begin Mei buiten gezaaid. Bloeitijd Juli-Sept. H. 45 cM.

359. **sinuata**, blauw . p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

360. **superba fl. albo**, zuiver wit,
p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10

361. **Suworowi**, met lange zeer ijle helderrose bloemtrossen,
p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

TAGETES.

De *Afrikanen* zijn zeer algemeen bekende zomerbloemen, doch daarom niet minder in waarde voor den bloemenliefhebber. Ze vereischen bizonder weinig zorg en de afgesneden bloemen blijven lang frisch. De planten laten zich zelfs wanneer ze reeds volop in knop zijn nog met succes verplanten. Men zaait ze einde April op een warm bed en verspeent ze op tijd, om ze einde Mei of tegen den tijd dat ze beginnen te bloeien, met kluitjes op de perken te zetten. De hooge soorten geve men 50 cM., de lage 30 cM. tusschenruimte. Na het planten moet men flink aangieten. Bloeitijd Juli-Sept.

362. **erecta aurantiaca plena** *hooge Africaan*, met oranjebloem. H. 75 cM. p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

363. „ **Eldorado** *hooge Afrikaan*, met enorm groote bl. oranje. H. 1 M. p. lood f 0.35, p. pakje f 0.15

364. „ **Prins van Oranje**, zuiver oranje,
H. 60 cM. p. lood f 0.60, p. pakje f 0.15

365. **patula nana fl. pl. Electrisch licht**,
H. 45 cM. p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10
Zwavelgeel met bruine streepen.

TAGETES (vervolg).

366. **patula nana Légion d' Honneur**, *lage enkelbloemige Afrikaan*, geel met bruine vlekken.
H. 30 cM. p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

367. „ „ *lage Afrikaan*, in gemengde kleuren.
H. 30 cM. p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

368. **signata pumila**, zeer laag, rijkbloeiend met schoon geteekende oranje en bruingekleurde bloemen.
H. 20 cM. . . p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

TROPAEOLUM (lage Oost-Ind. Kers.)

De laaggroeiende *Oost-Ind. Kers* kan begin Mei worden gezaaid op den kouden grond. Bloeitijd Juli-Oct. H. 30 cM.

369. **majus nanum** *lage Oost-Ind. Kers* in kleuren gemengd,
p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

370. „ „ **Aurora**, donkergeel met bruine vlekken,
p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

371. „ „ **Empress of India**, met donkere bladeren en scharlakenroode bloemen,
p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

372. „ „ **King Theodore**, zwartrood,
p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

373. „ „ **Pearl**, geelachtig wit,
p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

VERBENA.

De *Verbena's* met hare schitterend gekleurde bloemen, die den geheelen zomer doorbloeien, leenen zich bij uitstek voor bloeiende perken. Men zaait einde Maart in den bak, verspeent de jonge plantjes onder glas hetzij eenvoudig in den bak of in potjes en plant ze half Mei op de perken met een tusschenruimte van 30 cM. De laaggroeiende verscheidenheden kan men iets dichter planten. Wanneer men begin Mei op den kouden grond zaait, zullen de planten in den nazomer bloeien. Bloeitijd Juni-Sept. H. 30 cM.

374. **hybrida**, in vele kleuren gemengd.
p. lood f 0.60, p. pakje f 0.15

375. „ **coccinea**, zuiver scharlakenrood.
p. lood f 0.80, p. pakje f 0.15

376. „ in grootbloemige prachtsoorten, gemengd,
p. lood f 0.65, p. pakje f 0.15

377. „ **aurikelbloemige** met wit oog,
p. lood f 1.—, p. pakje f 0.20

378. „ **candidissima**, zuiver wit,
p. lood f 0.65, p. pakje f 0.10

379. „ **Défiance**, scharlakenrood,
p. lood f 1.20, p. pakje f 0.20

380. „ **grandiflora Mammoet**, in kleuren gemengd,
p. lood f 1.30, p. pakje f 0.25


381. „ **compacta**, laaggr., in vele prachts. gem.,
p. lood f 1.10, p. pakje f 0.20

382. „ „ **pumila**, purperkleurig m. wit hart,
NIEUW! . . p. pakje f 0.30

Deze variëteit groeit slechts 15 cM. hoog met eene doorsnede van 25 à 30 cM. Zeer geschikt voor randen en mozaiekvakken. Een echte miniatuur-Verbena.

VIOLA TRICOLOR MAXIMA.

De beste tijd van zaaien voor de grootbloemige Viooltjes is einde Juli in den vollen grond. Zoodra de planten eenige blaadjes hebben, verspeent men ze in goeden grond op een afstand van 10 centim. om ze later, b.v. in de laatste helft van October met een kluitje op de perken te zetten, na deze eerst flink te hebben bemest. Men plant ze dan op 30 centim. afstand van elkaar. Bij strenge koude is het goed ze met eenige ruigte of dennentakken licht te bedekken. Op deze wijze behandeld zullen de bloemen hare volkomene grootte bereiken. Men kan ook in 't voorjaar zaaien, maar de bloemen worden dan veel kleiner. Bloeitijd Maart-Juli. H. 15 cM.



Viola tricolor maxima.

383. *Grootbloemige Engelsche Pensées* of *Viooltjes*, in vele kleuren gem., p. lood f 0.70, p. pakje f 0.10
384. **alba pura (Schneewitchen)**, zuiver wit, p. lood f 0.85, p. pakje f 0.15
385. **Cardinal**, prachtige bruinroode kleur „ „ - 0.20
386. **Feuerkönig**, zeer schoon geel met purperkleurig en bruin oog . . p. lood f 0.80, p. pakje f 0.15
387. **Kaiser Wilhelm**, donker blauw met purperviolet oog, p. lood f 0.70, p. pakje f 0.25
388. **Lord Beaconsfield**, purperviolet, bovenste bloembladen wit . . p. lood f 0.75, p. pakje f 0.15
389. **nigra (Dr. Faust)** zwart, p. „ - 0.85, „ „ - 0.20
390. **Bugnot's prachtsoorten**, in vele nuances met groote groote vlekken . . . . . . p. pakje f 0.30
391. **Cassier's** grootbloemige drie- en vijfvlekkige prachtsoorten gemengd . . . . . p. pakje f 0.25
392. **Odier**, schoone drie- en vijfvlekkige fransche Pensées in vele nuances . . . . . . p. pakje f 0.20
393. **Trimardeau**, *Reuzenpensées*, gemengd, p. pakje f 0.20

Nieuwe uit Frankrijk ingevoerde pensées, welke zich kenmerken door gedrongen groeiwijze en buitengewoon groote bloemen, die meestal met groote vlekken zijn geteekend en in verschillende kleuren voorkomen. De bloemen hebben een middellijn van 7 à 10 centim.

394. **Trimardeau Adonis**, NIEUW!! Helderblauw met wit hart . . . p. lood f 2.75, p. pakje f 0.20
395. **Trimardeau atro-purpurea**, donkerpurperrood, p. lood f 1.20, p. pakje f 0.15
396. „ **candidissima**, zuiver wit, p. lood f 1.75, p. pakje f 0.20
397. „ **Goldelse**, goudgeel, p. lood f 2.—, p. pakje f 0.20

VISCARIA.

Dit laaggroeiende plantje brengt het geheele seizoen bloempjes voort van verschillende kleuren, maar met purperrood hart. Het kan buiten worden uitgezaaid. Bloeitijd Juni-Aug. H. 30 cM.

398. **nana rosea** . . p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10
399. „ **cardinalis** . „ „ - 0.35, „ „ - 0.15
400. **oculata**, kleuren gem., p. ld. f 0.20, „ „ - 0.10

WHITLAVIA

Men zaait deze plantjes begin Mei op de perken. De aardige heldergekleurde klokvormige bloempjes verschijnen reeds zeer vroeg en in grooten getale.
Bloeitijd Juni—Augustus. Hoogte 30 cM.

401. **grandiflora**, vroeg bloeiende met schoone blauwe bloemen, p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10
402. „ **alba**, zuiverwit, p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10
403. **gloxinioides**, wit met blauwgevlekte klokjes, p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

ZINNIA.

De *Zinnia's* behooren tot de meest bekende zomerbloemen. Men zaait ze op een warm plekje in den tuin omstreeks half April, en zoodra de planten eenige blaadjes hebben, verspeent men ze, hetzij direct op de perken, of nog beter eerst op een bed om ze later met een kluitje te verplanten. Men geve de planten 40 à 50 centimeter tusschenruimte.
Bloeitijd Juli—October.

404. **elegans**, enkele in vele kleuren gemengd, H. 60 cM., p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
405. „ **laciniata fl. albo pl.**, NIEUW! H. 60 cM., p. lood f 0.75, p. pakje f 0.20

Dubbele witte Zinnia met diep ingesneden bloembladen.

406. **elegans fl. pl.**, dubbele in vele kleuren gemengd, H. 60 cM., p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10
407. „ „ „ 6 pakjes in 6 kleuren f 0.60.
408. „ **pomponica fl. pl.**, in kleuren gemengd, H. 60 cM., p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10



Zinnia elegans plennissima.

ZINNIA (vervolg).

409. **elegans fl. pl. Tom Thumb,** *Dwerg Zinnia's*, in prachtsoorten gem., H. 30 cM., p. lood f 0.70, p. pakje f 0.15
410. **Haageana plenissima imbricata**, dubbele variëteit, H. 30 cM., p. lood f 0.90, p. pakje f 0.20
411. **hybrida**, H. 60 cM., p. lood f 1.60, p. pakje f 0.25

Nieuwe hybriden in de prachtigste kleuren, enkele en dubbele gemengd.

ZINNIA (vervolg).

412. **elegans fl. pl. Miniatuur.** NIEUW! p. lood f 1.10, p. pakje f 0.20

Geen beter naam zou aan deze dwerg onder de Zinnia's kunnen gegeven worden. De geheele plant wordt met de bloemstengels slechts 10—12 cM. hoog; ze groeit zeer gedrongen, bloeit langen tijd en kan, terwijl ze bloeit, nog verplant worden. De kleur variëert tusschen wit en scharlakenrood.

ZADEN VAN KLIMPLANTEN.

Bloeitijd Juli-Oct.

ARISTOLOCHIA.

Prachtige klimplant die in den bak wordt uitgezaaid en zeer wel groeit. Meestal bloeit ze reeds het eerste jaar.

413. **elegans** p. lood f 2.75, p. pakje (100 korrels) f 0.15

Zeer rijkbloeiend met bruine en gele bloemen.

414. **ornithocephala** . . p. pakje (100 korrels) f 0.35

Met zeer groote bruingevlekte bloemen.

CLITORIA.

De Clitoria is een prachtige rijkbloeiende klimplant. Ze wordt in den bak uitgezaaid.

415. **ternatea fl. pl.** . . p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

COBAEA.

Voor bedekking van muren wordt deze snelgroeiende plant met succes gebruikt. De groote klokvormige bloemen zijn eerst groen doch kleuren zich spoedig prachtig violetblauw. Men zaait begin April in den bak

416. **scandens** . . . . p. pakje f 0.15

ECCREMOCARPUS.

In Maart in den warmen bak uitgezaaid en daarna verspeend, worden de plantjes begin Mei buiten geplant. Het is een der schoonste klimplanten met tallooze oranjekleurige bloemen en zeer geschikt voor bedekking van muren en schuttingen.

417. **scaber** . . . . p. pakje f 0.15

HUMULUS.

Deze plant groeit snel en zeer hoog, is goed bestand tegen het weder en daardoor vooral geschikt tot het bedekken van prieeltjes, welke op open plaatsen zijn gelegen. Men zaait in April op den kouden grond.

418. **japonicus**, *Japansche Hop* . . . p. pakje f 0.10
419. „ **fol. var.** . . . . . . „ „ - 0.15

Met witbonte zilverachtige bladeren. Maakt een prachtig effect.

420. „ **lutescens** . . . . . p. pakje f 0.15

Met geelachtige bladeren. Zeer eigenaardig.

IPOMAEA.

Deze plant wordt ook wel klimmende Convolvulus genoemd en is zeer geschikt voor balkons. Zij is zeer gemakkelijk te kweeken en wordt voor dat doeleinde in April in groote potten of zinken bakken met aarde gezaaid.

421. **Huberi**, gemengd, p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10
422. „ **variegata** „ „ - 0.20 „ „ - 0.10

Met bonte bladeren.

423. **purpurea**, in gemengde kleuren, p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

LATHYRUS ODORATUS.

Deze welriekende erwten kunnen evenals de doperwten worden gekweekt en half April bij erwtenrijs of langs muren en schuttingen worden gezaaid. Ze hebben gaarne veel zon, doch vereischen verder niet de minste zorg.

Eckfords hybriden, grootbloemige:

424. **Aurora**, wit, oranje gestr. p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
425. **Brillant**, scharlakenrood „ „ - 0.20, „ „ - 0.10
426. **Elize Eckford**, rose . „ „ - 0.15, „ „ - 0.05
427. **Indigo King**, donkerpurp. „ „ - 0.15, „ „ - 0.05

Mont Blanc, zie Nieuwe Invoeringen v/h. vorige jaar.

428. **Prins van Oranje**, oranje met rose, p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
429. **Princess May**, blauw „ „ - 0.20, „ „ - 0.10
430. **Sadie Burpee** NIEUW! zuiverwit p. lood f 0.30, „ „ - 0.15
431. **Stella Morse**, . „ „ - 0.20, „ „ - 0.10
432. **Eckfords hybriden**, in vele kleuren gemengd, p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
433. „ „ 6 pakjes in 6 soorten - 0.30

MAURANDIA.

Deze sierlijke klimplant verlangt buiten een warm plaatsje tegen een muur op het zuiden. Ook wordt zij veel in potten gekweekt aan een hekje of eenige stokjes te samen gebonden. Men moet in Maart in den bak uitzaaien.

434. **Barclayana**, blauw . . . . . p. pakje f 0.20
435 „ **fl. albo** . . . . . „ „ - 0.25

Prachtige variëteit met zuiver witte bloemen.

MINA.

De bloemen dezer schoone klimplant zijn eerst hoog rood, welke kleur bij het ontluiken in oranjegeel en later in geelachtig wit overgaat. Deze moet eveneens onder glas worden gezaaid.

436. **lobata** . . . . p. pakje f 0.20

PASSIFLORA.

Deze algemeen bekende Passiebloem moet worden uitgezaaid in den bak. Ze vereischt niet heel veel zorg wanneer men slechts niet te schrale grond neemt.

437. **lunata**, ... , . p. pakje f 0.40

Wit en zeer rijkbloeiend. De rijpe vruchten gelijken zeer sprekend in kleur en vorm op blauwe pruimen.

THUNBERGIA.

Deze plant wordt bijna uitsluitend als hangplant in potten gekweekt. De heldergekleurde bloemen hebben van binnen een zwarten vlek. Zij wordt in den bak gezaaid.

438. **alata**, in gemengde kleuren . . p. pakje f 0.10
439. **aurantiaca**, goudgeel met zwart oog, „ „ - 0.10
440. **Bakerii**, zuiver wit . . . . . „ „ - 0.10

TROPAEOLUM (klimmende Oost Ind. kers).

De *Oost Ind. kers* wordt einde April buiten gezaaid. Nog beter is het om onder glas te zaaien en in Mei buiten te planten.

441. **majus**, in vele kleuren gemengd,
p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
442. „ **Chamaeleon**, Nieuw,
p. lood f 0.30, p. pakje f 0.10

Deze brengt aan één tak, bloemen van verschillende kleuren voort.

443. **majus, Prins Hendrik**, zeer schoon,
p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
444. **lobbianum**, in vele kleuren gemengd,
p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
„ **hederaefolium** zie Nieuwe Invoeringen van het vorige jaar.
445. „ **Margarete** . . . . p. pakje f 0.40

Van binnen heldergeel, bloedrood gevlekt en gestreept. Het loof is donker met blauwachtige tint.

446. **SIERKALABASSEN**, in diverse soorten .
p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

ZADEN VAN IMMORTELLEN OF STROOBLOEMEN.

Deze worden hoe langer hoe meer gebruikt, daar ze ons een duurzaam genot kunnen verschaffen in een tijd des jaars waarin frissche bloemen zeldzaam zijn. Onderstaande vindt men eene keuze der beste soorten, die gemakkelijk kunnen worden gedroogd en geschikt zijn tot het maken van winterbouquetten. Men snijde de bloemen af op een zonnigen dag, zoodra ze in vollen bloei zijn en hange ze eenige weken onderst boven op een donkere droge plaats. De hier aangebodene soorten kunnen alle begin Mei op den kouden grond worden uitgezaaid en behoorlijk uitgedund. Men geve ze een eenigszins warm en beschut plekje in den tuin en zoo mogelijk zandigen grond. *Ammobium en Gomphrena* geven de voorkeur aan eene uitzaaiing onder glas, daar deze anders eerst laat in bloei komen. Bloeitijd Juli-Sept.

ACROCLINEUM.

Zeer schoone 45 cM. hooge Stroobloemen.

447. **album**, wit . . . p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10
448. „ **fl. pl.**, dubbel wit,
p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10
449. **roseum**, rozerood, p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10
450. „ **fl. pl.**, dubbel rozerood.
p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

AMMOBIUM.

Met hare witte bloemen uitmuntend geschikt tot het maken van winterbouquetten. H. 60 cM.

451. **alatum grandiflorum**, p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

ATHANASIA.

Schoone immortellen, welke evenals de Ammobium zeer geschikt zijn voor winterbouquetten. H. 30 cM.

452. **annua**, ... p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

GOMPHRENA.

Deze vormt gedrongen planten, die geschikt zijn voor potcultuur. Zooals bovenaan deze rubriek is gezegd, moeten ze onder glas worden gezaaid en verspeend. In Juni plant men ze uit.

453. **globosa**, in diverse kleuren. H. 30 cM.
p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

HELICHRYSUM.

Dit zijn de meest bekende van alle strooblоemen. De bloemen moeten afgesneden worden wanneer ze nog niet geheel open zijn en moeten dan als gewoon op eene koele plaats onderstboven worden opgehangen.

454. **brachyrhynchum**, heldergeel. H. 45 cM.
p. lood f 0.50, p. pakje f 0.10
455. **monstrosum**, dubbele Immortellen, gem. H. 45 cM.
p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10
456. „ **nanum plennissimum**, gem. H. 30 cM.
p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10

Laaggroeiend met groote dubbele bloemen.

457. **monstrosum minimum plennissimum**, H. 30 cM.
p. lood f 0.50, p. pakje f 0.10

Laaggroeiend met kleine dubbele bloemen.

HELIPTERUM.

458. **Sanfordi**, H. 30 cM., p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10
Schoone inmortellen met schitterende goudgele bloemen.

RHODANTHE.

Van alle stroobloemen zijn het de *Rhodanthès* en vooral de R. Manglesi, welke den liefhebber de meeste voldoening geven. Zij zijn zeer gemakkelijk te kweeken en zoowel geschikt in bouquetten van levende als van gedroogde bloemen. Hoogte 20 cM.



Rhodanthe maculata.

RHODANTHE (vervolg).

459. **maculata**, rose met donkeren rand, p. lood f 0.50, p. pakje f 0.10
460. „ **alba**, wit, „ „ - 0.60, „ „ - 0.10
461. **Manglesi**, rozerood, „ „ - 0.50, „ „ - 0.10
462. „ **fl.**, **pl.**, met schoone dubbele bloemen, p. pakje f 0.50

WAITZIA.

Dit in Nieuw-Holland inheemsche plantje geve men een beschutte standplaats en liefst een lichten, kiezelachtigen grond.

463. **aurea**, goudgele Immortellen, H. 30 cM., p. lood f 1.25, p. pakje f 0.25

XERANTHEMUM.

Deze kunnen tot de meest bekende Stroobloemen worden gerekend. Men zaait ze in April-Mei, en ze bloeien dan Juli-October.

464. **annuum**, in soorten gemengd, H. 45 cM., p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10
465. „ **imperiale plenissimum**, H. 60 cM., p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10
466. „ **suberbissimum fl. albo**, met witte bloemen, H. 60 cM., p. lood f 0.40, p. pakje f 0.10
467. „ **suberbissimum roseum**, rose, H. 60 cM., p. lood f 0.45, p. pakje f 0.15

ZADEN VAN SIERGRASSEN.

Evenals de *Immortellen*, leveren ook de siergrassen een onschatbaar materiaal voor zoowel groene als gedroogde bouquetten, daar zij zeer lang kunnen bewaard worden en de meeste met hare sierlijke pluimen of aren een zeer schoon effect maken. Ook zijn er sommige hooggroeiende soorten, die zeer geschikt zijn voor gazonplanten, als Gynerium, enz. Men raadplege daarvoor ook de *Afdeeling II. Planten*. De afgesneden bloemaren worden evenals de Immortellen behandeld. De meeste siergrassen kunnen in Augustus worden gezaaid en zullen dan het volgende jaar beter groeien en bloeien dan bij voorjaarszaaiing. Wil men echter in het voorjaar zaaien, zoo moet men dit in Maart—April doen. Sommige, die min of meer teer zijn, zooals Eulalia, Gynerium, Pennisetum, enz. moeten in Maart—April in den bak worden gezaaid. Bloeitijd Juli-October.

AGROSTIS.

Dit is een der fijnste siergrassen, zóó fijn dat, in bouquetten gebruikt, deze er uitzien alsof ze met een doorzichtig waas zijn bedekt.

468. **nebulosa**, *Struisgras*, H. 30 cM., p. pakje f 0.10
469. **pulchella**, zeer schoon, H. 45 „ „ „ - 0.10

AVENA.

Deze soort is zeer gezocht voor bouquetten daar ze met haar losse elegante bloemaren een prachtig effect maken. H. 75 cM.

470. **nuda elegantissima**, p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
471. **sterilis** . . . . „ „ - 0.15, „ „ - 0.05

BRIZA.

Briza of *Trilgras* heeft de eigenaardigheid, dat de bloemaartjes bij de minste bewegingen trillen. Ze zijn daardoor zeer geschikt voor groene en gedroogde bouquetten. H. 30 cM.

BRIZA (vervolg).



Briza maxima.

472. **maxima**, groot Trilgras, p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10
473. **minima**, fijn „ „ „ - 0.20, „ „ - 0.10

BROMUS.

Schoon siergras met afhangende aren. H. 60 cM.

474. **brizaeformis** . . p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

CHRYSURUS.

Zeer lief grasplantje dat lichte bijna goudkleurige bloemenaren vormt. H. 30 cM.

475. **cynosuroides** . . p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

COIX.

De eigenaardige harde ronde vruchtjes geven aan deze plant een aardig effect. Zij hangen aan dunne steeltjes en zijn daardoor steeds in beweging. H. 60 cM.

476. **Lacrimae,** *Jobstranen* p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05
477. **Lacrimae aurea zebrina,** goudgestreept, p. lood f 0.15, p. pakje f 0.05

ERAGROSTIS.

Deze plant vormt prachtige groote bossen en groeit zeer weelderig; moet onder glas worden gezaaid. H. 90 cM.

478. **maxima** . . . . p. pakje f 0.10

EULALIA.

Deze moet in Maart-April in den warmen bak worden gezaaid en des winters in den vorstvrijen bak worden geplaatst. Het volgende jaar kan men ze uitplanten en later des winters dekken met bladriet of andere ruigte. H. 1.80 M.

479. **japonica,** prachtig uit Japan ingevoerd siergras, per pakje f 0.10
480. „ **zebrina,** bonte variëteit der voorgaande, p. pakje f 0.20

Zie ook onder de Afdeeling Planten (Siergrassen).

GYNERIUM.

De behandeling dezer planten is gelijk aan die der Eulalia's. Daar het zaaien nog al eens mislukt, verwijs ik naar Afd. II Planten.

481. **argenteum, Pampasgras,** H. 2½ M., p. p. f 0.10

HORDEUM.

De sierlijke aren, voorzien van zeer lange en fijne haren, zijn bizonder geschikt voor bouquetten. H. 45 cM.

482. **jubatum** . . . . p. pakje f 0.10

LAGURUS.

Zooals de naam dit aanduidt, doen de wollige pluimen veel aan den staart van een langoor denken.

483. **ovatus,** *Hazestaart* . . . . . p. pakje f 0.10

PANICUM.

Met prachtige bloempluimen die een blauwachtig violetten glans bezitten. Onschatbaar voor bouquetten. H. 45 cM.

484. **Capillare** . . . . p. pakje f 0.10

PENNISETUM.

Fraai siergras dat in den warmen bak moet worden uitgezaaid.

485. **longistylum,** H. 45 cM. . . . p. pakje f 0.10
Eenigszins gebogen en sierlijk gevormde witte bloempluimen.

486. **longistylum violaceum,** H. 45 cM., p. pakje f 0.10
De bloempluimen van deze variëteit zijn violet-blauw.

487 **macrurum** . . . . p. pakje f 0.20
Deze variëteit kan, ofschoon het eerste jaar bloeiend, overwinteren wanneer ze goed wordt gedekt.

488. **Ruepellianum,** H. 60 cM. . . . p. pakje f 0.15
Nieuw siergras met fraaie gebogen aren die licht violet gekleurd zijn.

STIPA.

Bekende soort met fijne aren, die van lange haren voorzien zijn.

489. **elegantissima,** H. 60 cM. . . . p. pakje f 0.20
Zeer fijne en elegante grassoort. Prachtig voor bouquetten.

490. **pennata,** *vedergras,* H. 45 cM. . p. pakje f 0.10

ZEA.

491. **gracillima variegata,** *bonte Maïs,* H. 90 cM. p. pakje f 0.10

ZADEN VAN POTPLANTEN.

Deze zaden moeten over 't algemeen met meer zorg worden behandeld dan de zomerbloemen. Vooral bij het zaaien moet men de vereischte regelmatige temperatuur geven, voor gelijkmatige vochtigheid zorgen, oppassen door doelmatige luchtverversching dat zich geen schimmel of zwamziekten vertoonen, enz. Men zaaie vooral niet te dik, drukke daarna den grond voorzichtig met een plankje aan, en dekke de zaden met een weinig zeer fijn gezeefde bladaarde, vermengd met eene even groote hoeveelheid scherpzand. De zeer fijne zaden, als Begonia, Gloxinia, enz. mogen niet, of althans niet noemenswaard met aarde worden bedekt. In 't algemeen bedekke men de zaden met een laagje aarde, dat niet dikker mag zijn dan de dikte van 't zaad.

Hardbarstige zaden als Canna, Musa, Acacia, enz. kunnen met een vijl een weinig worden aangevijld, zorgdragende de kiem niet te beschadigen om een spoedige ontkieming te bevorderen. Ook kan men tot dat doeleinde de zaden een paar dagen weken in een één procents chlooroplossing in water.

De pot of zaaipan waarin gezaaid is wordt met een glasruit bedekt om spoedig uitdrogen te voorkomen. Zoodra de jonge plantjes opkomen verspene men ze en herhale dit nog eenige malen, waardoor ze een sterk wortelgestel zullen krijgen.

ABUTILON.

De Abutilons kunnen des zomers buiten worden geplant. Het zijn ongemeen schoone planten met fraai bonte bladeren en klokvormige bloemen. Ze zijn overblijvend. H. 30 cM.

492. **hybridum,** in de schoonste laaggroeiende rijkbloeiende soorten gem. . . p. pakje f 0.25
493. „ **compactum „Feuerball"** „ „ - 0.35

Laaggroeiende variëteit met prachtige donkerkarmijnroode bloemen.

ACACIA.

Schoone koude-kas-planten, die door sierlijk loof en schoone somtijds zeer welriekende bloemen alle aanbeveling verdienen. Zij bloeien meest in den winter en in 't voorjaar.

494. **lophanta speciosa nana compacta,** H. 45 cM., p. lood f 0.20, p. pakje f 0.10

Met prachtige fijne bladeren, die een allerschoonst effect maken; zeer geschikt voor waranda's en Serres.

495. **Nemu,** H. 45 cM., p. lood f 0.25, p. pakje f 0.10

Een sterke variëteit die bloeit met eene groote menigte van prachtige karmijnroode bloemen.

496. **gemengd** in vele soorten, p. lood f 0.15, p. pakje f 0.10

ACHIMENES.

De Achimenes is een overblijvend wortelgewas met zeer fraai verschillend gekleurde bloemen.

497. **hybrida,** in vele kleuren gemengd, H. 30 cM., p. pakje f 0.25

ARALIA.

De Aralia is wel een der meest bekende kamerplanten en is als zoodanig ook zeer geschikt, daar zij beter als vele andere goed tegen de schadelijke invloeden van rook, gas enz. kan. Wil men echter zeer schoone planten kweeken, zoo moet men ze des zomers op een halfbeschaduwde plaats buiten zetten. *De versche zaden kunnen niet vóór April worden verzonden*

498. **Sieboldi** . . . . p. 35 korrels f 0.10

ASPARAGUS.

Deze bekende sierlijke klimplanten worden gezaaid in de warme kas en daar ze zeer langzaam ontkiemen, moet er wel op gelet worden dat de aarde waarin men gezaaid heeft frisch blijft; ze kunnen zeer goed tegen de kamerlucht en leveren met hun fijn varenachtig groen een prachtig materiaal voor het versieren van tafels enz.

499. **plumosus nanus** . . . . p. 25 korrels f 1.—

Met het prachtigste vederachtige groen.

500. **racemosus** . . . . p. 25 „ - 1.—
501. **Sprengeri** . . . . „ 25 „ - 0.25

BEGONIA.

De *Begonia's* moeten begin Maart in den warmen bak worden gezaaid. Daar de kiemplantjes licht door een schimmelziekte worden aangetast, moet men zorgen voor lichte bladaarde om in te zaaien en goed gedraineerde vlakke zaaipannen. De fijne zaden moeten een weinig worden aangedrukt, doch niet met aarde worden bedekt. Men bedekke de pannen met een glasruit. Zoodra mogelijk verspene men de kleine plantjes, dat zeer voorzichtig moet geschieden, en herhale dit nog een maal of drie. Langzamerhand gewent men ze tevens aan een koelere temperatuur. Op deze wijze zullen deze plantjes hetzelfde jaar nog in Juli in bloei komen. *Voor knollen zie Afd. II.*

BEGONIA (vervolg).

502. **Baumanni,** met welriekende roseroode bloemen, H. 30 cM. . . . . p. pakje f 0.25
503. **fulgens,** nieuw, met langgesteelde schoone karmijnroode bloemen. H. 30 cM. . p. pakje f 0.30

HYBRIDA GIGANTEA, Reuzenbl. Knolbegonia's.

504. **enkelbloemige donkerroode** . . . p. pakje f 0.20
505. „ **oranje** . . . . . „ „ - 0.25
506. „ **rose** . . . . . . „ „ - 0.20
507. „ **gele** . . . . . . „ „ - 0.20
508. „ **witte** . . . . . „ „ - 0.25
509. „ in gemengde kleuren „ „ - 0.15
510. **gestreeptbloemige** in gem. „ „ „ - 0.30
511. **dubb.** grootbloemige in „ „ „ „ - 0.25
512. **erecta cristata,** NIEUW! H. 30 cM. „ „ - 0.25

Zeer interessant en schoon. De bloembladen zijn van binnen met eenigszins kamvormige uitwassen bezet.

513. **hybrida marmorata,** NIEUW! H. 30 cM. p. pakje f 0.50
514. **Rex, Bladbegonia's** in de schoonste soorten gemengd. H. 30 cM. . . per 250 korrels f 0.60
515. **semperflorens,** gemengd. H. 30 cM. p. pakje f 0.15
516. „ **atropurpurea.** H. 45 cM. p. pakje f 0.20

Prachtige met helderoranje getinte karmijnroode bloemen en donkerbronsgekleurde bladeren.

517. **semperflorens compacta alba.** H. 15 cM. p. pakje f 0.25

Laaggroeiend; prachtig voor randen. Heldere witte bloemen.

518. **Schmidti,** dankbare winterbloeier. H. 45 cM. p. pakje f 0.35

CALCEOLARIA.

De *Calceolaria's* behooren tot de schoonste potplanten. De bloemen komen voor in de meest verschillende en grilligste kleuren. Men zaaie van af Juni tot Augustus op dezelfde wijze als de knolbegonia's en overwintere de plantjes in den kouden vorstvrijen bak. In 't voorjaar kan men ze een weinig warmte geven om ze in Maart reeds in bloei te hebben. Men bescherme de planten voor sterke zonnestralen en houde ze goed vochtig.

519. **hybrida,** getijgerde, eenkleurige en gevl. grootbl. prachtsoorten gem. H. 30 cM. p. pakje f 0.35
520. „ **nana,** in de schoonste dwergachtige soorten gemengd. H. 15 cM. . p. pakje f 0.40
521. **rugosa.** H. 30 cM. . . . . . . „ „ - 0.40

Struikachtige soort met kleinere bloemen, zeer rijkbloeiend en geschikt voor perken.

522. **rugosa nana,** laaggroeiend. H. 20 cM. p. pakje f 0.25

CANNA.

Men zaaie de *Canna's* in den warmen bak; voor de behandeling der zaden leze men onder het hoofd der rubriek „Potplanten." Men zaaie in Februari-April en houde de plantjes tot einde Mei onder glas. Bloeit. Juli-Oct.

523. **Indica,** bruinbladerige soorten gemengd. H. 150 cM. p. pakje f 0.10
524. „ **Crozy's,** grootbloemige prachtsoorten gem. H. 90 cM. . . . . p. pakje f 0.15

CELOSIA.

De *Hanekammen* worden half Maart in den warmen bak gezaaid, een paar malen onder glas verspeend en langzamerhand afgehard, waarna men ze in Mei op de perken zet. Men kan ze ook in potten kweeken en als ze bloeien in de kamer. Bloeitijd Juni-Aug.

525. **cristata nana,** *lage Hanekammen,* in schoone soorten gemengd, H. 15 cM. . . . . p. pakje f 0.15
526. **plumosa,** vederachtige Hanekam, in kleuren gem. H. 45 cM. . . . . p. pakje f 0.10
527. **plumosa Thompsoni.** H. 45 cM. „ „ - 0.10

Met helder karmijnroode bloemen en purperrood loof.

CENTAUREA.

Deze zilverwitte bladplant is onmisbaar voor mozaiekperken. Men zaait haar hetzij in Juli-Aug. of wel in Febr.-Maart onder glas; de plantjes worden in potjes verspeend en in Mei uitgeplant. In het eerste geval moeten ze natuurlijk in den bak worden overwinterd.



Centaurea candidissima.

528. **candidissima** . . . . p. pakje f 0.25

CHRYSANTHEMUM.

De *Chrysanthen* kan men tegenwoordig tot de modebloemen rekenen en daar zij niet alleen bloeien in een jaargetijde dat de bloemen schaars zijn, maar ook zulke prachtige bloemen in de meest verschillende kleuren en vormen opleveren verdienen zij deze aandacht ook ten volle. Ze worden begin Maart in den warmen bak uitgezaaid, op tijd verspeend, in potten geplant en in den zomer op een beschut plekje buiten gezet met de potten in den grond. Om schoone goedgevulde planten te krijgen, moet men ze op tijd innijpen en aan elken stengel behoude men slechts een bloemknop, terwijl men de zijknoppen zorgvuldig verwijdert. In den herfst plaatse men ze in den kouden bak of in de kamer, waar de bloemen spoedig zullen ontluiken.

529. **frutescens,** *witte Marguerite.* Bloeitijd April-Nov. H. 30 cM. . . . . p. pakje f 0.10
530. **indicum, fl. pl.,** Bloeitijd Oct.-Dec. H. 90 cM. p. pakje f 0.20

Grootbl. dubbele *Chrysanthemums* in prachtsoorten gem.

531. **japonicum fl. pl.,** Bloeitijd Oct.-Dec. H. 90 cM. p. pakje f 0.20

Prachtige *Japansche Chrysanthemum* in soorten gem.

CINERARIA.

Deze worden in Juni gezaaid in den warmen bak, eenige malen verspeend en in den kouden bak vorstvrij overwinterd. Ze moeten voor scherpe zonnestralen worden beschermd en tamelijk vochtig worden gehouden. Bloeitijd Febr.-Mei.



Cineraria hybrida.

532. **hybrida grandiflora,** grootbloemige prachtsoorten gemengd. H. 30 cM., p. pakje f 0.30
533. „ **grandiflora nana,** grootbloemige dwergsoorten gem. H. 20 cM., p. pakje f 0.35

„ **grandiflora Stella,** zie Nieuwe Invoeringen van het vorige jaar.

534. „ **plenissima,** dubbelbloemige prachtsoorten gemengd. H. 20 cM., p. pakje f 0.80
535. **maritima** . . . . H. 20 cM., p. pakje f 0.10

Met zilverwit blad, prachtige variëteit.

536. **maritima candidissima.** H. 20 cM., p. pakje f 0.10
537. „ **Diamant,** NIEUW! H. 20 cM., p. pakje f 0.30

Zuiverwitte, wollige bladeren, een van de schoonste soorten.

CLIANTHUS

De prachtige groote bloemen zitten in trossen van 4 à 6 bij elkaar en hebben eene helderscharlakenroode kleur met een groote zwarte vlek. Men zaaie ze Februari-Maart in den warmen bak, verspene de jonge plantjes zoodra ze opkomen in goed gedraineerde potten. Bij het gieten moet men vooral oppassen de bladeren niet te begieten. De planten hebben behoefte aan veel licht, lucht en warmte en zijn bang voor veel vochtigheid. Bloeitijd Mei-Juni.


538. **Dampieri** . . . . p. pakje f 0.25

COLEUS.

539. **nieuwe grootbladerige dwerg,** p. pakje f 0.20

Deze geheel nieuwe Coleus heeft het groote voordeel, dat de planten niet hooger dan 15—20 cM. groeien. Vooral voor mozaiekvakken is deze dus zeer aan te bevelen, daar het lastige terugsnijden der planten geheel vervalt en men alleen de kleine bloemstengels behoeft te verwijderen. De bladeren zijn bijna even groot als die der hooggroeiende en meest zwartrood, roodgemarmerd en gevlekt. (Komt echt op uit zaad.)

COLEUS (vervolg).



Coleus, grootbladerige dwerg.

540. **hybridus,** prachtige soorten gemengd. H. 60 cM., p. pakje f 0.25

541. **hybridus macrophyllus,** grootbladerige variëteit in de beste kleuren gemengd. H. 60 cM., p. pakje f 0.35

Deze Coleussoorten bezitten prachtig gekleurd loof en maken daardoor een zeldzaam mooi effect; ze zijn zeer gemakkelijk uit zaad te kweeken.

CYCLAMEN.

De *Cyclamen* worden zoo vroegtijdig mogelijk in den warmen bak gezaaid, verspeend en na eenigen tijd de jonge plantjes in potten gezet. In den kouden bak groeien ze het best; men zette ze zoo dicht mogelijk bij het glas, want de planten hebben veel behoefte aan licht en lucht. Bloeit December-April.



Cyclamen „Papilio."

CYCLAMEN (vervolg).

542. **Cyclamen „Papilio,"** p. pakje (10 korrels) f 1.—

Deze nieuwigheid is overal met de hoogste onderscheidingen bekroond. Zij heeft behalve de beste eigenschappen der schoonste Cyclamen-variëteiten, deze eigenaardigheid, dat de bloembladeren aan de buitenranden sierlijk gekruld en getakt zijn, zoodat de geheele plant een bijzonder aanzien verkrijgt. De schitterende kleuren en de elegante vorm der bloemen maken deze nieuwigheid onmisbaar voor bouquetten. Hoogte 30 cM.

543. **persicum giganteum,** reuzenbloemige prachtsoorten gemengd, H. 15 cM., . . p. 25 korrels f 0.20

544. **persicum giganteum sanguineum,** H. 30 cM. p. 25 korrels f 0.60

De kleur is van het schitterendste donkerrood, zeer schoon.

DRACAENA.

Bekende Bladplant. H. 60 cM.

545. **indivisa** . . . . p. pakje f 0.15

EPACRIS.

Deze plantjes geven eene groote menigte van kleurige bloemen en maken een zeer schoon effect. Ze moeten onder glas gezaaid worden in potten en bloeien reeds vroeg in het voorjaar. H. 30 cM.

546. **hybrida,** in vele soorten gemengd p. pakje f 0.25

ERICA.

Dit bekende Heideplantje moet in de warme kas of bak gezaaid worden in heidegrond en met zeer groote oplettendheid en zorg verspeend worden daar ze zeer teer zijn. H. 30 cM.

547. **Kaapsche,** in soorten gemengd . p. pakje f 0.25

ERYTHRINA.

548. **Christa-galli,** *Koraalboom,* bloeitijd Aug.-Sept. H. 90 cM. . . . . p. pakje f 0.20

EUCALYPTUS.

Snelgroeiende plant die in eenige jaren een aanzienlijke hoogte kan bereiken.

549. **globulus,** *Koortsbloem* . . . . p. pakje f 0.20

FRAGARIA.

Lief hangplantje met gele bloemen en roode vruchten. Wordt in de koude kas gezaaid en gekweekt. Bl. Juli-Oct.

550. **Indica** . . . . p. pakje f 0.15

FUCHSIA.

Deze algemeen bekende plant wordt gewoonlijk uit stek gekweekt, maar met eenigen zorg kan men haar ook zaaien. Wil men de planten hetzelfde jaar nog in bloei hebben, zoo dient zoo vroegtijdig mogelijk te worden gezaaid onder glas in ondiepe pannen met lichten grond. De plantjes worden in potjes verspeend; later geve men ze langzamerhand grootere potten. Vóór dat de planten voor den winter worden opgeborgen, moeten ze flink worden ingesnoeid. Men kan ze ook buiten in den vollen grond uitplanten en ze 's winters met eikenblad en riet bedekken. De planten sterven dan meestijds boven den grond af, maar loopen in 't voorjaar weer uit. Ze bloeien dan later in den zomer. Bloeitijd Juni-Oct. H. 60 cM.

FUCHSIA (vervolg).

551. **hybrida,** enkele prachtsoorten gem. p. pakje f 0.50
552. „ dubbele „ „ „ „ - 0.50
553. **boliviana,** scharlakenroode bloemen. Zeer rijkbloeiend . . . . p. pakje f 0.30
554. **procumbens** . . . . „ „ - 0.20

Eene prachtige hangplant met karmijnroode bessen.

GESNERIA.

Deze plantjes hebben prachtig fluweelachtig loof en gespikkelde bloemen. Ze zijn verwant aan de Gloxinia's en worden ook evenals deze gekweekt. H. 15 cM.

555. **macrantha** . . . . p. pakje f 0.30

GLOXINIA.

Men zaaie de Gloxinia's begin Februari evenals de Begonia's, enz. verspene op tijd en houde ze in een matig warmen bak of serre. Voor sterken zonneschijn moet men ze beschutten. Bloeitijd Juni-Aug. H. 30 cM.

556. **hybrida erecta,** met rechtopstaande bloemen in prachtsoorten gemengd . p. pakje f 0.50
657. „ **grandiflora coelestina,** hemelsblauw met zuiver wit hart, p. pakje f 0.70
558. „ „ **corona** . . . „ „ - 0.60

Donker violetrood dat naar de kanten in indigo overgaat van buiten wit met blauwe spikkels.

559. **hybrida grandiflora gigantea Cyclope.** NIEUW! Helder karmijnr., p. pakje f 0.50
560. „ „ **robusta Purpurkönig,** purperrood . . . p. pakje f 0.55
561. „ „ **Schneekönigin.** NIEUW! zuiverwit . p. pakje f 0.75

HELIOTROPIUM.

De *Heliotropen* zijn overbekend wegens de heerlijk riekende bloemen. De kweekwijze is zeer eenvoudig; men zaaie in Maart in den warmen bak; bloeit Juli-Sept.

562. **Boule de neige,** zuiverwit . . . p. pakje f 0.25



Heliotropium Hybridum grandifl. „Mammuth.'

562*a*. **hybridum grandifl. „Mammuth,"** p. pakje f 0.35

Deze nieuwe Heliotroop is ontstaan uit eene kruising der voor eenige jaren ingevoerde Reuzen-Heliotroop en Mad. de Bussy. Ze wordt niet zoo hoog als de eerste, maar breeder en meer gedrongen, terwijl de reusachtige bloembundels een middellijn hebben van 40—50 cM. De kleur is licht- en donkerviolet, de reuk veel sterker dan van de Reuzen-Heliotroop.

HELIOTROPIUM (vervolg).

563. **Perle Bleu,** helderblauw . . . p. pakje f 0.20

Deze zijn alle kruipend.

664. **gemengd,** in prachtsoorten met donkere bloemen H. 20 cM. . . . . p. pakje f 0.20
565. **Nieuwe grootbl. reuzen,** H. 20 cM., p. pakje f 0.25

HIBISCUS.

De Hibiscus moet in de kas gezaaid en verspeend worden en is zeer gemakkelijk te kweeken. H. 90 cM.

566. **roseus grandiflorus,** roserood met groote bloemen p. pakje f 0.20

IMPATIENS SULTANI.

Deze schoone plant met heldergekleurde bloemen wordt in Maart in den warmen bak gezaaid, verspeend, en later in den kouden bak overgebracht of in de kamer geplaatst. H. 30 cM.

567. **hybrida,** in vele kleuren gemengd p. pakje f 0.35

LAVATERA.

Deze plant heeft sierlijk gevlekte bladeren, en wordt veel gebruikt voor groote perken met Canna's, enz. Zij wordt in begin Maart in den bak gezaaid, verspeend en einde Mei op de perken geplant.

568. **arborea, fol. var.** . . . . p. pakje f 0.10

LOTUS.

Een zeer schoone hangplant die in de kas moet gekweekt worden. Ze heeft donkergroen fijn loof en oranjekleurige bloemen, die eenigszins gelijken op die van de Clianthus.

569. **peliorhynchus** . . . . p. pakje f 0.20

MIMOSA.

Van dit eigenaardige plantje is algemeen bekend, dat de bladeren zich sluiten en slap neerhangen bij de minste aanraking. Het kan ook niet tegen tocht. In April in den warmen bak gezaaid, moet men de plantjes zoo spoedig mogelijk in potjes verspenen, later zette men ze in de kamer of in den kouden bak of serre. H. 30 cM.

570. **pudica,** *Kruidje-roer-mij-niet* . . p. pakje f 0.15

MUSA.

Deze schoone bladplant wordt veel evenals de Oranjeboomen enz. in kuipen geplant en buiten langs de paden gezet. Ze moeten in den kouden kas of oranjerie of ook wel in kamer of vestibule worden overwinterd. Men zaaie in Februari, verspene de plantjes eerst in potten en later in grootere potten of kuipen.

571. **Ensete** . . . . p. pakje f 0.25
572. **Martini** . . . . „ „ - 0.35

Met zeer groote bladen van een blauwachtig groene kleur.

NAEGELIA.

Deze schoone plantjes met hun kleurrijke bloempjes worden gezaaid en verder behandeld op de wijze van de Gloxinia's. Zij zijn zeer schoon en leveren in het nazomer veel bloemen.

573. **hybrida,** in de nieuwste en beste soorten gemengd, p. pakje f 0.15

NERTERA.

Dit aardige plantje, dat hoofdzakelijk gekweekt wordt om de fraaie koraalroode vruchtjes, waarmee het als het ware bedekt is, wordt in Maart in den warmen bak gezaaid. Men kan het ook met succes in de kamer kweeken. Bloeitijd Juli-Oct.

574. **depressa,** kruipend . . . . . p. pakje f 0.25

OXALIS.

Dit plantje gelijkt veel op de Mimosa pudica of Kruidje-roer-mij-niet, ten minste het is bijna even gevoelig voor elke aanraking. Men moet in de kas en bij voorkeur onder glas zaaien.

575. **prolifera,** schoone hangplant . . p. pakje f 0.30

576. **sensitiva** . . . . „ „ - 0.15

PELARGONIUM.

De *Pelargoniums* ook ten onrechte *Geraniums* genoemd, worden in Februari in den warmen bak gezaaid en zoodra mogelijk verspeend, hetgeen later nog weer wordt herhaald. Men plant ze nu in potten, en zoodra ze daarin aangeslagen zijn kan men ze buiten met de potten uitplanten. Ze zullen dan denzelfden zomer nog bloeien. De planten moeten in den kouden bak, serre of kamer worden overwinterd. Men moet ze zooveel mogelijk lucht geven. Bloeitijd Mei-Nov.

577. **hederaefolium,** (pelatum) enkelbloemige kruipend, p. pakje f 0.75

578. „ **fl. pl.** dubbelbloemig kruipend p. pakje f 1.50

Bovenstaande beide soorten zijn ook bekend als klimop-bladerige *Hang-Pelargoniums,* (Geraniums) en zijn als hang-planten zeer aan te bevelen.

PELARGONIUM (vervolg).

579. **hybridum Odier,** in grootbloemige prachtsoorten gem. H. 45 cM. . . . . p. pakje f 0.40

580. „ **grandiflorum nanum,** H. 30 cM. p. pakje f 1.10

Laaggroeiende variëteit met schoone zeer groote bloemen.


581 **zonale,** in de nieuwste prachtsoorten gemengd, H. 45 cM. . . . . . p. pakje f 0.20

582. „ **fl. pl.,** dubbele prachtsoorten gemengd. H. 45 cM. . . . . . p. pakje f 0.45

PRIMULA CHINENSIS.

De chineesche Primula's worden in Juni-Juli uitgezaaid in zaaipannen of goed gedraineerde potten gevuld met een mengsel van oude bladaarde en tuingrond met verteerde koemest en in den kouden bak geplaatst. Zoodra de plantjes eenige blaadjes hebben, zet men ze in potjes en later in grootere potten, die men zoodra het herfst wordt in een half warme serre zoo dicht mogelijk bij 't glas plaatst. Bij 't begieten moet men oppassen de bladeren niet nat te maken. H. 20 cM. Bloeitijd Dec.-April.

		p. pakje
583.	**fimbriata alba,** wit	f 0.25
584.	„ „ **magnifica,** wit extra . .	- 0.35
585.	„ **coccinea,** helderrood	- 0.30
586.	„ **coerulea,** blauw	- 0.90
587.	„ **cupreata grandiflora,** koperkleurig	- 0.50
588.	„ **gemengd,** in enkelbloemige prachtsoorten	- 0.30
589.	**macrophylla (filicifolia) alba,** wit	- 0.35
590.	„ **alba rosea,** licht rose . . .	- 0.35
591.	„ **atro-purpurea,** donkerr. . .	- 0.35
592.	**fimbriata alba pl.,** dubbel wit	- 0.90
593.	„ **rubra fl. pl.,** dubbel rood . .	- 1.10
594.	„ **fl. pl. gemengd,** in dubbelbloemige prachtsoorten	- 0.90



Primula obconica grandiflora alba.

PRIMULA OBCONICA.

Geheel nieuw ras met prachtige groote bloemen, door een Duitschen kweeker in den handel gebracht. Deze *Primula's* kunnen op dezelfde wijze worden behandeld als de vorige. H. 30 cM.

595. **grandiflora,** Ronsdorfer hybriden gem. p. pakje f 0.50

596. „ **alba** . „ „ - 0.50

De schoone, groote bloemen dezer variëteit staan in prachtige trossen bijeen en zijn helder wit met een geel hart, terwijl slechts zeer zelden een lila tint over de bloem is uitgespreid. Ze is zeer aan te bevelen voor snijbloemen en voor het kweeken in potten.

PRIMULA OBCONICA

(Vervolg).

597. **grandiflora fimbriata violacea,** p. pakje f 0.50.

De bloem, die deze soort oplevert, heeft eene prachtige violetkleur, ze is schoon gevormd en groot, terwijl eene schaduw van lila tot violet, die er over ligt uitgespreid, hare schoonheid nog verhoogt.



Primula obconica grandifl. fimbriata.

SAINTPAULIA.

Prachtige rijkbloeiende *Gesneriacee* met helderblauwe bloemen. Deze wordt op dezelfde wijze behandeld als de *Gloxinia's*. Bloeitijd Juli—Oct. H. 15 cM.

598. **ionantha** . . . . p. pakje f 0.40

SALVIA.

Prachtige plant met scharlakenroode bloemen, die in Maart—April in den bak wordt gezaaid en in potten gekweekt. Men kan dezelve in Mei ook buiten zetten en zoodra er vorst te vreezen is, in potten plaatsen in kamer of serre; ze zullen dan nog zeer lang doorbloeien. Bloeitijd Juni-Nov. H. 60 cM.

599. **splendens Ingenieur Clavenad,** vroeg en rijkbloeiend, p. pakje f 0.20

SOLANUM.

Deze planten worden hoofdzakelijk om de op eieren gelijkende vruchten meer uit curiositeit gekweekt.
Bloeitijd Juni—Nov. H. 30 cM.

600. **Capsicastrum nanum,** met prachtige scharlakenroode vruchten . . . . p. pakje f 0.10
601. **Melongena,** Eierplant met witte vruchten, p. p. f 0.10
602. „ „ „ roode „ „ „ - 0.15
603. „ „ „ zwarte „ „ „ - 0.15

STREPTOCARPUS.

De groote fraaie bladeren dezer plant liggen meestal vlak op den grond. De bloemstengels, die meestal 8 à 12 bloemen dragen, komen dus flink boven de bladeren uit. De bloemen zijn zeer schoon en gelijken eenigszins op die van Gloxinia's; zij komen in de meest verschillende kleurnuances voor. Zij worden op dezelfde wijze gekweekt als de Gloxinia's. Bloeitijd Juni-Nov. H. 20 cM.

604. **hybridus,** nieuwe hybriden . . . p. pakje f 0.40


TECOMA.

Dit rijkbloeiende schoone plantje brengt oranjegele bloemen voort van een langwerpige trompetachtige vorm. Men moet in het voorjaar onder glas zaaien en voorzichtig verspenen. Zeer geschikt voor kamerplant. H. 30 cM.

605. **Schmidti** . . . . p. pakje f 0.25

TORENIA.

De *Torenia's* laten zich zeer gemakkelijk kweeken. Zij vormen prachtige potplanten, maar men kan ze, mits vroeg in den bak uitgezaaid en einde Mei uitgeplant, ook op een warm plekje in den tuin kweeken. Bloeitijd Juli—Sept.



Torenia Fournieri.

606. **Fournieri compacta,** laag, H. 30 cM., p. p. f 0.30
607. „ „ **speciosa,** nieuw, zeer grootbloemig, H. 45 cM. . p. pakje f 0.35
608. „ **White wings,** wit, H. 45 cM. p. „ - 0.25

TYDAEA.

Dit schoone knolgewas behoort tot de familie der Gesneriaceeën en wordt evenals de Gloxinia's enz. gekweekt.
Bloeitijd Juli—Oct. H. 30 cM.

609. **hybrida nana**, lage in gemengde kleuren, p. pakje f 0.45

VINCA.

De schoone rose bloemen hebben een purperrood oog. Men zaait begin Maart—April in den bak, verspeent ze in potten onder glas. Om mooie gedrongen planten te krijgen, moet men ze een paar malen pinceeren of innijpen.
Bloeitijd Juli—Oct. H. 30 cM.

610. **rosea** . . . . p. pakje f 0.15

ZADEN VAN TWEE-JARIGE EN OVERBLIJVENDE PLANTEN.

Zooals bekend is heb ik in dezen catalogus onder Afdeeling II eene zeer uitgebreide collectie overblijvende of vaste planten opgenomen. Van deze zijn er velen die wel uit zaad *kunnen* worden gekweekt maar eene groote menigte, die slechts met de uiterste zorg en moeite, waarbij tevens eenige vakkennis een vereischte is, eenig resultaat opleveren. Vele soorten zijn er ook waarvan het zaad zeer langzaam ontkiemt, ja zelfs eerst het tweede jaar opkomt.

Juist om dus teleurstellingen te voorkomen heb ik in de onderstaande rubriek alleen die zaden opgenomen, die niet al te moeilijk te kweeken zijn en die dus kans van slagen hebben. Waar ik geen nadere beschrijvingen heb gegeven kan men die vinden onder de genoemde afdeeling II vaste planten. De meeste worden in Mei of Juni gezaaid en bloeien dan de volgende zomer. Sommigen bloeien nog het eerste jaar indien ze vroeg en onder glas worden gezaaid.

ADONOPHORA.

611. **Potanini**, Nieuw . . . . . . p. pakje f 0.15

ALTHAEA.

De *stokrozen* leenen zich uitmuntend tot het aanplanten langs groote heesterperken. In Engeland ziet men ze zeer veel; in ons land worden ze echter lang niet genoeg gewaardeerd. Men zaait ze half Juni en plant ze uit einde September.

612. **rosea fl. pl.**, ... p. pakje f 0.25

Dubbele Charters prachtsoorten in kleuren gemengd.

613. **donkerkarmijnrood** . . . . . p. pakje f 0.30
614. **geelachtig wit op purperen grond** „ „ - 0.30
615. **licht abrikoos-kleurig** . . . . „ „ - 0.30
616. **rose** . . . . „ „ - 0.30
617. **zuiver wit** . . . . „ „ - 0.30
618. **zwavelgeel** . . . . „ „ - 0.30

ALYSSUM.

Ongeveer 15 cM. hoog groeiend plantje dat zeer vroeg in het voorjaar bloeit. De bloemtrossen zijn heldergeel. Zeer geschikt voor randen en mozaiekvakken. Het wordt in den zomer gezaaid om in den Herfst of het voorjaar te worden uitgeplant.

619. **saxatile compactum**, p. lood f 0.35, p. pakje f 0.10

ANTHEMIS.

620. **Kelwayi** . . . . p. pakje f 0.10

AQUILEGIA.

621. **chrysantha** . . . . p. pakje f 0.10
622. **coerulea grandiflora** . . . . . „ „ - 0.15
623. „ „ **rosea** . . . . „ „ - 0.15
Helenae, zie Nieuwe Invoeringen.
624. **hybrida**, in soorten gemengd . . „ „ - 0.15
625. **nivea grandiflora** . . . . . . „ „ - 0.05
626. **Skinneri** . . . . „ „ - 0.15
627. **Stuarti** . . . . „ „ - 0.25

Laatstgenoemde is de schoonste van alle *Aguilegia's*. De kolossale helderblauwe bloemen hebben een wit hart.

ASTERS.

628. **vollegrondssoorten**, in diverse kleuren gemengd, p. pakje f 0.20

ASTILBE.

629. **rivularis** . . . . p. pakje f 0.10
630. **Thunbergi major** . . . . „ „ - 0.15

BAPTISIA.

131. **australis** . . . . p. pakje f 0.10

BELLIS.

632. **perennis fl. pl.** . . . . p. pakje f 0.15
633. „ „ „ **Sneeuwbal** . . „ „ - 0.25
„ **delicata fl. pl.** Zie Nieuwe invoeringen.

CAMPANULA.

		p. pakje
635.	**Medium**, in kleuren gemengd, enkele . .	f 0.05
636.	„ **fl. pl.** dubb. „	- 0.10

Deze *Campanula's* worden in Engeland veel gekweekt en daar *Canterbury Bells* genoemd. Ze worden in Juni gezaaid, gedund en voor den winter met eenige ruigte bedekt. In 't voorjaar plant men ze op de perken.

		p. pakje
637.	**lactiflora**	f 0.15
638.	**latiloba**	- 0.10
639.	„ **alba**	- 0.15
640.	**persicifolia grandiflora alba (Backhousii)**	- 0.15
641.	„ „ **coerulea**	- 0.15
642.	**(Platycodon)** „	- 0.10
643.	„ „ **alba**	- 0.10
644.	„ „ **Mariesi**	- 0.15
645.	**pyramidalis**	- 0.10

Ongeveer 1.50 M. à 2 M. hoog groeiende variëteit met dichte hartvormige bladeren. De schoongevormde klokvormige bloemen zijn van een bleekblauwe kleur. Men zaait in het voorjaar en overwinterd ze in potten in koude kas of bak.

646. **pyramidalis alba**, witte variëteit p. pakje f 0.15

CENTAUREA.

647. **macrocephala** . . . . p. pakje f 0.10
647*a*. **ruthenica** . . . . „ „ - 0.20

CHAMAEPEUCE.

Het eerste jaar wordt deze plant gewoonlijk als bladplant gebruikt, terwijl ze het tweede jaar een eigenaardige bloemstengel voortbrengt met purperen bloemen. Men zaait vroeg in het voorjaar.

648. **diacantha,** *Ivoordistel* . . . . p. pakje f 0.10

CHRYSANTHEMUM.

649. **maximum** . . . . p. pakje f 0.10
649*a*. „ **„Triumph"** . . . . „ „ - 0.20
„ **praecox,** zie Nieuwe Invoeringen.

COREOPSIS.

650. **grandiflora** . . . . p. pakje f 0.10

DELPHINIUM.

651. **chinense** . . . . p. pakje f 0.10
652. „ **album** . . . . . . „ „ - 0.15
653. **formosum** . . . . „ „ - 0.20
654. **hybridum,** *Riddersporen* enkele grootbl. prachtsoorten gemengd . p. pakje f 0.10
655. „ „ dubbele, in schoone kleuren gemengd . p. pakje f 0.20
656. **speciosum glabratum** . . . . „ „ - 0.20
657. **sulphureum,** geel . . . . . . „ „ - 0.15

DIANTHUS.

658. **barbatus,** *Duizendschoonen,* enkele, in de schoonste kleuren gemengd . . p. pakje f 0.05
659. „ **fl. pl.,** *Duizendschoonen,* extra dubbele grootbloemige, in de schoonste soorten gem., p. pakje f 0.10
660. **Caryophyllus fl. pl.,** *Dubbele Anjelier,* in extra schoone soorten gem., zaden van onder glas gekweekte prachtplanten, p. 25 korrels f 0.35
661. „ „ gewone dubbele, in vele kleuren gemengd . . p. pakje f 0.20
662. „ „ *Remontant- of doorbl. Anjelier,* p. 25 korrels f 0.25
663. **plumarius** „ *dubb. Grasanjelier,* in schoone kleuren gem. p. pakje f 0.15

DIGITALIS.

664. **gloxiniaeflora,** gemengd . . . p. pakje f 0.10

ECHINACIA.

665. **purpurea,** zie Rudbeckia purpurea.

ECHINOPS.

666. **banaticus** . . . . p. pakje f 0.10
667. **ruthenicus** . . . . „ „ - 0.10
668. **sphaerocephalus giganteus** . . „ „ - 0.15

ERIGERON.

669. **aurantiacus** . . . . p. pakje f 0.20
„ **hybridus,** zie Nieuwe Invoeringen van het vorige jaar.
grandiflora elatior, zie Nieuwe Invoeringen.

ERODIUM.

670. **manescavi** . . . . p. pakje f 0.15

ERYNGIUM.

671. **alpinum** . . . . p. pakje f 0.15

GAILLARDIA.

672. **hybrida maxima** . . . . . . p. pakje f 0.15
673. **grandiflora compacta** . . . . „ „ - 0.15

Dit is een gedrongen groeiende vorm van de bekende overblijvende Gaillardia's. De planten vormen ronde bosjes, die niet hooger worden dan 30 à 40 cM. In rijkdom van kleurenverscheidenheid behoeft zij voor de hooggroeiende niet onder te doen, maar zij overtreft deze in rijkbloeiendheid, want de planten bloeien onafgebroken van Juni tot laat in den herfst.

grand. fol. aureo. var., zie Nieuwe Invoeringen van het vorige jaar.

GENTIANA.

674. **asclepiadea** . . . . p. pakje f 0.10

GEUM.

675. **atrosanguinium fl. pl.** . . . . p. pakje f 0.15
676. **Heldreichi** . . . . „ „ - 0.15
677. „ **splendens** . . . . „ „ - 0.20

GILLENIA.

678. **trifoliata** . . . . p. pakje f 0.20

GNAPHALIUM.

679. **Leontopodium,** *Edelweiss* . . . p. pakje f 0.25

GYPSOPHILA.

680. **paniculata** . . . . p. pakje f 0.10

HARPALIUM.

681. **rigidum** (*Helianthus rigidus.*) . p. pakje f 0.10
682. **praecox** . . . . „ „ - 0.15

HELENIUM.

683. **Bigelowi** . . . . p. pakje f 0.15
684. **Bolanderi** . . . . „ „ - 0.10

HEUCHERA.

685. **alba** . . . . p. pakje f 0.10
686. **brizoides** . . . . „ „ - 0.15
687. **sanguinea splendens** . . . . . „ „ - 0.20

INCARVILLEA.

688. **Delavayi** . . . . p. pakje f 0.15
689. **variabilis** . . . . „ „ - 0.10

INULA.

690. **bubonium** . . . . p. pakje f 0.20
691. **glandulosa grandiflora** . . . . „ „ - 0.15

LATHYRUS.

692. **latifolia alba** . . . . p. pakje f 0.15

LINARIA.

Een lief kruipend plantje dat gaarne groeit in spleten van oude muren enz. en dat zeer gemakkelijk te kweeken is. De bloempjes zijn helder lila.

693. **Cymbalaria** . . . . p. pakje f 0.15

LINUM.

694. **flavum** . . . . p. pakje f 0.10
695. **perenne** . . . . „ „ - 0.05
696. „ **album** . . . . „ „ - 0.10

LOBELIA.

697. **cardinalis Queen Victoria,** met donkerrood blad p. pakje f 0.10

LUPINUS.

698. **polyphyllus,** in kleuren gemengd p. pakje f 0.10
699. „ **albus** . . . . . „ „ - 0.10

LUNARIA.

700. **biennis, Judaspenning** . . . . p. pakje f 0.10

LYCHNIS.

701. **Chalcedonica** . . . . p. pakje f 0.10

MALVA.

702. **alcea** . . . . p. pakje f 0.10
703. **moschata alba** . . . . „ „ - 0.15

MYOSOTIS.

De *Vergeet-mij-niet* kan tot de schoonste der vroegbloeiende voorjaarsplanten worden gerekend en is bij uitstek geschikt voor perken die later met Canna's, Dahlia's, Begonia's enz. worden beplant, daar deze toch eerst laat op de perken komen. Men zaait half Juli en zet de plantjes in het najaar op de perken, waarop ze voor strenge vorst met eenige dennentakken of andere ruigte moeten worden bedekt. De plantjes ontwikkelen zich het best, daar waar de grond niet al te droog is. De variëteiten van „Victoria" vormen zeer lage gedrongen plantjes.

708. **alpestris,** *Vergeet-mij-niet,* blauw, p. lood f 0.65, p. pakje f 0.10
709. **alpestris, alba,** wit „ „ - 0.35, „ „ - 0.10
710. „ **rosea,** rose „ „ - 0.50, „ „ - 0.15
711. „ **Victoria,** blauw, grootbl. „ „ - 0.15
712. „ „ **alba,** wit „ „ „ - 0.20
713. „ „ **rosea,** rose „ „ „ - 0.25

ONOPORDON.

714. **bracteatum (Reuzendistel),** *Nieuw,* p. pakje f 0.20

Voor beschrijving zie Nieuwigheden.

OROBUS

715. **vernus** . . . . p. pakje f 0.10

PAPAVER.

716. **alpinum** . . . . p. pakje f 0.10
717. **nudicaule,** oranje, geel en wit gem., „ „ - 0.10

Buitengewoon dankbaar bloeiende plant, die zich ook zeer gemakkelijk uit zaad laat kweeken. Voor beschrijving zie afdeeling „Planten."

718. **orientale hybriden,** p. lood f 0.80, p. pakje f 0.15
719. **rupifragum** . . . . „ „ - 0.15

PENSTEMON.

720. **ovatus** . . . . p. pakje f 0.10

PHLOX.

721. **decussata hybriden,** p. lood f 0.80, p. pakje f 0.15

PHYSOSTEGIA.

722. **virginica alba** . . . . p. pakje f 0.10

POLEMONIUM.

723. **album** . . . . p. pakje f 0.10

POTENTILLA.

724. **formosa** . . . . p. pakje f 0.15

PRIMULA.

725. **Auricula,** echte Luiker Aurikels in schoone kleuren gemengd . . . . p. pakje f 0.25
726. **capitata (cashmeriana)** . . . . „ „ - 0.20
727. **japonica** . . . . „ „ - 0.15
728. **rosea grandiflora** . . . . . . „ „ - 0.25
729. **veris elatior** . . . . „ „ - 0.15
730. „ „ **coerulea.** NIEUW! „ „ - 0.35

PYRETHRUM.

Deze bladplanten worden zeer veel gebruikt voor randen om bloemperken of voor mozaiekvakken. De eerste heeft fraai goudgeel blad, de andere is een nieuwe variëteit met varenachtig ingesneden blaadjes. Bijtijds gezaaid kan men de plantjes nog hetzelfde jaar gebruiken. Wanneer men de vrij onaanzienlijke bloemen geregeld afknipt, komt dit aan den groei der plant ten goede.

731. **parthenifolium aureum** . . . . p. pakje f 0.10
732. **parthenifolium aureum selaginoides,** „ „ - 0.15

roseum hybr. grand, zie *Nieuwe Invoeringen van vorige jaar.*

RHEUM.

733. **Emodi** (echt) . . . . p. pakje f 0.15

RUDBECKIA (Echinacea).

734. **purpurea** . . . . p. pakje f 0.15

SALVIA

Evenals de *Pyrethrums,* laat deze zilverbladerige bladplant zich uitmuntend gebruiken voor randen en mozaiekvakken. Zij kan in April buiten worden uitgezaaid.

735. **argentea** . . . . p. pakje f 0.10

SCABIOSA.

736. **caucasica** . . . . p. pakje f 0.15
737. **ochroleuca** . . . . „ „ - 0.10

SIDALCEA.

738. **Malvaeflora Listeri** . . . . . p. pakje f 0.15

TELEKIA.

739. **speciosa** . . . . p. pakje f 0.10

THALICTRUM.

740. **adiantifolium** . . . . p. pakje f 0.10
741. **aquilegifolium purpureum** . . . „ „ - 0.15

VIOLA ODORATA.

Dit welriekende viooltje, ook wel Maartsch viooltje genoemd is in het voorjaar een voorbode van de lente, terwijl laat in het najaar de bloemen zich ook vertoonen. Het bemint een half beschaduwde standplaats. Het zaad moet een jaar in den grond liggen alvorens het kiemt.

742. **semperflorens,** *Boschvioollje* . . p. pakje f 0.15

Afdeeling II.

Overblijvende Planten Bol- en Knolgewassen.

A. AARDBEZIËNPLANTEN.

Tenzij men dit uitdrukkelijk verlangt of dit met het oog op de gelijktijdige verzending van andere artikelen wenschelijk is, begint de aflevering der aardbeziënplanten niet vóór begin April. Het is mij namelijk door ondervinding gebleken, dat wanneer de planten in April of Mei worden geplant, ze gewoonlijk beter slagen, dan wanneer dit eerder geschiedt. In goed beschutte tuinen en daar waar men niet veel last heeft van het zoogen. „opvriezen", kunnen de planten ook in Augustus—half October worden geplant.

De aardbezie is eene plant die zeer lange wortels maakt. Het is dus raadzaam vóór het planten den grond diep om te spitten en flink te bemesten, liefst met halfverganen mest.

Gewoonlijk worden de planten te dicht bijeengezet, zoodat ze geen voldoende ruimte hebben om zich te ontwikkelen. In mijn kweekerij worden ze op minstens $1/2$ meter afstand van elkaar op regels uitgeplant, hetgeen mij het doelmatigst is gebleken. Bij het planten moet er vooral op gelet worden, dat de wortels naar alle richtingen worden uitgespreid en de planten niet te diep komen te staan. Indien de grond droog is moet flink worden gegoten, of nog beter is het, om vóór het planten den grond goed nat te maken. Zeer nuttig is het om korte paardenmest tusschen de planten te strooien. Is de grond niet krachtig, zoo is het zeer aanbevelenswaardig om begin Mei sterk verdunde, vloeibare mest toe te dienen. Na den oogst worden de ranken verwijderd en de planten zoo mogelijk weer gegierd. Sommige tuinlieden hebben nog de gewoonte om dan ook tevens de bladeren af te snijden. Dit kan evenwel niet sterk genoeg worden ontraden, daar het zeer nadeelig op de planten werkt, die in eens van hare bladeren ontdaan, en deze zoo hoogst noodige organen niet kunnende missen, hare sappen moeten aanwenden tot vorming van nieuwe bladeren. Men moet de bladeren eerst afsnijden wanneer deze geheel verdord zijn. Laat men ze aan de planten, zoo geven ze dezelve een natuurlijke bedekking voor de koude. In November wordt met stalmest gemest en is het steeds goed de planten met een weinig stroo, blad of andere ruigte te bedekken, echter niet te veel, vooral niet op het hart der plant, daar deze er dan onder zou verstikken.

Op deze wijze behandeld krijgt men ongetwijfeld een rijken oogst van prachtige vruchten en kan eene aanplanting minstens 5 jaar vrucht dragen. Na het 4e jaar worden de vruchten kleiner, en is het raadzaam na het 5e jaar nieuwe bedden aan te leggen.

Collectiën Aardbeziënplanten. (Flinke verspeende planten.)

100 stuks in 20 vroege en late soorten naar mijne keus	f	2.50
100 „ „ 10 „ „ „ „ „ „ „	-	2.—
250 „ „ 25 „ „ „ „ „ „ „	-	7.50
250 „ „ 5 „ „ „ „ „ „ „	-	4.—
1000 „ „ 5 „ „ „ „ „ „ „	-	15.—

LINUM.

694. **flavum** . . . . p. pakje f 0.10
695. **perenne** . . . . „ „ - 0.05
696. „ **album** . . . . „ „ - 0.10

LOBELIA.

697. **cardinalis Queen Victoria,** met donkerrood blad p. pakje f 0.10

LUPINUS.

698. **polyphyllus,** in kleuren gemengd p. pakje f 0.10
699. „ **albus** . . . . . „ „ - 0.10

LUNARIA.

700. **biennis, Judaspenning** . . . . p. pakje f 0.10

LYCHNIS.

701. **Chalcedonica** . . . . p. pakje f 0.10

MALVA.

702. **alcea** . . . . p. pakje f 0.10
703. **moschata alba** . . . . „ „ - 0.15

MYOSOTIS.

De *Vergeet-mij-niet* kan tot de schoonste der vroegbloeiende voorjaarsplanten worden gerekend en is bij uitstek geschikt voor perken die later met Canna's, Dahlia's, Begonia's enz. worden beplant, daar deze toch eerst laat op de perken komen. Men zaait half Juli en zet de plantjes in het najaar op de perken, waarop ze voor strenge vorst met eenige dennentakken of andere ruigte moeten worden bedekt. De plantjes ontwikkelen zich het best, daar waar de grond niet al te droog is. De variëteiten van „Victoria" vormen zeer lage gedrongen plantjes.

708. **alpestris,** *Vergeet-mij-niet,* blauw, p. lood f 0.65, p. pakje f 0.10
709. **alpestris, alba,** wit „ „ - 0.35, „ „ - 0.10
710. „ **rosea,** rose „ „ - 0.50, „ „ - 0.15
711. „ **Victoria,** blauw, grootbl. „ „ - 0.15
712. „ „ **alba,** wit „ „ „ - 0.20
713. „ „ **rosea,** rose „ „ „ - 0.25

ONOPORDON.

714. **bracteatum (Reuzendistel),** *Nieuw,* p. pakje f 0.20
Voor beschrijving zie Nieuwigheden.

OROBUS

715. **vernus** . . . . p. pakje f 0.10

PAPAVER.

716. **alpinum** . . . . p. pakje f 0.10
717. **nudicaule,** oranje, geel en wit gem., „ „ - 0.10

Buitengewoon dankbaar bloeiende plant, die zich ook zeer gemakkelijk uit zaad laat kweeken. Voor beschrijving zie afdeeling „Planten."

718. **orientale hybriden,** p. lood f 0.80, p. pakje f 0.15
719. **rupifragum** . . . . „ „ - 0.15

PENSTEMON.

720. **ovatus** . . . . p. pakje f 0.10

PHLOX.

721. **decussata hybriden,** p. lood f 0.80, p. pakje f 0.15

PHYSOSTEGIA.

722. **virginica alba** . . . . p. pakje f 0.10

POLEMONIUM.

723. **album** . . . . p. pakje f 0.10

POTENTILLA.

724. **formosa** . . . . p. pakje f 0.15

PRIMULA.

725. **Auricula,** echte Luiker Aurikels in schoone kleuren gemengd . . . . p. pakje f 0.25
726. **capitata (cashmeriana)** . . . . „ „ - 0.20
727. **japonica** . . . . „ „ - 0.15
728. **rosea grandiflora** . . . . . . „ „ - 0.25
729. **veris elatior** . . . . „ „ - 0.15
730. „ „ **coerulea.** NIEUW! „ „ - 0.35

PYRETHRUM.

Deze bladplanten worden zeer veel gebruikt voor randen om bloemperken of voor mozaiekvakken. De eerste heeft fraai goudgeel blad, de andere is een nieuwe variëteit met varenachtig ingesneden blaadjes. Bijtijds gezaaid kan men de plantjes nog hetzelfde jaar gebruiken. Wanneer men de vrij onaanzienlijke bloemen geregeld afknipt, komt dit aan den groei der plant ten goede.

731. **parthenifolium aureum** . . . . p. pakje f 0.10
732. **parthenifolium aureum selaginoides,** „ „ - 0.15
roseum hybr. grand, zie *Nieuwe Invoeringen van vorige jaar.*

RHEUM.

733. **Emodi** (echt) . . . . p. pakje f 0.15

RUDBECKIA (Echinacea).

734. **purpurea** . . . . p. pakje f 0.15

SALVIA

Evenals de *Pyrethrums,* laat deze zilverbladerige bladplant zich uitmuntend gebruiken voor randen en mozaiekvakken. Zij kan in April buiten worden uitgezaaid.

735. **argentea** . . . . p. pakje f 0.10

SCABIOSA.

736. **caucasica** . . . . p. pakje f 0.15
737. **ochroleuca** . . . . „ „ - 0.10

SIDALCEA.

738. **Malvaeflora Listeri** . . . . . p. pakje f 0.15

TELEKIA.

739. **speciosa** . . . . p. pakje f 0.10

THALICTRUM.

740. **adiantifolium** . . . . p. pakje f 0.10
741. **aquilegifolium purpureum** . . . „ „ - 0.15

VIOLA ODORATA.

Dit welriekende viooltje, ook wel Maartsch viooltje genoemd is in het voorjaar een voorbode van de lente, terwijl laat in het najaar de bloemen zich ook vertoonen. Het bemint een half beschaduwde standplaats. Het zaad moet een jaar in den grond liggen alvorens het kiemt.

742. **semperflorens,** *Boschviooltje* . . p. pakje f 0.15

Afdeeling II.

Overblijvende Planten Bol- en Knolgewassen.

A. AARDBEZIËNPLANTEN.

Tenzij men dit uitdrukkelijk verlangt of dit met het oog op de gelijktijdige verzending van andere artikelen wenschelijk is, begint de aflevering der aardbeziënplanten niet vóór begin April. Het is mij namelijk door ondervinding gebleken, dat wanneer de planten in April of Mei worden geplant, ze gewoonlijk beter slagen, dan wanneer dit eerder geschiedt. In goed beschutte tuinen en daar waar men niet veel last heeft van het zoogen. „opvriezen", kunnen de planten ook in Augustus—half October worden geplant.

De aardbezie is eene plant die zeer lange wortels maakt. Het is dus raadzaam vóór het planten den grond diep om te spitten en flink te bemesten, liefst met halfverganen mest.

Gewoonlijk worden de planten te dicht bijeengezet, zoodat ze geen voldoende ruimte hebben om zich te ontwikkelen. In mijn kweekerij worden ze op minstens ½ meter afstand van elkaar op regels uitgeplant, hetgeen mij het doelmatigst is gebleken. Bij het planten moet er vooral op gelet worden, dat de wortels naar alle richtingen worden uitgespreid en de planten niet te diep komen te staan. Indien de grond droog is moet flink worden gegoten, of nog beter is het, om vóór het planten den grond goed nat te maken. Zeer nuttig is het om korte paardenmest tusschen de planten te strooien. Is de grond niet krachtig, zoo is het zeer aanbevelenswaardig om begin Mei sterk verdunde, vloeibare mest toe te dienen. Na den oogst worden de ranken verwijderd en de planten zoo mogelijk weer gegierd. Sommige tuinlieden hebben nog de gewoonte om dan ook tevens de bladeren af te snijden. Dit kan evenwel niet sterk genoeg worden ontraden, daar het zeer nadeelig op de planten werkt, die in eens van hare bladeren ontdaan, en deze zoo hoogst noodige organen niet kunnende missen, hare sappen moeten aanwenden tot vorming van nieuwe bladeren. Men moet de bladeren eerst afsnijden wanneer deze geheel verdord zijn. Laat men ze aan de planten, zoo geven ze dezelve een natuurlijke bedekking voor de koude. In November wordt met stalmest gemest en is het steeds goed de planten met een weinig stroo, blad of andere ruigte te bedekken, echter niet te veel, vooral niet op het hart der plant, daar deze er dan onder zou verstikken.

Op deze wijze behandeld krijgt men ongetwijfeld een rijken oogst van prachtige vruchten en kan eene aanplanting minstens 5 jaar vrucht dragen. Na het 4e jaar worden de vruchten kleiner, en is het raadzaam na het 5e jaar nieuwe bedden aan te leggen.

Collectiën Aardbeziënplanten. (Flinke verspeende planten.)

100	stuks in 20 vroege en late soorten naar mijne keus	f 2.50
100	„ „ 10 „ „ „ „ „ „ „	- 2.—
250	„ „ 25 „ „ „ „ „ „ „	- 7.50
250	„ „ 5 „ „ „ „ „ „ „	- 4.—
1000	„ „ 5 „ „ „ „ „ „ „	- 15.—


Nieuwe grootvruchtige doorbloeiende Aardbeziën.

In de laatste jaren is, door kruising van Maandbloeiers met de beste grootvruchtige soorten, een geheel nieuw ras ontstaan. De eerste was de nu reeds vrij algemeen bekende „St. Joseph" en daarop zijn verscheiden andere gevolgd. Daar men van deze soorten tot in September kan plukken, verdienen ze alle aanbeveling en heb ik daarom gemeend, ze in een afzonderlijke rubriek te moeten vereenigen.

St. ANTOINE DE PADOUE. *Nieuwe doorbloeiende soort,* p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Deze merkwaardige soort is eene belangrijke verbetering van de nieuwe en thans reeds vrij algemeen bekende *St. Joseph* en is ontstaan door kruising van deze met *Royal Sovereign.* De stevige stengels komen flink boven de bladeren uit en de vruchten zijn veel grooter dan van St. Joseph. De smaak is uitmuntend en de vruchten zijn stevig, waardoor ze zeer geschikt zijn voor de verzending.

Zie afbeelding hiernevens.



St. Antoine de Padoue.

Leo XIII, ... p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Grootvruchtige soort met vuurroode regelmatig gevormde vruchten, die iets grooter zijn dan van St. Joseph. Sterke rijkdragende soort.

Orégon, ... p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Uit Amerika ingevoerde soort met prachtige groote vruchten. Zij heeft de eigenaardigheid van zeer weinig uitloopers te geven en is daardoor nog vrij zeldzaam.

Rubicunda, . . . p. 100 st. f 3.—, p. 10 st. f 0.40

Zeer vroege doorbloeiende soort, die ook eene verbetering is van St. Joseph.

St. Joseph, . . . p. 100 st. f 3.—, p. 10 st. f 0.40

Thans reeds algemeen bekende prachtige voor eenige jaren in den handel gebrachte doorbloeiende soort, niet te vergelijken met gewone Maandbloeiers wat vorm en kwaliteit aangaat. Draagt tot in den Herfst.

Onderstaande beide soorten kunnen niet geheel tot de bovengenoemde worden gerekend, daar de planten zelf niet doorbloeien, maar de uitloopers in den nazomer weer vruchten dragen.

Belle alliance, . . p. 100 st. f 3.50, p. 10 st. f 0.40

Deze nieuwe soort is volgens de beschrijving van den kweeker eene verbetering van de bekende König Albert von Sachsen en beter van vorm, smaak en kleur dan deze en heeft bovendien nog de eigenaardigheid, dat de uitloopers, die zij voortbrengt, ook van af half Augustus beginnen te dragen, evenals dat bij Louis Gauthier het geval is. Zij kan dus ten zeerste worden aanbevolen, daar de vruchten bizonder lekker zijn.


Louis Gauthier, Tweemaal dragend,
p. 100 st. f 2.50. p. 10 st. f 0.40

Deze Fransche soort heeft deze eigenaardigheid dat ze eerst in Juni draagt en dan later in Augustus weer aan de jonge uitloopers. Groote lichtrose saprijke vruchten met een heerlijke, geurige smaak.

NIEUWSTE GROOTVRUCHTIGE AARDBEZIËN.

Aprikose . . . . p. 100 st. f 3.—, p. 10 st. f 0.40

Deze soort is ontstaan door kruising van Noble met Kaiser's Sämling en heeft de goede eigenschappen van beide in zich vereenigd. Het vleesch is rose en heeft een geurigen abrikoosachtigen smaak. De planten zijn sterk en zeer rijkdragend.



Belle Alliance.

Chatelaine de Grentheville p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Deze nieuwe Fransche soort kan zonder twijfel een der fijnst smakende genoemd worden. Zij is zeer rijkdragend, de vruchten zijn rond, bizonder geurig en zeer zoet. Bizonder aanbevelenswaardig.

Dr. Weidenmüller . . p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.40

Sterke planten met weinig loof en zeer rijkdragend. De vrucht is helderrood met opliggende zaadjes, terwijl de vorm veel overeenkomt met die van Justizrath Steinberger. Het witte vleesch is vast, sappig en zeer geurig. Zeer vroege soort.

Duchesse Olga. . . . p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze soort heeft de eigenaardigheid, dat zij eerst in October begint te bloeien en onder glas vroeg in het voorjaar vrucht geeft. De vruchten zijn groot, donkerrood en zeer sappig.

France-Russie . . . . p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.40

De vruchten van deze soort zijn enorm groot, zoo zelfs, dat de winner er van zegt, dat ze grooter zijn dan van eenige andere. De planten hebben zeer sterk loof en de vuurroode vruchten zijn van prima kwaliteit.

Fillbasket . . . . . p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

De winner dezer soort zegt, dat zij rijkdragender is dan eenige andere en ontstaan door kruising van Royal Sovereign en Latest of all. Zij brengt stengels voort, die elk tot 30 vruchten dragen en is tamelijk laat. De vrucht is langwerpig, sappig en zeer geurig.

Général de Négrier . . p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.40

Deze soort heeft veel overeenkomst met Louis Gauthier, maar de vruchten hebben een fraaie schitterend roode kleur en zijn even geurig als deze.

Jarles. . . . . p. 10 st. f 5.—, p. st. f 0.60

Deze nieuwe soort werd op de Tentoonstelling te Petersburg bekroond. De vruchten zijn hanekamvormig en helder vermiljoenrood van kleur. Het is een verbetering der oude soort Docteur Morère.

Mentmore, p. 100 st. f 9.—, p. 10 st. f 1.— p. st. f 0.15

Prachtige nieuwe middelvroege soort met schitterend karmijnroode peervormige vruchten. Het vleesch is helderrood en heeft van binnen geen harde pit of holte, zooals bij vele andere soorten. De planten zijn buitengewoon sterk en laten zich ook uitstekend forceeren.

Onkel Ferdinand, . . p. 10 st. f 3.50, p. st. f 0.50

Buitengewoon vruchtbare en sterke soort. De vruchten zijn vuurrood en met opliggende zaadjes, terwijl de eersten tot 8 cM. breed worden en 60 gram zwaar worden en de vorm hebben van een reistaschje, zijn de latere niet zoo groot en kogelrond. Het vleesch is helderrood, tamelijk stevig, zeer sappig en van een heerlijken smaak.

Trafalgar, ... p. 10 st. f 1.—, p. st. f. 0.15

De allerbeste late Aardbei.

De meeste late soorten hebben helaas de eigenaardigheid, dat zij weinig vrucht geven en daarom kan deze een groote verbetering van Latest of All worden genoemd. Zij is zeer rijkdragend, de vruchten zijn groot en rond en hebben veel overeenkomst met Royal Sovereign. De smaak is nog fijner dan deze laatste. Zij zal zonder twijfel spoedig algemeen gevraagd worden.

Algemeene Collectie.

British Queen . . p. 10 st. f 0.50, p. 100 st. f 3.—

Groote ei-vormige, soms afgeplatte vruchten. Helderrood, zoet en geurig. Deze soort behoeft veel warmte.

Edouard Lefort . p. 10 st. f 0.50, p. 100 st. f 3.—

Vroege, grootvruchtige Fransche soort. De vruchten zijn van binnen en van buiten hoogrood, daarbij saprijk en zoet.

Empress of India p. 10 st. f 0.50, p. 100 st. f 3.—

Groeit gedrongen, zoowel in den bak als op den kouden grond, en brengt afgeknot-kegelvormige, scharlakenroode vruchten voort van een geurigen smaak.

Garteninspector A. Koch p. 10 st. f 0.50, p. 100 st. f 3.—

Vroege soort met lange, stomppuntige helderroode vruchten, Rose vleesch en heerlijk geurig van smaak.

Gunton Park . . p. 10 st. f 0.50, p. 100 st. f 3.—

Donker scharlakenroode vruchten met stevig, gekleurd vleesch en een frisschen smaak.

Hohenzollern, . . p. 10 st. f 0.50, p. 100 st. f 3.—

Groote kegelvormige, donkerkarmijnroode vruchten van een heerlijken smaak. Deze vroege soort draagt zeer overvloedig en langdurig, zelfs tot einde Juli.

John Ruskin. . . p. 10 st. f 0.50, p. 100 st. f 3.—

Zeer rijkdragende soort, ook geschikt om te forceeren. De vruchten zijn donkerrood, vast en geurig. Goede variëteit voor verzending.

Jucunda . . . . p. 10 st. f 0.30, p. 100 st. f 2.—

Bekende late soort met donker oranjekleurige vrucht.

Justizrath Steinberger, p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Een gedrongen groeiende soort, die tamelijk laat rijpt. De rosevruchten zijn zeer groot met diepliggende zaadjes, De eerste vruchten zijn hanekamvormig en tot 7 cM. breed. terwijl de later rijpende kegelvormig en iets kleiner zijn. Het vleesch is sneeuwwit en van een heerlijke smaak.

Kaiser Nicolaus von Rusland p. 10 st. f 0.50, p. 100 st. f 3.—

De hoekige, kolossale vruchten zijn van een donkerscharlakenroode kleur. Zacht wit vleesch eenigszins naar frambozen smakend. Overigens dezelfde eigenschappen als de vorige soort.

Kaiser's Sämling . p. 10 st. f 0.30, p. 100 st. f 2.—

Grootvruchtige, zeer rijkdragende vroege soort. De hartvormige vruchten zijn helderrood, het vleesch zoet en smeltend.

King of the Earlies (Laxton) p. 10 st. f 0.40, p. 100 st. f 3.—

Vroeg en rijkdragend. De vrucht is zeer zoet en geurig.

König Albert von Sachsen p. 10 st. f 0.30, p. 100 st. f 2.—


Buitengewoon vruchtbaar en vroeg. Ovale lichtroode vruchten met barnsteenkleurig sappig vleesch. Zoet en aromatisch van smaak.

La France . . . p. 10 st. f 0.50, p. 100 st. f 3.—

De groote vruchten hangen aan stevige rechtopstaande stengels zoodat ze weinig van ongedierte te lijden hebben; vleesch vast en wit. Zeer rijkdragend.

Latest of All (Laxton) p. 10 st. f 0.50, p. 100 st. f 3.—

Zeer late variëteit met prachtige donkerroode vruchten, aan beide zijden een weinig afgeplat. Bijzonder aan te bevelen.



Laxton's Noble.

Laxton's Noble . p. 10 st. f 0.30, p. 100 st. f 2.—

Deze rijkdragende vroege soort heeft zeer groote regelmatig gevormde vruchten met vast vleesch en een heerlijke wijnachtige smaak. Ze is vele malen met goud bekroond en is eene der meest aan te bevelen soorten.

Laxton's No. I . p. 10 st. f 0.30; p. 100 st. f 2.—

Deze uit Engeland ingevoerde variëteit is de vroegste tot heden bekend. Ze heeft prachtige helder scharlakenroode, vruchten die buitengewoon geurig zijn.

Leader (Laxton) . p. 10 st. f 0.50; p. 100 st. f 3.—

Middelvroege soort met groote kegelvormige scharlakenroode vruchten en donkerrood geurig vleesch van een ananasachtige smaak. Zeer geschikt om te forceeren.

Lord Suffield . . p. 10 st. f 0.50; p. 100 st. f 3.—


Sterke, rijkdragende plant met groote hanekamvormige vruchten. Vast vleesch, geurig en donkerkarmijnrood.

May Queen . . . p. 10 st. f 0.40; p. 100 st. f 3.—

Deze soort ook wel „Oranje" genoemd om de kleur is een der geurigste van alle variëteiten en dus zeer aanbevelenswaardig.

Monarch (Laxton) p. 10 st. f 0.50; p. 100 st. f 3.—

Deze soort is iets vroeger dan de Leader en heeft karmijnroode vruchten met vast, wit vleesch. Zeer geurig.



Royal Sovereign.

Royal Sovereign . p. 10 st. f 0.35; p. 100 st. f 2.50

Ongetwijfeld is deze variëteit eene der beste die tot nu toe bekend is. Grooter dan van eenige andere zijn hare schitterend scharlakenroode, regelmatig gevormde vruchten. Vast wit vleesch en een aromatischen, wijnachtigen smaak. Zeer rijkdragend en de beste om te forceeren.

Sensation (Laxton) p. 10 st. f 0.35; p. 100 st. f 2.50

Zeer groot; in- en uitwendig scharlakenrood. Platrond van vorm en een uitstekende smaak.

Sir Jos. Paxton . p. 10 st. f 0.50; p. 100 st. f 3.—

Late soort, met niet zeer groote hartvormige scharlakenroode vruchten. Het witte vleesch is fijn van smaak.

Souvenir de Bossuet p. 10 st. f 0.50; p. 100 st. f 3.—

Zeer goede middelvroege, Fransche variëteit, met groote hartvormige, helderroode vruchten. Zeer saprijk en zoet.

Souvenir de Mad. Struelens p. 10 st. f 0.70; p. 100 st. f 5.—

Deze is de donkerste van alle aardbeien. De platronde vruchten zijn bijna zwart en van een bizonder fijnen smaak. Zeer aan te bevelen.

Steven's Wonder . p. 10 st. f 0.50; p. 100 st. f 3.—

Zeer vroege soort met groote licht gekleurde vruchten. Rijkdragend en uitmuntend om te forceeren.

Triomphe de Constance p. 10 st. f 0.60, p. 100 st. f 4.—

Tamelijk vroege variëteit met fijne, geurige donkerroode vruchten.

Veitch's Perfection p. 10 st. f 0.50 p. 100 st. f 3.50

Nieuwe bijzonder rijkdragende soort met enorme vruchten. (Soms hebben ze een doorsnede van 5 cM.) Ze groeit gedrongen, de vruchten zijn stevig en hebben een zeldzaam goede, geurige smaak.

Veitch's Prolific . p. 10 st. f 0.70 p. 100 st. f 5.—

Deze is verleden jaar in den handel gebracht als de rijkstdragende aardbei. Evenals de vorige soort zeer geurige vruchten.

Waterloo . . . . p. 10 st. f 0.70 p. 100 st. f 5.—

Zeer late soort met heerlijke, donkerroode, groote vruchten.

MAANDBLOEIERS.


Rhum von Döbeltitz p. 10 st. f 0.50; p. 100 st. f 3.—

Rijkdragende grootvruchtige ronde, roode soort.

Schöne Meissnerin p. 10 st. f 0.40; p. 100 st. f 3.50

De schoonste van alle witte maandbl. Smaak uitmuntend.

B. PLANTEN VOOR DEN MOESTUIN.



Aspersie.

Aspersie van Argenteuil . . . . p. 100 st. f 2.75

Uitmuntende verscheidenheid, welke reeds zeer vroeg prachtige dikke asperges oplevert. In de omstreken van Parijs wordt deze bijna uitsluitend gebruikt. Zware planten.

Aspersie Connover's Collosal . . . p. 100 st. f 3.—

Uit Amerika ingevoerde verscheidenheid, die door sommigen wordt aanbevolen, doch door mij niet boven de vorige wordt verkozen.

Over de kultuur der Aspersie zie onder Afd. I, A. Groentezaden, bladz. 7.

Dragon, echte overblijvende p. st. f 0.10, p. 10 st. f 0.75

Het jonge loof levert een zeer smakelijk toekruid bij salade en is voor den inmaak van Augurken enz. onmisbaar.

Lavendel . . . . . p. st. f 0.20, p. 10 st. f 1.50

Plant met zeer geurige bladeren en bloemen, welke somtijds als kruiderij wordt gebruikt. In Engeland worden de gedroogde bloemstengels met violet blauwe bloemen veel tusschen linnengoed gelegd, om daaraan een aangenamen geur te geven.

Lieve-Vrouwe-bedstroo p. st. f 0.10, p. 10 st. f 0.60

Welriekend plantje, dat veel wordt gebruikt om Meiwijn of Rijnwijnbowl mede te kruiden.

Majoraan . . . . . p. st. f 0.10, p. 10 st. f 1.—

Men gebruikt de blaadjes dezer plant om eenige spijzen mede te kruiden, zooals erwten, boonen, visch.

Mierikswortel . . . . p. st. f 0.15

Deze wordt veel gebruikt bij het inmaken van Augurken enz.

Pimpernel, toekruid voor salade . . . p. st. f 0.10
p. 10 „ „ 0.80

Rhabarber, *Paragon* . p. st. f 0.15, „ 10 „ „ 1.—

Bijzonder smakelijke verscheidenheid, welke geen bloemstengels voortbrengt.

Rhabarber, *Queen Victoria* p. st. f 0.15, p. 10 st. f 1.—
Salie . . . . „ „ „ 0.10, „ 10 „ „ 0.50
Thijm . . . . „ „ „ 0.15, „ 10 „ „ 1.—

De bladeren en de jonge scheuten dezer plant worden gebruikt als kruiderij bij sommige groenten en vleesch.

Venkel . . . . . . p. st. f 0.10, p. 10 st. f 0.80

De zaadschermen en bladeren worden hoofdzakelijk gebruikt bij het inleggen van Augurken enz.

Wijnruit . . . . . . p. st. f 0.15, p. 10 st. f 1.—

De bladeren hebben een zeer scherpe lucht en een bitteren en pikanten smaak. Ze worden somtijds gebruikt bij sommige groenten.

Zuring, *breedbladerige* p. 10 st. f 0.50, p. 100 st. f 2.50

Zwijndrechtsche pootuienplantjes . p. 1000 st. f 1.50

Deze worden uitgeplant op eene onderlinge afstand van 15 cM., op regels welke 30 cM. van elkaar zijn verwijderd. Zij groeien in elken voedzamen grond en leveren reeds in Augustus prachtige groote blanke uien.

Bloemkoolplanten, vroege broei (overwinterde planten) p. 100 st. f 3.—

Roode-, witte- en Savoyekoolplanten, (overwinterde planten) . . . . p. 100 st. f 1.50

Kropslaplanten, bonte chili en broeigeel (overwinterde planten) . . . . p. 100 st. f 0.80

C. BOL- EN KNOLGEWASSEN.

Geschikt om in het voorjaar te worden uitgeplant.

KNOLBEGONIA's.

De Knolbegonia's worden direct na ontvangst uitgepakt en op een droge koele, en vorstvrije plaats tot half Maart bewaard. Men plant ze tegen dien tijd bij voorkeur in een lauw warmen bak om ze eerst te laten uitloopen. Ook kan men ze voor dat doel in potten zetten in de warme kamer. Einde Mei of begin Juni worden ze op de perken uitgeplant, die eerst goed van meststoffen moeten voorzien zijn. Op lichten zandgrond moeten ze bij droog weder des avonds worden gegoten.

N.B. Het is wel eens gebeurd, dat ik klachten kreeg, dat de Knolbegonia's niet uitliepen. Daar ik echter steeds goede gezonde knollen aflever, moet de oorzaak worden gezocht in eene verkeerde behandeling. Zelfs heb ik al eens gezien, dat de knollen onderstboven geplant waren! **Om aan dit bezwaar tegemoet te komen, ben ik op uitdrukkelijk verlangen bereid om tegen geringe vergoeding der kosten, de knollen in mijne bakken te laten uitloopen en ze in Mei of Juni te verzenden, wanneer ze geheel gereed zijn om op de perken te worden uitgeplant. Hiervoor wordt dan $2^1/_2$ cent per stuk extra berekend. Men gelieve dit dan echter bij de bestelling op te geven.**

KNOLBEGONIA's (vervolg).

	p. 10 st.	p. stuk
enkel grootbloemige met rechtopstaande bloemen, in vele kleuren gemengd	f 0.80	f 0.10
donkerroode	- 1.25	- 0.15
roode	- 0.90	- 0.10
oranjeroode	- 1.—	- 0.15
rozeroode	- 1.—	- 0.15
zalmkleurige	- 1.25	- 0.15
witte	- 1.—	- 0.15
gele	- 1.—	- 0.15
dubbele grootbloemige met rechtopstaande bloemen, in vele kleuren gemengd	- 3.—	- 0.40
dubbele roode	- 4.50	- 0.50
„ **rose**	- 4.50	- 0.50
„ **witte**	- 4.50	- 0.50

CANNA INDICA. BLOEMRIET.



Grootbloemige Canna's.

Deze nieuwe grootbloemige Canna-variëteiten met op Gladiolus of zelfs Orchideeën gelijkende bloemen, hebben langzamerhand de gewone groen- of bruinbladerige soorten geheel verdrongen en geen wonder, want zoowel voor beplanting van bloemperken als van randen om heesterperken enz., maken ze een zeer schoon effect. Men zette de knollen direct na ontvangst in potten en plaatse ze in den warmen bak of wel in een verwarmd vertrek tot einde Mei, wanneer ze met kluit worden uitgeplant op een afstand van pl.m. 2 voet onderling. De grond moet vooraf goed diep worden omgespit en flink gemest.

Men kan ze ook tot den planttijd inkuilen in een bakje met niet te vochtige aarde en dit op een lichte, droge en vorstvrije plaats in schuur of kelder zetten. Ze komen dan echter veel later in bloei.

N.B. Voorzoover bij de verschillende variëteiten de kleur der bladeren niet is opgegeven, zijn deze groen.

CANNA INDICA. BLOEMRIET.

De soorten welke met een sterretje (*) zijn gemerkt, zijn Orchidee-bloemig.

Hoogte in centimeters.		p. stuk
120.	***Africa** Oranje met purper, glanzend donkerbruin blad.	f 0.30
100.	**Alemannia** Nieuw, extra grootbloemig, steenrood.	f 0.20
100.	**Alliance** Nieuw, rood, achterzijde geel.	- 0.20
110.	**Alphonse Bouvier** Donker vermiljoenrood, rijkbloeiend.	- 0.15
120.	**Antoine Barton** Goudgeel met vuurroode stippen.	- 0.12[5]
90.	**Aug. v. d. Heiden,** oranjegeel	- 0.20
100.	**Aurora,** steenrood	- 0.20
110.	***Austria** Grootbloemig geel met lichte stippen.	- 0.15
100.	**Beauty,** oranje, bruinbladerig	- 0.50
120.	**Comte de Bichaud** Goudgeel met karmijnroode stippen.	- 0.15
100.	***Cyclop,** bloedrood, grootbloemig	- 0.20
100.	**Directeur Roorl** Lichtrood met rose tint.	- 0.20
90.	**Doyen Jean Liabaud** Licht geel, bruin gevlekt.	- 0.20
100.	**Dr. Dock** Vurig karmozijnrood, bijzonder schitterende kleur, rijkbloeiend, zeer geschikt voor perken.	0.40
90.	**Ed. Mieg,** rood, zeer schoon	f 0.25
110.	**Egandale,** bloedrood, bruinbladerig	- 0.20
120.	**Florence Vaughan** Geel met roode stippen.	- 0.20
120.	**Fratelli Ingegnoli** Oranjerood, bruinbladerig.	- 0.30
100.	**Fürst Bismarck** Schitterend rood, nieuw.	- 0.20
90.	**Gartendirector Döbener** Scharlaken bloedrood, blad schitterend donker bruinrood.	- 0.30
120.	**Gouverneur van Zimmerer** Oranje, zeer schoon, bruinbladerig.	f 0.30
90.	**Hofgartendirector Wendland** Fluweelachtig scharlaken bloedrood, naar het midden met gele stippen en met kanariegele randen. Zeer schitterende kleur. De bloemstengels komen flink boven de bruingerande bladeren uit.	- 0.20

		p. stuk
100.	**I. D. Cabos,** oranje, bruinbladerig	f 0.15
150.	**I. D. Eisele,** oranjerood, rijkbloeiend	- 0.20
150.	***Italia,** geel met roode vlekken	- 0.20
90.	**Kaiser Wilhelm II,** scharlakenrood	- 0.15
80.	**Köningin Charlotte** Bloedrood met breeden goudgelen rand. Een der schoonste voor perken; zeer rijkbloeiend.	- 0.12[5]
80.	**Koningin Wilhelmina** Karmijnrood met smal geel randje, grootbloemig.	- 0.30

CANNA INDICA. BLOEMRIET (vervolg).

Hoogte in centimeters. p. stuk

100. **L. E. Bally** . . . . f 0.15
Geel met lichtbruine stippen.

150. **Liévin Rosseels** . . . . - 0.15
Zalmkleurig, bruinbladerig.

110. **Madagascar,** geel met bruine vlekken . - 0.15

100. **Mad. Cabanne** . . . . - 0.20
Rose, van binnen lichter, nieuwe nuance.

90. **Mad. Crozy** . . . . - 0,15
Een der rijkstbloeiende; scharlakenrood met smal goudgeel randje.

80. **Mad. Forgeot** . . . . f 0.12 5
Heldergeel met lichtbruine stippen.

90. **Mad. Perrin des Isles** . . . . - 0.15
Geelachtig rose.

110. **Medway,** fraai helderrood . . . . . . - 0.20

100. **Oscar Dannecker,** Nieuw . . . . . . - 0.50
Donker kanariegeel, naar het midden oranjerood. *De eerste gele Canna met bruin blad.*

90. **Papa Canna,** rood, zeer schoon . , . . f 0.20

150. ***Parthenope,** zalmkleur, grootbloemig . . - 0.30

100. **Paul Lorenz,** donkerrood, bruinbladerig . - 0.20

140. ***Phoebe** . . . . - 0.30
Geel met van binnen rood bruine stippen, blad lichtgroen.

120. **Präsident Meyer** . . . . f 0.30
Donkerkarmijnrood, grootbloemig en met breede bruinroode bladeren.

100. **President Kruger** . . . . f 0.30
Deze variëteit heeft een zeer eigenaardige roze tint, die men bij weinig soorten aan treft.

100. **Progession,** geel met bruine stippels, . . f 0.15

90. **Quasimodo** . . . . - 0.20
Heeft veel overeenkomst met Mad. Crozy, maar grootere bloemen.

120. ***Rhed** . . . . f 0.30
Bloem rood, blad breed zeer glanzend donkerbruin met staalblauwe nuances.

100. **Rhum von Stuttgart** . . . . f 0.20
Rood met klein geel randje.

100. **Rose unique,** karmijnrose . . . . . . - 0.12 5

180. **Sénateur Millaud** . . . . - 0.12 5
De roode bloemen zijn niet bizonder groot, maar de groote donkerbruine bladeren hebben een prachtigen metaalglans.

150. **Sophie Buchner,** vermiljoenrood . . . . f 0.12 5

120. **Souvenir du Prèsident Carnot** . . . . - 0.25
Met groote vermiljoenroode bloemen, bruinbladerig.

130. **Stadrath Heidenreich** . . . . . . f 0.40
Schitterend vuurrood, bruinbladerig, zeer schoon.

115. ***Trinacria,** geel . . . . f 0.30

130. **Wilhelm Bofinger** . . . . - 0.50
Schitterend donkerfluweelrood, grootbloemig, zeer schoon.

DAHLIA'S

Sedert men er in geslaagd is door veredeling een geheel nieuw ras van Dahlia's te verkrijgen, waarvan de bloemen uitmunten door bevalligen, lossen vorm en door haar overeenkomst met de bloemen van eenige Cactussoorten, Cactus-Dahlia's genoemd, worden deze hoe langer zoo meer gewaardeerd. Zij prijken dan ook in den nazomer totdat het begint te vriezen met een onschatbaren rijkdom van bloemen, in de meest uiteenloopende kleurennuances. Men moet ze een niet al te voedzamen grond geven, want dan zouden de bladeren zich ontwikkelen ten koste van de bloemen. Ook is het zeer dienstig om, zoodra de planten de hoogte van een voet hebben bereikt, de zijscheuten, die zich mochten vertoonen, in te nijpen, waardoor de bloemen later beter boven het blad uitkomen, dan anders het geval is. Men zorge er echter voor, den kop der plant niet te beschadigen.

Men geve de planten eene tusschenruimte van 2 à 3 voet en voorzie elke plant van een stevigen stok. Voor het aanbinden moet vooral bij tijds worden gezorgd.

Mijne collectie bestaat uit de beste soorten, die in de laatste jaren in den handel zijn gebracht en overal met de hoogste onderscheidingen bekroond. Deze worden zoolang de voorraad strekt als potknollen geleverd of anders als sterke jonge planten in Mei. De knollen worden na aankomst direct uitgepakt en tot einde April op eene koele vorstvrije plaats in vochtig zand bewaard.

Dan plant men ze in potten en plaatst ze op een warm plekje in den tuin of in den kouden bak en zet ze eerst begin Juni met een potkluit op de perken.

Hoewel men de knollen ook direct op de perken kan planten zoo is zooeven genoemde behandeling toch te verkiezen

Wanneer van enkele soorten de knollen mochten zijn uitverkocht, worden ze als jonge planten in Mei afgeleverd. Ze zijn dan geschikt om direct op de perken te worden geplaatst. Ze bloeien reeds den eersten zomer even mild als de zwaarste knollen.

Hoogte in centimeters. p. stuk

120. **Alfred Vasey** . . . . f 0.40
Geelachtig met licht rose en rood.

120. **Arachne** . . . . - 0.30
Bizonder schoone bloem. Elk bloemblad is in 't midden wit, met een breeden schitterend karmijnrooden rand. Ze zijn zeer sterk gekruld en gedraaid.

120. **Amber,** barnsteenkleurig, groot . . . . f 0.50

120. **Beatrice,** zilverachtig lila . . . . . . - 0.20

150. **Beatrice Martin,** wit met rose . . . . - 0.20

120. **Bennet Goldney,** terra-cotta . . . . . . - 0.15

150. **Blanche Keith,** helder geel . . . . . . - 0.15

90. **Brittannia** . . . . - 0.25
Een zachte schaduw van zalmkleurig rose gaat naar het midden der bloem over in abrikooskleur. Vorm onberispelijk.

90. **Bridesmaid** . . . . f 0.25
Zacht rose, naar het midden in geel overgaand. Zeer schoon.

100. **Capstan,** terra-cotta met oranje . . . . f 0.30

120. **Cinderella** . . . . - 0.15
Helder purper, naar het midden met een heerlijken donker fluweelachtigen glans.

Hoogte centimeters. **DAHLIA's** (vervolg).

120. **Countess of Radnor** . . . . . p. stuk f 0.15
Vleeschkleurig met rood en geel.

130. **Cycle** . . . . „ „ - 0.20
Schitterend vuurrood met een lichtere tint naar de uiteinden der bloembladeren.

100. **Delicata**, licht rose met geel . . p. stuk f 0.20

150. **Domino**, wit met oranjestrepen . . „ „ - 0.20

120. **Emily French**, roseachtig purper . „ „ - 0.15

140. **Ensign** . . . . „ „ - 0.20
Helder karmijnrood met schoon gevormde bloemen.

120. **Ernest Cannell**, licht oranjerood . p. stuk f 0.15

120. **Ernest Glasse**, paarsrood met wit . „ „ - 0.15

120. **Flossie**, vleeschkleur met terra-cotta „ „ - 0.20

150. **Francis Humphreys**, zuiver oranje „ „ - 0.15

120. **Fuselier** . . . . „ „ - 0.20
Zalmkleurig oranje met lila, extra.

180. **Gloriosa**, zuiver karmijnrood . . „ „ - 0.15

120. **Goethe**, ... „ „ - 0.50
Zacht roomwit in vleeschkleur overgaand, nieuw.

180. **Hohenzollern** . . . . p. stuk f 0.35
In groeiwijze en vorm der bloemen komt deze nieuwe uit Duitschland ingevoerde variëteit veel overeen met *Gloriosa*. De kleur is echter schitterend barnsteen-abrikooskleurig. De bloemen komen zeer goed boven het loof uit.

130. **John H. Roach**, zachtgeel . . . p. stuk f 0.15

90. **J. E. Frewer**, helder vermiljoenrood „ „ - 0.20

120. **Keynes' White** . . . . „ „ - 0.30
De schoonste witte Cactus-Dahlia, die tot heden bekend is. De bloembladeren zijn puntig en fijn gekruld. Als snijbloem kan zij niet genoeg worden aanbevolen. De bloemen komen zeer mooi uit boven het blad en zijn op stevige stengels gezeten.
Voor eene inzending dezer bloemen te Amsterdam op 14 Sept. 1898 werd mij een certificaat Ie klasse toegekend door de Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde.

90. **Lady Penzance**. de schoonste zuivergele p. st. f 0.15

150. **Loreley** . . . . „ „ - 0.25
Deze variëteit is de schoonste rosekleurige. In 't midden gaat deze kleur over in ivoorwit. In 't najaar als de temperatuur koeler wordt zijn de bloemen het mooist. *Voor deze Dahlia werd mij door de Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde een Cerficaat van Verdienste toegekend.*

130. **Major Haskins**, karmijnrood . . . p. stuk f 0.15

90. **Marquis**, donker karmijnrood . . „ „ - 0.15

90. **Machtless** . . . . „ „ - 0.15
Donkerbruin, bijna zwart, extra.

120. **Miss A Nightingale** . . . . . . „ „ - 0.15
Geel met scharlakenrood.

110. **Mrs. Barnes**, lichtgeel met rose . „ „ - 0.15

120. **Mrs. Francis Fell**, sneeuwwit . . „ „ - 0.25

120. **Mrs. Montefiore**, scharlakenrood . „ „ - 0.15

120. **Mrs. Thonger**, donker lila . . . „ „ - 0.25

Hoogte in centimeters. **DAHLIA's** (vervolg).

90. **Mrs. Peart**, roomwit . . . . . p. stuk f 0.20

120. **Night**, fluweelzwart . . . . . . „ „ - 0.40

120. **Octopus**, wit, groote bloem . . . „ „ - 0.25

120. **Purple Prince**, violetpurper . . . „ „ - 0.15

120. **Robert Cannell**, paarsrood . . . „ „ - 0.15

120. **Starfish** . . . . „ „ - 0.25
Wat den vorm betreft heeft deze Dahlia de meest onberispelijke Cactus-vorm. De bloemen zijn zuiver koraal-rood.

120. **Valkyrie**, purperkarmijnrood . . . p. stuk f 0.15

120. **Wilson's Noble**, helderrood . . . „ „ - 0.15

120. **Wieland**. nieuw . . . . „ „ - 0.90
Zalmkleur met lichtrose, zeer rijkbloeiend.

Gewone dubbele grootbloemige Dahlia's, p. stuk f 0.25
Flinke knollen, in vele kleuren gemengd.

Dubbele grootbloemige dwerg-Dahlia's, „ „ - 0.25
Flinke knollen, in vele kleuren gemengd.

Enkelbloemige Dahlia's . . . . . . „ „ - 0.25
Flinke knollen, in vele kleuren gemengd.

Gladiolus brenchleyensis, vuurrood,
p. 10 st. f 0.25, „ „ - 0.05

„ **gandavensis**, „ 10 „ - 1.—, „ „ - 0.15
In schoone kleuren gemengd.

Gladiolus Lemoinei . . p. 10 st. f 0.60, p. st. f 0.10

Gloxinia hybrida . . . p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
In schoone grootbloemige soorten met rechtopstaande bloemen in vele kleuren gemengd.

Hyacinthus candicans, zware bollen,
p. 10 st. f 0.50, p. st. f 0,10
Dit schoone bolgewas bloeit in Augustus met prachtige neerhangende klokvormige witte bloemen, welke aan 1 Meter hooge bloemstengels gezeten zijn. Een perk van deze bollen maakt een zeer schoon effect. De bollen worden in Maart of April geplant.

LELIES.

Onderstaande Leliesoorten worden in Maart of April geplant op een diepte van 10 à 15 cM.; men zorge dat vooral de aarde boven de bollen goed van meststoffen is voorzien. Zij bloeien zeer lang in den nazomer (de Speciosum-var. zelfs totdat het begint te vriezen). Begin November moeten ze worden opgenomen en gedurende den winter op een koele plaats vorstvrij worden bewaard in zand of turfstrooisel.

Lilium auratum platyphyllum . . . . p. st. f 0.60
Deze is eene verbeterde variëteit van de algemeene bekende Japansche goudlelie. De prachtige witte bloemen, die dikwerf een middellijn hebben van 18 à 20 cM., zijn van binnen geel gestreept en donkerrood gespikkeld. Deze Lelies kan men jarenlang op dezelfde plaats laten staan, mits men ze 's winters met een weinig blad of stroo bedekt.

LELIES (vervolg).



Lilium speciosum.

Lilium speciosum (lancifolium) rubrum, p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

De Lilium speciosum-variëteiten behooren mede tot de schoonste Lelies. Met hare elegant gevormde groote bloemen zijn ze bizonder geschikt om voor groote vaasbouquetten te worden gebruikt. Ook leenen ze zich uitmuntend voor decoraties van gazons, en randen om heesterperken. Zij groeien omstreeks 60 cM. hoog.

Lilium speciosum album, p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Prachtige verscheidenheid met zuivere witte bloemen.

Lilium speciosum album multiflorum, p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Deze munt uit doordat zij meer bloemen geeft aan een stengel; zeer schoon.

Lilium speciosum punctatum, p. 10 st. f 2.75, p. st. f 0.30

De bloemen dezer schoone Lelie zijn vleeschkleurig met rose stippels.

Lilium speciosum roseum, p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Fraaie rozeroode variëteit.

D. VASTE PLANTEN EN ROTSPLANTEN.

De Vaste of overblijvende Planten worden in de laatste jaren hoe langer zoo meer gewaardeerd; en dit m. i. niet ten onrechte. Menig bloemenliefhebber toch (vooral hij, die slechts over een kleinen tuin beschikken kan) heeft geen gelegenheid om er een bak of serre op na te houden. Het zaaien van éénjarige Zomerbloemen, ook zelfs van die, welke geheel op den kouden grond kunnen gekweekt worden, mislukt hem dikwerf. De eene keer is het de droogte, die oorzaak is dat het zaad niet opkomt, een andere maal bederft een enkele nachtvorst de moeite en zorg van eenige weken, en teleurstelling is het gevolg. Het is mijne bedoeling niet hier eenigszins aan de waarde der eenjarige bloemen te kort te doen. Integendeel, wanneer deze met eenige zorg worden behandeld en de soorten op doelmatige wijze worden gekozen, zullen zij gedurende een groot gedeelte van den zomer den tuin tot sieraad kunnen strekken. Geen wonder is het echter dat men zich meer en meer gaat toeleggen op kultuur van die planten welke niet ieder jaar opnieuw behoeven gezaaid te worden en eenmaal geplant zijnde eenige jaren op dezelfde plaats kunnen blijven staan zonder veel meer zorg te vereischen, dan dat het onkruid nu en dan wordt verwijderd.

Indien men zich tegenwoordig eene met zorg gekozene collectie Vaste Planten aanschaft, kan men daardoor bijna het geheele jaar door den tuin van bloemen voorzien, de tijd dat het vriest natuurlijk uitgezonderd. Men denke, om slechts een enkel voorbeeld te noemen, aan de Helleborus niger of Kerstroos die December tot Maart bloeit, de Hepatica's, Anemone Pulsatilla, etc., die bloeien, zoodra de winter voorbij is, en de Anemone Japonica, de Vollegronds-Chrysanthemums, Asters, enz., die in den nazomer bloeien, totdat het vriest, en zelfs eenige dagen vorst zonder veel nadeel aan de bloemen kunnen doorstaan. Velen daarvan leenen zich uitmuntend tot het maken van bouquetten, zooals: Achillea, Arabis, Aubriëtia, Epimedium, Gypsophila, Spiraea, enz. Andere weer maken een zeer schoon effect, indien zij alleenstaand of in groepen in 't gazon worden geplant, of als een rand om een perk met bloemheesters, als Tritoma, Spiraea Aruncus, enz. Bovendien zijn er vele soorten, die onze aandacht trekken door de schoon gevormde of gekleurde bladeren, welke veelal zelfs in den winter hare eigenaardige kleuren en tinten behouden, en daardoor bijzonder geschikt zijn tot het aanleggen van blijvende mozaïekvakken. Ook voor beplantingen in den zoogen. natuurstijl kunnen deze planten niet genoeg worden aanbevolen. Onder deze laatste rubriek kunnen vooral worden gerangschikt de talrijke soorten en verscheidenheden van Saxifraga's, Sedum's en Sempervivum's; voorts Stachys lanata, Thymus lanuginosus en vele andere.

Behalve eenige uitzonderingen, waarbij dit vermeld is, kunnen alle hieronder aangebodene planten zonder de minste bedekking in den vollen grond overwinteren. Voor den rijkeren bloei van vele soorten, vooral die waarvan de bladeren in 't najaar afsterven, is het goed ze gedurende den winter met een zeer dun laagje blad of stroo te bedekken.

De verzending der Vaste Planten geschiedt bij open weder in Maart, April en de eerste helft van Mei; voorts in de maanden September October en November. De beste tijd van planten is ongetwijfeld in het voorjaar, met uitzondering evenwel van de zeer vroeg bloeiende soorten, die bij eene voorjaarsplanting het eerste jaar niet zoo rijk zullen bloeien; het tweede jaar zal echter de bloei dese rijker zijn.

Het is noodzakelijk vóór het planten den grond flink diep om te spitten en te bemesten.

Nieuwe en zeldzame Vaste Planten en Alpenplanten.

Om de keuze der soorten gemakkelijker te maken, heb ik bij elke plant den bloeitijd benevens de hoogte aangegeven. Deze laatste kan niet anders dan bij benadering worden bepaald, daar het afhankelijk is van den aard en de kwaliteit van den grond, en vele planten eerst haar normale hoogte bereiken een jaar of langer nadat ze geplant zijn. De soorten welke met een † zijn aangeduid, zijn bijzonder geschikt tot het maken van bouquetten; die met m gemerkt, verdienen aanbeveling voor randen of mozaïekvakken.

BLOEITIJD.

Juni-Juli. **Acantholinum venustum** . . . p. st. f 2.—


Zeer zeldzame schoone alpenplant. Bloeit zeer rijk met roseroode bloemen aan lange aren. Een der schoonste rotsplanten. Hoogte 45 cM.

Oct.-Nov. †**Aconitum Fisheri** . . . . p. st. f 0.50

Zeldzame plant, met donkergroen blad, dat zoo glanzig is, alsof het steeds met een doorschijnende vloeistof overgoten is. Zij groeit slechts 30 cM. hoog en brengt laat in den herfst een korte bloemstengel voort met groote helderblauwe bloemen, waardoor zij een eigenaardig fraai effect maakt.

Juli-Sept. †**Adonophora Potanini**, p. 10 st. f 2.75, p. st. f 0.30

Nieuwe *Campanulacaea*, groeit 60 cM. hoog met flinke stevige stengels, die met talrijke helderblauwe klokjes bezet zijn.



Ajuga metallica crispa.

*m***Ajuga metallica crispa**, p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Prachtige bladplant met een zeer eigenaardige gedrongen groeiwijze. De donkergroene metaal-glanzige bladeren zijn zeer sterk gekruld, waardoor deze nieuwe plant een zeer schoone aanwinst is voor randen of mozaïekvakken. De pyramide-vormige donkerblauwe bloemtrossen, die in den herfst te voorschijn komen, verhoogen nog hare aantrekkelijkheid. Zij groeit 20 cM. hoog.

Sept.-Nov. †**Anemone japonica Beauté parfaite**, p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Witte, zeer schoon gevormde bloemen, dikwijls halfdubbel. De schoonste van alle witte Herfst-Anemonen; groeit 75 cM. hoog.

Sept.-Nov. †**Anemone japonica elegantissima**, p. 10 st. f 3.50, p. st. f 0.40

Deze variëteit bereikt een hoogte van circa 1 Meter en is dus de hoogstgroeiende der Herfst-Anemonen. De plant is buitengewoon rijkbloeiend en elke stengel brengt een menigte bloemen voort, die halfdubbel zijn en schoon satijnachtig rose gekleurd.

Sept.-Nov. †**Anemone japonica Königin Charlotte**, p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Deze brengt kolossaal groote halfdubbele bloemen voort, die op lange stengels zijn gezeten en aan de achterzijde lilarood gekleurd zijn. Zij groeit 75 cM. hoog.

BLOEITIJD.

Sept.-Nov. †**Anemone japonica Mont Rose**, p. 10 st. f 4.—, p. st. f 0.50

De bloemen dezer variëteit zijn goed gevuld en bereiken een middellijn van 9 centimeter. De kleur is zacht-rose, terwijl de uiteinden der bloembladen evenals die der bloemknoppen karmijn-rose zijn. Naar het midden der bloem gaat het rose in vleeschkleur over. Deze var. heeft veel opgang gemaakt en is in vele Tuinbouwbladen beschreven. In Londen werd zij op 11 Sept. 1900 met een Award of Merit bekroond.

Maart-April. **Anemone Pulsatilla alba** . p. st. f 0.70

Prachtige voorjaarsbloem met helder witte bloemen. Zij komt het best tot haar recht op een zonnige standplaats en op eenigszins kalkachtigen grond en wordt 15 cM. hoog. Zeer zeldzaam.



Arabis alpina fl. pl.

April-Mei. †**Arabis alpina fl. pl.**, p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

De zuiver witte dubbele bloemen zijn op stevige losse stengels gezeten en gelijken veel op zomerviolieren. Deze plant bloeit reeds in April en is daardoor onschatbaar voor bouquetwerk. Het is wel eigenaardig, dat deze dubbele variëteit veel langere en steviger bloemstengels geeft dan de bekende enkele. Groeit 25 cM. hoog.

BLOEITIJD.

Arrhenaterum bulbosum fol. var, p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Prachtig nieuw siergras, zoowel geschikt voor potcultuur als voor den vollen grond. Zij verwierf Juli 1899 te Amsterdam een Certificaat 1e klasse. Groeit 30 cM. hoog.

Arundo Donax fol. var., p. 10 st. f 3.50, p. st. f 0.40

Nieuwe, zeer schoone zilverbont gestreepte bamboesachtige sierplant met stevige stengels en breede langwerpige bladeren. Een der schoonste Gazonplanten; wordt 1 à 2 M. hoog.

Aug.-Oct. †**Aster hybridus Mrs. Peters** p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Deze Herfst-Aster bloeit zeer rijk met fraaie witte bloemen; zij vormt tot laat in den Herfst een bloemenpyramide van circa 60 cM. hoog.

Juli-Sept. †**Astilbe Chinensis** p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20


Deze uit China ingevoerde variëteit gelijkt het meest op de Spiraea Astilboïdes. De groei is sterker, de bladen zijn iets donkerder getint, de bloemen zijn wit met een zacht rose gloed. Zeer schoon. Hoogte 45 cM.

Juli-Sept. **Astilbe hybrida Dr. Cattie,**
„ „ „ **H. Witte,**
„ „ „ **Queen of Holland,**
„ „ „ **Washington,**
„ „ „ **W. E. Gladstone,**

Prijs dezer nieuwe hybriden p. st. f 0.60

Bovenstaande 5 nieuwe variëteiten, verleden jaar door een Hollandschen kweeker in den handel gebracht, munten uit door losse stevige bloemstengels en buitengewoon forsche groeiwijze. De bloemen zijn zeer schoon. In Mei 1899 werd aan eene inzending van deze planten te Londen een Verguld Zilveren medaille toegekend. Hoogte 60 centim.

Bambusa's, zie gazonplanten.



Caltha palustris semi-plena.

BLOEITIJD.

April-Juni †**Caltha palustris semi-plena**. p. st. f 1.50

Deze prachtige nieuwe half dubbele voorjaarsbloem met groote gele langgesteelde bloemen wordt thans voor de eerste maal aangeboden. Zooals de afbeelding naar een fotografie duidelijk laat zien is het een zeer robuste groeier en zijn de bloemen veel eleganter dan van de bekende dubbele. Ik beschouw deze plant als een der beste nieuwigheden. Zij moet een eenigszins vochtige standplaats hebben, liefst aan den waterkant.



Campanula persicifolia Moerheimi.

Juli-Aug. †**Campanula persicifolia Moerheimi,** p. st. f 0.30, p. 10 st. f 2.50

Deze prachtige nieuwe Campanula, welke eenige jaren geleden in mijne kweekerij is ontstaan en door mij in den handel is gebracht, is een der schoonste nieuwe vaste planten, die in de laatste jaren zijn aangeboden. Zij is dan ook in bijna alle groote binnen- en buitenlandsche tuinbouwkundige tijdschriften besproken en eenstemmig *zeer gunstig* beoordeeld. De plant groeit meer gedrongen dan de bekende Camp. grandiflora alba (Backhousei) en de stengels zijn dicht met bloemen bezet, die niet neerhangen, zooals bij deze, maar loodrecht op de stengels staan, zoodat men de volle bloem zien kan. De enorm groote dubbele bloemen, die een middellijn van 7 à $8^1/_2$ cM. hebben, zijn plat gevormd als een roos, en de kleur is zoo prachtig sneeuwwit, als men zelden bij bloemen aantreft.

Zoowel voor decoratie-doeleinden als voor snijbloemen kan deze plant dus ten zeerste worden aanbevolen. De afgesneden bloemen blijven 8 dagen goed.

Carex scapósa . . . . p. st. f 0.30

Fraaie weinig bekende bladplant met leerachtig, breede donkergroene bladeren, die ook des winters groen blijven. Hoogte 30 cM.



Chrysanthemum maximum laciniatum Robinsoni.

BLOEITIJD.

Juli-Oct. †**Chrysanthemum maximum laciniatum Robinsoni** . . . p. st. f 0.90

Deze is zonder twijfel de beste van alle variëteiten met fijn ingesneden bloembladen zij bloeit buitengewoon rijk en lang en is dus een der beste voor bouquetten. Het is een belangrijke verbetering op de bekende variëteit filiferum. De bloembladeren zijn zeer lang en smal, waardoor de bloemen er bizonder gracieus uitzien. Een der allerbeste nieuwigheden.

Juni-Aug. †**Chrysanthemum maximum W. H. Gabb** p. 10 st. f 3.— p. st. f 0.35

Deze soort bloeit 14 dagen vroeger dan eenige andere.

Coriaria terminalis . . p. 10 st. f 8.—, p. st. f 0.90

Deze plant is in '93 ingevoerd onder den naam van C. nepalensis, maar later bekend als C. terminalis is meer merkwaardig door hare schoone vruchten, dan door de bloemen. Zij groeit 60 cM. hoog en de lange gracieuse een weinig hangende takken dragen aan het uiteinde eene menigte doorschijnend gele bessen, die aan deze plant een bizonder fraai aanzien geven.

Aug.-Sept. **Crinum Powelli**, donker rose p. st. f 0.60

„ „ „ „ **album**, sneeuwwit p. st. f 1.20

„ „ „ „ **intermedium**, licht rose p. st. f 2.25

Deze Crinums zijn ontstaan uit kruising tusschen C. longifolium (Amaryllis longifolia) en C. Moorei. Ze kunnen met succes in den open grond worden gekweekt. De zeldzaam schoone, op Lelies gelijkende bloemen zijn op kolossale stengels gezeten en komen prachtig uit boven de lange glanzend groene bladeren. Des winters moet men ze opnemen of met stroo of bladeren dekken. De planten worden 60 cM. hoog.

Juli-Sept. †**Crocosmia aurea imperialis**, p. 10 st. f 4.50, p. st. f 0.50

De bloemen dezer prachtige nieuwe plant hebben, wat de vorm aangaat, eenige overeenkomst met de Montbretia Crocosmiaeflora. Zij zijn echter aanzienlijk grooter en vurig oranjerood gekleurd. In groote vaasbouquetten maken deze bloemen vooral een zeer schoon effect. Ze groeit 60 cM. hoog.

BLOEITIJD.

Juli-Sept. †**Delphinium grandiflorum fl. pl.** (echt) p. st. f 2.—

Zeer zeldzame soort met zwarte bloemstengels en donker indigoblauwe bloemen. Prachtige snijbloem.

Juli-Oct. †**Delphinium hybr. Beauty of Langport** p. st. f 2.—

„ „ „ „ **Primrose** . „ „ - 2.—

Deze beide nieuwe hybriden, waarvan de eerste zuiver witte en de andere lichtgele bloemen heeft, zijn eerst kort geleden door een Engelschen kweeker in den handel gebracht. Tot dusver vond men onder deze planten alleen kleurennuances van paars, blauw of purper, zoodat ze een groote aanwinst zijn; hoogte 1.20 M.

Juli-Aug. †**Dianthus plumarius Artis** p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Deze prachtige nieuwe Gras-Anjelier werd Augustus '99 te Amsterdam met een Certificaat 1e klasse bekroond.

Zij is buitengewoon rijkbloeiend en de sneeuwwitte bloemen zijn grooter dan die van eenige andere variëteit; zij groeit 30 cM. hoog.

Een der beste nieuwe planten van 1900.

Juni-Juli. †**Dictamnus caucasicus** . . . p. st. f 0.90

Deze variëteit is een belangrijke verbetering van de D. Fraxinella. Zij bereikt een hoogte van 1 M. en de kolossale bloemstengels komen beter boven het blad uit. De bloemen zijn grooter en donkerder van kleur dan de andere.



Erigeron grandiflorus elatior.

Mei-Aug. †**Erigeron grandiflorus elatior**, p. st. f 0.60

Deze nieuwe soort wordt thans voor het eerst aangeboden en onderscheidt zich daardoor, dat zij reeds in Mei begint te bloeien. De stengels bereiken een lengte van 30 à 40 cM. en dragen elk 1—5 schoongevormde zacht lilakleurige straalbloemen. Zeer aanbevelenswaardig als sierplant zoowel als snijbloem.

BLOEITIJD.

Juli-Sept. †**Eryngium Zabelli,** NIEUW! p. st. f 0.90

Kruising tusschen E. alpinum en E. Bourgati, die uitmunt door buitengewone rijkbloeiendheid en prachtige blauwe bloemen en stengels. Hoogte 1 M.

Mei-Aug. †**Geum Heldreichi splendens,** p. 10 st. f 4.—, p. st. f 0.50

Belangrijke verbetering der algemeen bekende G. Heldreichi, met grootere bloemen van het zuiverste oranje. Zeer dankbare plant, die den geheelen zomer bloeit.

Glyceria spectabilis fol. var., p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Deze nieuwe plant behoort tot de Grassen en hare elegante omgebogen bladeren zijn prachtig wit en groen gestreept. Daar de oorspronkelijke soort aan waterkanten groeit, is deze plant zeer aan te bevelen voor aanplantingen langs vijvers, enz. De hoogte is 90 cM.

Mei-Aug. †**Gypsophila repens monstrosa,** p. 10 st. f 4.50, p. st. f 0.50

Met grootere bloemen dan de andere Gypsophila's, bloeit zij ook ruim een maand vroeger en heeft daarbij een uiterst losse groeiwijze, waardoor zij uitmuntend geschikt is voor snijbloemen. Bloeit den geheelen zomer. *Award of Merit, London,* 28 *Aug.* 1900.

Juli-Sept. †**Helenium pumilum magnificum,** p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.35

Een kruising tusschen H. pumilum en H. autumnale superbum. Zij groeit ± 2½ voet hoog en brengt een enorme menigte groote zachtgele bloemen voort, van af Juni tot laat in den herfst.

Juli-Aug. †**Hemerocallis aurantiaca major** p. st. f 0.60

Deze plant werd voor eenige jaren uit Japan ingevoerd. De bloemen zijn zeer groot en hebben een prachtige oranje kleur, en kan deze soort zonder twijfel de schoonste van alle Hemerocallis genoemd worden. Niet ten onrechte werd zij op de plantenkeuring te Amsterdam van 11 Juli '98 met een Certificaat 1e klasse bekroond. Hoogte 80 cM.

Juni-Aug. †**Hemerocallis hybrida Gold Dust,** donkergeel zeer rijkbloeiend, p. 10 st. f 4.50, p. st. f 0.50

„ †**Hemerocallis hybrida Orange Man,** oranjegeel, groote bloem, p. 10 st. f 4.50, p. st. f 0.50

„ †**Hemerocallis hybrida Sovereign,** licht oranjegeel met groote schoon gevormde bloemen met breede bloemblaadjes . p. st. f 1.—

Bovenstaande 3 hybriden worden thans voor het eerst aangeboden. Ze zijn zeer forsch groeiend en worden ongeveer 1 M. hoog. In Juni l.l. werden alle 3 tentoongesteld voor de Vaste Commissie te Amsterdam. Ze werden daar ten zeerste bewonderd. De var. „Sovereign" verwierf een Certificaat 1e klasse en de beide anderen een Getuigschrift van Verdienste.

Maart-April. **Hepatica triloba alba plena,** p. st. f 6.75

Zeer zeldzame dubbele witte variëteit. De bloemen zijn flink groot, goed gevuld en helder wit met een zacht rose weerschijn.

Mei-Juli. †**Heuchera brizoïdes** . . . . p. st. f 0.75

Deze plant brengt stevige bloemstengels voort met fraaie rose bloemen. Zoowel voor sierplant als voor snijbloemen, kan deze plant bizonder worden aanbevolen. Zij groeit 60 cM. hoog.

Mei-Juli. †**Heuchera sanguinea grandiflora** p. st. f 1.50

Prachtige verbetering van de bekende Heuchera sanguinea met veel grootere bloemen van nog fraaier helderder rood. De bloemstengels zijn ook langer en steviger en daar zij gedurende den geheelen zomer telkens nieuwe stengels voortbrengt, kan men haar tot de beste snijbloemen rekenen.



Incarvillea Delavayi.

BLOEITIJD.

Mei-Juni. †**Incarvillea Delavayi** p. 10 st. f 4.— p. st. f 0.45

Deze buitengewoon schoone plant is eerst sedert kort uit China ingevoerd, en dus nog zeer zeldzaam. De stevige, somtijds 1 meter lange forsche bloemstengels komen schoon uit boven het donkergroene loof, en zijn elk voorzien van 4 tot 10 groote karmijnachtig rose bloemen, welke geel en bruin gevlekt zijn en veel aan Gloxinia's doen denken. Zij kan met een lichte bedekking onze strengste winters doorstaan.

Juni. **Iris pallida fol. var.** . . . . . p. st. f 1.20

Nieuwe en zeer zeldzame prachtige goudbontbladerige Iris. — Hoogte 40 cM.

Juli-Oct. †**Montbretia Crocosmiaeflora Germania,** p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.40

Prachtige nieuwe Montbreta, die op verschillende tentoonstellingen bekroond is. Zij is ontstaan door kruising van Crocosmia aurea imperialis met een Montbretia. De sterk vertakte bloemstengels worden ruim 1 M. hoog en dragen een menigte prachtige groote wijdopenstaande bloemen, die dikwijls een middellijn van 9 cM. hebben. De bloemen zijn fraai schitterend scharlakenrood gekleurd met een oranje tint. Zonder twijfel is dit de schoonste van alle Montbretia's en een der fijnste snijbloemen. In het weekblad „Floralia" van 11 Oct. 1901 kwam een uitmuntend geslaagde gekleurde plaat van deze plant voor.

Juni-Juli. **Ostrowskia magnifica** . . . p. stuk f 1.50

Nieuwe en zeldzame plant, behoorende tot de familie der Campanulacaeen, die wel de grootste van deze groep zal zijn. Zij groeit ruim 2 Meter hoog en de prachtige groote zacht lilakleurige bloemen hebben een middellijn van 10—12 centim. Zij is bizonder rijkbloeiend. De plant moet in het vroege voorjaar een weinig tegen vorst worden gedekt en des zomers worden aangebonden, daar de stengels anders omwaaien.

Mei-Aug. **Papaver alpinum,** p. 10 stuks f 3.50, p. stuk f 0.40

Eene nog weinig bekende, zeldzame Papaver. Zij groeit slechts ½ voet hoog en brengt een menigte bloemen voort in de meest verschillende nuancen van wit, rose, rood en geel, die op fijne dunne stengels zijn gezeten. Men kan haar gerust een der schoonse rotsplanten noemen.

Mei-Sept. †**Papaver orientale Hesperia,** p. 10 stuks f 3.50, p. stuk f 0.40

Nieuwe variëteit m. zalmkl. rose bloemen m. groote vlekken

Mei-Sept. †**Papaver orientale Proserpine,** p. 10 stuks f 3.50, p. stuk f 0.40

Nieuw, donkerlila in karmijnrose en helderlila overgaand en met groote zwarte vlekken.

BLOEITIJD.

Mei-Sept. †**Papaver orientale Psyche,** p. 10 stuks f 3.50, p. stuk f 0.40

Nieuw, grootbl., schitterend lichtrose in wit overgaand.


Met bovenstaande prachtige nieuwe soorten worden geheel NIEUWE KLEUREN in deze PAPAVERS aangeboden.

Juni-Juli. †**Polemonium confertum melittum,** p. stuk f 0.60

Nieuwe zeer schoone variëteit, met fijn varenachtig blad en groote buisvormige witte bloemen.

Juli-Sept. **Polygonum Baldschuanicum** p. stuk f 2.00

Deze behoort tot de schoonste, tot nu toe bekende houtachtige klimplanten. Op een goede standplaats ontwikkelt deze plant zulk een groeikracht, dat ze in weinige jaren een groot muurvlak kan bedekken. Krachtige jonge ranken worden soms in één jaar 2 à 4 M. lang. De bladeren hebben een langwerpige hartvorm en een frisch-groene kleur. De witte, soms iets rose-getinte bloemen verschijnen in zulk een menigte, dat het schijnt alsof de plant met een sluier bedekt is.



Scabiosa caucasica Perfecta.

BLOEITIJD.

Juli-Sept. **Rhomneya Coulteri** . . . . p. stuk f 2.—

Deze plant wordt ook wel Californische Papaver genoemd. Zij groeit ± 1 M. hoog en heeft schoone grijsgroene bladeren en groote sneeuwwitte satijnachtige bloemen die een donkere stamper en oranjekleurige meeldraden hebben. De bloemen hebben een bizonder sterke heerlijke rozengeur, zooals men bij geen enkele plant aantreft en bereiken een middellijn van 10—12 cM. Het is goed de planten des winters met een weinig ruigte te bedekken. Plant men ze in de koude kas, zoo zullen ze zeer lang doorbloeien. Een der beste nieuwe invoeringen.

Rubus Xanthocarpus, p. 10 stuks f 4.—, p. stuk f 0.45

Zeldzame uit China ingevoerde plant met gele vruchten, welke een aangenamen wijnachtigen smaak hebben.


Juli-Oct. †**Scabiosa caucasica Perfecta** p. st. f 1.20

Dit is een belangrijke verbetering van de bekende blauwe Scabiosa caucasica, daar de breede bloembladeren, die bij deze laatste alleen als straalbloemen voorkomen, zich bij deze ook midden in de bloem vertoonen, waardoor deze er gevulder uitziet. Hoogte 60 cM.

Juni-Juli. **Spiraea Aruncus chinensis** . p. st. f 2.—

(syn. Astilbe chinensis, Hort angl, Aruncus chinensis, Aruncus sylvester chinensis).

Onlangs uit China ingevoerde prachtige nieuwe, eerst onder den naam van Astilbe chinensis verbreide sierplant, die in groeiwijze het meest overeenkomen met *Spiraea Aruncus.* Zij groeit 90 à 120 cM. hoog en brengt kolossale sterk vertakte bloemstengels voort, die dicht zijn bezet met fijne donker crême-kleurige bloempjes. De bloeiwijze is zeer ijl en los, dewijl de bloemaren zeer dun zijn en aan de uiteinden omgebogen. Van de verschillende Aruncus, Spiraea's en Astilbes is deze een der schoonste, en eerst nadat zij hier gebloeid had, bleek dat zij veel verschilde van Astilbe chinensis en een variëteit bleek te zijn van de bekende Spiraea Aruncus.



Spiraea Aruncus chinensis.



Spiraea Aruncus var. Kneiffi.

BLOEITIJD.

Juli-Sept. †**Spiraea Aruncus var. Kneiffi**, p. st. f 1.—

Deze variëteit is zeer onderscheiden van alle andere en een der meest aanbevelenswaardige. De groeiwijze is lager dan die van de gewone Spiraea Aruncus. Zij wordt niet hooger dan 30—40 cM. en het blad is bizonder fijn en sierlijk ingesneden, waardoor dit zich uitstekend leent om te snijden, evenals de prachtige witte bloemtrossen.

Mei-Juni. †**Trollius jap. Excelsior.**

p. 10 st. f 4.50, p. st. f 0.50

Deze nieuwe variëteit is een belangrijke verbetering van de bekende T. japonicus fl. pl. De bloemen zijn veel grooter, goed gevuld en donkerder van kleur. Door hare losse stengels, haren grooten rijkdom van bloemen gedurende bijna den geheelen zomer en door de fraaie donker oranje kleur harer bloemen kan men haar gerust onder de allerschoonste snijbloemen rangschikken.

Juni. †**Viola cuculata grandiflora,**

p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.35

Deze plant is bizonder rijkbloeiend, bloeit ongeveer in het begin van Juni, wanneer de Viola odorata-soorten hebben uitgebloeid; hoogte 20 cM.

doorbloeiend. †**Viola odorata Kaiser Wilhelm,**


p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Deze variëteit werd voor een paar jaar in den handel gebracht. De bloemen zijn licht blauw en bizonder groot; hoogte 20 cM.

doorbloeiend. †**Viola odorata La France,**

p. 10 st. f 3.50, p. st. f 0.40

Prachtige nieuwe variëteit, die verleden jaar voor het eerst door een Franschen kweeker is aangeboden en in de tuinbouwwereld veel opzien heeft verwekt, daar men haar zonder twijfel het beste doorbloeiende viooltje kan noemen, dat zich ook zeer gemakkelijk laat vervroegen. De bloemen bereiken een grootte van 3½ à 4 cM. middellijn; de bloembladeren zijn eenigszins gebogen en violetblauw gekleurd met een metalen glans. Ze zijn op lange stevige stengels gezeten en komen flink boven de bladeren uit; hoogte 20 cM.



Viola odorata La France.

Algemeene Collectie van Vaste Planten en Rotsplanten.

Om de keuze der soorten gemakkelijker te maken heb ik bij elke plant den bloeitijd benevens de hoogte in cM. aangegeven. De soorten welke met † zijn aangeduid, zijn bijzonder geschikt tot het maken van bouquetten; die met M gemerkt, verdienen aanbeveling voor randen of mozaïëkvakken.



Acanthus.

BLOEITIJD.

Juni-Aug. **Acanthus latifolius** (150 cM.) *zie afbeelding,* p. st. f 0.20

Prachtige decoratieplant met groote bladeren en lange lichtrose bloemaren. Zij vereischt eene lichte bedekking van droog blad gedurende de wintermaanden. Als gazonplant zeer aan te bevelen.

*m***Acaena Buchanini** . . p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.40

Schoon fijnbladerig, groenblijvend, zodenvormend plantje, uit Nieuw-Zeeland ingevoerd, kruipt dicht over den grond en is zeer geschikt voor het bekleeden van rotspartijen.

Acantholinum venustum, *zie nieuwigheden.*

Juni-Aug. *m***Achillea argentea** (20 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Een lief plantje met zilvergrijs blad, waarvan de randen schoon gekruld zijn, met groote zuiverwitte bloemhoofdjes.

Juni-Aug. **Achillea Eupatoria** (120 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Met groote gele bloemtrossen.

Juni-Aug. †**Achillea mongolica** (30 cM.) p. 10 st. f 1.75, p. st. f 0.20

Schoone soort met meer gedrongene groeiwijze en prachtige groote zuiverwitte enkele bloemen op losse lange stengels.

Juli-Sept. †**Achillea Ptarmica fl. pl.** (75 cM.) p. 10 st. f 0.60, p. st. f 0.10

Deze plant met bladeren als de dragon brengt tallooze stevige bloemstengels voort met sneeuwwitte dubbele bloempjes; onmisbaar voor bouquetten.

Juli-Sept. †**Achillea Ptarmica grandifl. fl. pl.** (75 cM.) p. 10 st. f 0.60, p. st. f 0.10

Eene variëteit der voorgaande met grootere prachtige witte bloemen.

Mei-Juli. *m***Achillea rupestris** (15 cM.) p. 10 st. f 3.50, p. st. f 0.40

Dit plantje is een van de schoonste laaggroeiende Alpen-Achillea's. Het heeft een weelderige groei van fijne altijd groene blaadjes waarboven bloemen prijken van het zuiverste wit.

BLOEITIJD.

Juni-Aug. †**Achillea serrata fl. pl.** (75 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Deze soort gelijkt veel op de Achillea Ptarmica fl. pl. maar onderscheidt zich van deze hierdoor, dat de bloemen niet zoo groot zijn en van nog zuiverder kleur, terwijl zij ook vroeger bloeit.

Mei-Oct. **Achillea tomentosa** (15 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Laaggroeiend met donkergele bloemen; bloeit zeer lang.

Aug.-Oct. **Aconitum autumnale** (90 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Herfst-Aconit met prachtige zwartblauwe bloemen.

Aconitum Fisheri, *zie nieuwigheden.*

Aug.-Oct. **Aconitum Lycoctonum pyrenaicum** (90 cM.) p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15

Deze soort heeft veel overeenkomst met de voorgaande, doch de bloemen zijn zwavelgeel.



Aconitum Napellus.

Juni-Aug. **Aconitum Napellus** (90 cM.) p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15

" " " **album** (90 cM.) " " - 0.25

Bovenstaande beide schoone sierplanten hebben geheel dezelfde groeiwijze, de bloemen der eerste zijn helderblauw, die der andere wit. Ze worden ook „Monnikskap" genoemd.

BLOEITIJD.

Mei-Juni. **Actaea spicata fructo albo** (45 cM.)
p. 10 st. f 3.50, p. st. f 0.40

Een aardig plantje, waaraan bundeltjes mooie witte bloemen groeien en in den herfst zuiver witte bessen.

April-Mei. **Adonis pyrenaica** (45 cM.)
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Deze plant heeft veel overeenkomst met *A. vernalis*, maar zij groeit forscher en de bloemen zijn veel groocer.



Adonis vernalis.

April-Mei. **Adonis vernalis** (30 cM.)
p. 10 st. f 0.90, p. st. f 0.12

De bloemen dezer vroegbloeiende plant zijn groot en glanzend geel, zij steken fraai af tegen de fijn ingesneden groene bladeren.

Adonophora Potanini, zie *Nieuwigheden.*

Juli-Sept. **Agapanthns umbellatus**, blauw,
p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15

Juli-Sept. **Agapanthus umbellatus albus**, wit,
p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15

Juli-Sept. **Agapanthus umbellatus fl. pl.**, dubbel blauw,
p. st. f 0.50

Bovenstaande 3 sierplanten hebben lange smalle donkergroene bladeren en zeer fraaie bloempluimen. Men plaatst ze veel in kuipen. 's Winters moeten ze op een vorstvrije plaats of in den kouden bak of oranjerie worden bewaard.

Juni-Aug. **Agrostemma hybrida Walkeri** (45 cM.)
p. st. f 0.20

Deze is de schoonste van alle overblijvende Agrostemma's. De bladeren zijn zeer schoon zilverwit, en de bloemen hebben een schitterende rozeroode kleur.

Ajuga metallica crispa, zie *Nieuwigheden.*

m **Ajuga reptans atro-purpurea**,
p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15

m **Ajuga reptans fol. arg. var.**,
p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15

Deze beide laaggroeiende bladplanten zijn zeer geschikt voor blijvende mozaïekvakken. De bladeren der eerste zijn donkerbruin, die der andere zilverbont.

Juli-Sept. †**Alstroemeria aurantiaca**, (75 cM.)
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Een in 't oog loopende plant, met schitterende oranje bloemen; zeer geschikt voor snijbloemen.

Juli-Aug. **Anchusa Barlieri fol. var.** (60 cM.)
per stuk f 0.60

Schoone bontbladerige plant; zeer zeldzaam.

ANEMONE JAPONICA.

Onder de najaarsbloeiers kunnen de Herfst-Anemonen zonder twijfel tot de schoonste planten worden gerekend. Zij groeien in bijna elken grond en brengen een menigte bloemen voort op een tijdstip, dat er anders buiten niet veel bloemen zijn. De stevige groote bloemen, die van de meeste soorten wit van kleur zijn, zijn goed bestand tegen koud en guur weer en zelfs eenige nachtvorsten schaden haar niet. Wanneer men een zacht najaar heeft, kan men dikwijls nog in November bloemen van deze schoone planten snijden.

Anemone jap. Beauté parfaite, *zie nieuwigheden.*

BLOEITIJD.

Sept.-Nov. **Anemone japonica Collerette**, (75 cM.)
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Middelmatige bloemen, volmaakt van vorm, met regelmatige bloembladeren, witter, meer dubbel en meer dakpansgewijs dan de Coupe d' Argent. De meeldraden zijn geel.


Sept.-Nov. **Anemone japonica Coupe d'Argent**, (75 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Forsche, rechtopgaande struiken, met eene menigte groote bloemen, welker kleur varieert tusschen crême en zuiverwit.

Sept.-Nov. **Anemone japonica Couronne virginale**
(75 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.20

Bloemen groot gevormd uit 4 rijen bloembladeren; vorm prachtig. De kleur is wit met een lichtrose tint.

Anemone jap. elegantissima, *zie nieuwigheden.*



Anemone japonica Honorine Jobert.

Sept.-Nov. †**Anemone japonica Honorine Jobert**,
(60 cM.) p. 10 st. f 0.80, p. st. f 0.10

Witte Japansche Anemoon. Zeer losse en elegante groeiwijze. De prachtige helderwitte bloemen zijn onschatbaar voor het maken van bouquetten in een tijd van het jaar, dat de bloemen schaars zijn. De bloemen hebben een doorsnede van 4 cM.

Anemone japonica Königin Charlotte, *zie nieuwigheden.*

Sept.-Nov. †**Anemone japonica Lady Ardilaun**,
(60 cM.) p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15

Schoone variëteit met grootere bloemen.

BLOEITIJD

Sept.-Nov. †**Anemone japonica Lord Ardilaun,** (60 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

De bloemen dezer verscheidenheid zijn groot, stevig en halfdubbel, van binnen sneeuwwit en aan de buitenzijde violetachtig. Zij bloeit rijk, heeft eene gedrongene groeiwijze en donkergroene bladeren.

Anemone japonica Mont Rose, *zie Nieuwigheden.*

Sept.-Nov. †**Anemone japonica rosea,** (60 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Type soort, waaruit de voorgaande verscheidenheden alle zijn ontstaan met rose bloemen.

Sept.-Nov. †**Anemone japonica rosea superba,** (75 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze soort is eene verbetering van de An. jap. rosea; hare bloemen zijn grooter, schooner gevormd en staan op steviger bloemstengels.

Sept.-Nov. †**Anemone japonica rubra** (60 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Een schoone variëteit met roode bloemen.

Sept.-Nov. †**Anemone japonica Vase d'Argent** (60 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Deze soort heeft een eenigszins gedrongen groeiwijze. Ze heeft groote, bijna gevulde bloemen, zilverachtig wit met een rose achterkant.

Sept.-Nov. †**Anemone japonica Whirlwind** (60 cM.) p. 10 st. f 0.80, p. st. f 0.10

Deze verscheidenheid werd uit Engeland ingevoerd, en kenmerkt zich door groote zuiverwitte ingesneden bloemen, die eenigszins gedraaid zijn.



Anemone nemorosa fl. pl.

April-Mei. **Anemone nemorosa fl. pl.** (15 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Dit lief plantje, met groote witte bloemen groeit zeer goed op een beschaduwde standplaats.

April-Mei. **Anemone nemorosa coerulea** (15 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Prachtige grootbloemige voorjaars-Anemoon, met helder lilakleurige bloemen.

Mei-Juni. **Anemone palmata alba** (15 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Evenals de voorgaande slaagt deze Anemone het best op een beschaduwde standplaats en in lichten boschgrond. De schoone witte bloemen maken boven de niervormige bladeren een schoon effect.

BLOEITIJD.

Mei-Juni. **Anemone patens Nuttaliana** (30 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Uit Colorado ingevoerde Anemoon met groote zacht lavendelblauwe bloemen.

Maart-Mei. **Anemone Pulsatilla** (15 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

De groote blauwe bloemen verschijnen reeds vóór de bladeren.

Anemone Pulsatilla alba, *zie nieuwigheden.*

Mei-Juni. **Anemone sylvestris** (45 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Grootbloemige witte Anemoon met lange stevige stengels.

Mei-Juni. †**Anemone sylvestris fl. pl.** (45 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze draagt op lange stengels prachtige schitterend witte bloemen en levert in een tijd, dat er nog niet veel bloemen zijn, een prachtig materiëel voor het maken van bouquetten.

*m***Antennaria tomentosa candida,** p. 100 st. f 6.—, p. 10 st. f 0.70, p. st. f 0.10

Kruipend plantje met glanzend wit blad, dat vooral voor mozaïekvakken een schoon effect maakt. De bloemen zijn zeer onaanzienlijk en worden meestal verwijderd. Voor randen en rotspartijen kan deze plant niet genoeg worden aanbevolen, daar zij binnen korten tijd den grond geheel bedekt.

Mei-Nov. †**Anthemis Kelwayi** (45 cM.) p. 10 st. f 1.50 p. st. f 0.20

Dit is eene in Engeland van de Anthemis tinctoria gewonnen grootbloemige variëteit. 't Is eene groote geelbloeiende Marguerite. Zij bloeit van Mei tot dat het begint te vriezen en is een der beste langstelige snijbloemen.

Mei-Juni. †**Anthericum Liliastrum major** (30 cM.) p. 10 st. f 0.80, p. st. f 0.10

De prachtige zuiver witte bloemen dezer plant doen veel denken aan die der bekende witte Lelies. Zij groeit het best in een eenigszins zandigen humusrijken grond.

Mei-Juli. †**Aquilegia hybriden** (60 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

De Aquilegia's kunnen tot de schoonste voorjaarsbloemen gerekend worden. Zij komen in verschillende kleurennuances voor.

Juni-Aug. †**Aquilegia nivea grandiflora** (60 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Zooals de naam aanduidt, is de bloem dezer soort sneeuwwit; zij bloeit iets later dan de andere Aquilegia-soorten.

April-Mei. †**Arabis alpina** (15 cM.) p. 10 st. f 0.80, p. st. f 0.10

Lief alpenplantje met fraaie witte bloemen.

April-Mei. †*m***Arabis alpina fol. var.** (15 cM.) p. 100 st. f 10.—, p. 10 st. f 1.25, p. st. f 0.15

Zeer schoone bontbladerige variëteit, die met haar fraaie witte bloemen boven de zilverbonte bladeren een zeer schoon effect maakt en zelfs de droogste standplaats voor lief neemt. Zij is eene der vroegst bloeiende vaste planten. Onmisbaar voor Rotspartijen.

April-Mei. **Arabis alpina nana compacta grandiflora** (15 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze variëteit onderscheidt zich door een lage, gedrongen groeiwijze en de zeer groote sneeuwwitte bloemen. Ze bloeit zeer vroeg en is bijzonder geschikt voor mozaïekvakken en perken.

Arabis alpina fl. pl. *Zie Nieuwigheden.*

BLOEITIJD.

April-Mei. *m***Arabis Androsace** (15 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Mosachtige verscheidenheid met fraaie lilabloemen. Zeer schoon rotsplantje.

Aralia Cashmeriana, *zie Gazonplanten.*

Mei-Juni. *m***Arenaria caespitosa** (kruipend) p. 10 st. f 0.80, p. st. f 0.10

Lief geelachtig groen zodenvormend plantje, dat gedurende den geheelen zomer bloeit met kleine witte bloempjes.

Mei-Juni. *m***Arenaria purpurascens** (kruipend) p. st. f 0.30

Eigenaardige soort met roodachtig blad de bladeren, zijn grooter dan die der voorgaande.

Juni-Juli. *m***Armeria alpina** (15 cM.) p. 10 st. f 0.80, p. st. f 0.10

Alpenplantje met roode bloemhoofdjes welke op stevige stengels zijn gezeten. Dichte zoden vormend, kan het zeer goed voor randen worden gebruikt.

Mei-Sept. †**Arnebia echioides** (20 cM.) . p. st. f 0.60

Zeer schoone lang achtereenbloeiende Vaste Plant. De helder geel gekleurde kelkvormige bloemen hebben de eigenaardigheid, dat zij op de slippen der bloemkroon bij het ontluiken donkbruine vlekken vertoonen, die later verdwijnen.

Arrhenaterum bulbosum fol. var., *zie Nieuwigheden.*

Aug.-Sept. **Asclepias incarnata** (75 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

De bloemen van deze plant zitten in schermen bijeen en hebben een donkerrozeroode kleur.

ASTERS.

Daar er tegenwoordig steeds meer soorten Asters in den handel komen, heb ik ze verdeeld in drie groepen.

De Voorjaars-Asters bloeien van Mei—Juli, de Zomer-Asters van Juli—September, de Herfst-Asters van September—November.

I. Voorjaars-Asters.

†**Aster alpinus** (20 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Van alle Asters is deze een der laagst groeiende. Zij bloeit zeer rijk met helderblauwe bloemen met een geel hart. Zeer geschikt voor rotspartijen en lage groepen.

†**Aster alpinus albus** (20 cM,) p. 10 st. f 1.—. p. st. f 0.15

Evenals de voorgaande, maar met zuiver witte bloemen.

†**Aster alpinus ruber** (20 cM.) p. 10 st. f 3.50, p. st. f 0.40

Met schoone rozenroode bloemen.

†**Aster alpinus superbus** (20 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze soort heeft bloemen van middelmatige grootte, is zeer rijkbloeiend en zeer geschikt voor snijbloemen.

Aster Andersoni (30 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Deze soort is uit N.-Amerika ingevoerd en kenmerkt zich door hare bizondere groeiwijze. Uit de dichte, ronde bosschen van smalle lancetvormige bladeren komen op lange stengels de witte, matblauwe bloemen te voorschijn.

Aster Fremonti (40 cM.) p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.35

Prachtige nog wenig bekende voorjaarsaster met groote helder lilakleurige bloemen.

Aster perigrinus (40 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Zeer schoone vroegbloeiende soort met groote dof lilakleurige bloemen.

II. Zomer-Asters.

†**Aster Amelloides** (45 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Een der vroegste Asters met schoone blauwe bloemen.

†**Aster Amellus bessarabicus** (50 cM.) p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15

De donker blauwe bloemen versieren deze plant met groote, prachtige trossen.

†**Aster Amellus elegans** (50 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze bloeit zeer rijk met schoone indigo-blauwe bloemen.

III. Herfst-Asters.

†**Aster acris** (45 cM.) . p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15

Deze Astersoort vormt schoone boschjes die bedekt zijn met kleine lila bloempjes.

†**Aster amethystinus** (90 cM.) p. 10 st. f 1.20. p. st. f 0.15

Hooggroeiende variëteit met matblauwe bloemen.

†**Aster canus** (45 cM.). p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15

Met grijsgroene bladeren en dichte trossen van lila bloemen.

†**Aster cordifolius** (75 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Aan deze plant groeien de zacht-lila bloempjes in zulk een menigte, dat het is alsof zij met een sluier bedekt is.

†**Aster Datschi** (75 cM.) p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.35

Met groote helderwitte bloempjes. Als ze bij het begin van den vorst in de koude kas wordt geplant, bloeit ze tot einde December, mits ze met kluit wordt overgebracht.

†**Aster ericoïdes** (120 cM.) p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15

Rijkbloeiende vollegronds-Aster met tallooze witte bloemhoofdjes met geel hart. Zij begint te bloeien in 't laatst van September, en trots koude en regen bloeit zij lang door.

†**Aster floribundus** (1 M.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Met groote trossen van kleine donkerblauwe bloempjes.

†**Aster grandiflorus** (60 cM.) p. 10 st. f 4.50, p. st. f 0.50

Een der schoonste en grootstbloemige Herfstasters, met opvallend groote, violetblauwe langstelige bloemen.

†**Aster horizontalis „The Prince"** (90 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze plant levert eene groote menigte kleine witte bloempjes in elegante trossen.

†**Aster hybridus argenteus albus** (75 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

De talrijke bloemen zijn zilverwit, met een zacht violette tint.

†**Aster hybridus Collerette blanche** (75 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

De zuiverwitte bloemen staan in zulke dichte trossen bijeen, dat het blad er geheel onder verdwijnt.

†**Aster hybridus Collerette rose** (75 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze rijkbloeiende soort heeft lilarose bloemen en komt in vorm overeen met de vorige.

†**Aster hybridus Diadème** (60 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Met talrijke goedgevormde licht lila-rosekleurige bloemen.

†**Aster hybridus Mad. Cocheux** (30 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Een der laagste herfst-Asters. De bloempjes zijn eerst wit, en worden later, rose-lila, zeer aan te bevelen.

†**Aster hybridus Mr. Peters**, *zie nieuwigheden.*

†**Aster hybridus Perle Lyonnaise** (60 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Met groote lichtblauwe bloemen in dichte trossen vereenigd.

†**Aster hybridus roseus** (45 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Nieuwe gedrongen groeiende Aster met bloemen van het zuiverste rose, zooals men deze kleur bij andere soorten niet aantreft.

†**Aster longifolius formosissimus Mad Saymier**
(90 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Even als de voorg. is deze Aster zeer geschikt zoowel voor tuin-decoratie, als voor bouquetten. De bloemen zijn lilablauw.

Sept.-Nov. †**Aster hybridus Snowflake** (120 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Eene der beste onder de witbloeiende herfst-Asters. De welgevormde, tamelijk groote bloemen zijn van de zuiverste kleur en vertoonen zich in groote menigte.

†**Aster hybridus Toulousain** p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Witte bloem met lila tint.

†**Aster laevigatus** (1 M.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Een der schoonste onder de blauwbloeiende herfst-Asters. Bloemen van hemelsblauwe kleur aan elegante trossen.

†**Aster laevis** (1 M.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Zuivere blauwe kleur.

†**Aster laevis Apollo** (1 M.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25
Eene rijkbloeiende soort met diep lavendelblauwe bloemen.

†**Aster laevis pulcherrimus** (1 M.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Zeer schoone variëteit van de Aster laevis.

†**Aster Maacki** (45 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Zeer groote bloemen van helder blauwe kleur.

†**Aster Novae Angliae** (1 M.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Met groote blauw-violette bloemen.

†**Aster Novae Angliae Melpomene** (1 M.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
De bloemen zijn purperviolet en zeer groot, en hebben een oranje hart.

†**Aster Novae Angliae roseus** (120 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Zeer schoone rose bloemen.

†**Aster Novae Angliae ruber** (1 M.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Prachtige helder-roode kleur.

†**Aster Novae Angliae W. Bowmann** (150 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Dit is de schoonste van de Novae-Angliae, met prachtige schoongevormde bloemen van donkerblauwe kleur.

†**Aster Novi Belgii Archer Hind** (120 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Bloemtrossen van een zacht-blauwe kleur, op rechte stengels.

†**Aster Novi Belgii densus** (1 M.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Schoone losse variëteit, met een zeer groote hoeveelheid bleek-blauwe bloemen.

†**Aster Novi Belgii formosissimus** (120 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
De bloemen van deze soort hebben een diepe lila-rose kleur.

†**Aster Novi Belgii J. Wood** (120 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Extra groote, schoone bloem van het zuiverste wit.

†**Aster Novi Belgii Rob. Parker** (1 M.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Eene soort, die veel gelijkt op de voorgaande, behalve dat de bloemen lavendelblauw zijn.

†**Aster Novi Belgii Top Sawyer** (1 M.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Zeer groote bloemen, matblauw.

†**Aster Novi Belgii White Queen** (1 M.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Evenals de voorgaande, doch zuiver wit.

†**Aster polyphyllus** (120 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Hooggr., rijkbl. soort m. tamelijk gr. zuiver witte bloemen.

†**Aster Reversi** . . . p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Eene donker-violet-kleurige variëteit, zeer rijkbloeiend.

†**Aster Shorti** . . . . p. 10 st. f 1.50. p. st. f 0.20
Deze soort heeft vrij groote lilakleurige bloemen.

†**Aster Tradescantii** (1 M.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25
Deze variëteit heeft kleine, witte bloemen, is zeer sierlijk en gelijkt op de lichtgroene Erica.

†**Aster turbinellus** (1 M.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25
Lange, schoone bloemst. m. zacht blauwe prachtige bloemen.

†**Aster versicolor** (150 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Hooggroeiende, zeer rijkbloeiende Aster met kleine vleeschkleurige bloemen.

†**Aster vimineus** . . . p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Een elegante variëteit met zuiver witte bloemen.

†**Aster virginicus** . . p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25
Deze soort is laag groeiend, met tamelijke groote bloemen van een zuivere, witte kleur.

Herfst-Asters in bovenstaande soorten naar mijne keus
p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 8.50
Het is zeer aan te bevelen de Herfstasters te planten langs opgaand hout of heesterperken of er tusschen in de voorste regels. Niet alleen vervroolijken ze op deze wijze den tuin laat in het najaar, maar leveren dan ook een uitmuntend materiaal voor bouquetten.

Astilbe chinensis, *zie Nieuwigheden.*
„ **hybrida Dr. Cattie**, *zie Nieuwigheden.*
„ „ **H. Witte**, „ „
„ „ **Queen of Holland**, *zie Nieuwigheden.*
„ „ **Washington**, *zie Nieuwigheden.*
„ „ **W. E. Gladstone**, *zie Nieuwigheden.*

BLOEITIJD.

Juli-Sept. †**Astilbe Lemoineï Gerbe d'Argent** (80 cM.)
p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15
Deze plant heeft een zeer weelderige en elegante bladergroei; de bloemen zijn vederachtig, wit met rose tint.

Juli-Sept. †**Astilbe Lemoineï Panache** (80 cM.)
p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15
Dezelfde kleur, maar de vorm van de bloem is losser en niet zoo compact, terwijl de top iets is omgebogen.

Juli-Sept. †**Astilbe Lemoineï Plumet Neigeux** (70 cM.)
p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15
Deze soort is lager dan de voorgaande; de donkergroene bladeren zijn ook niet van zulk een omvang, terwijl de bloemen zuiverder wit zijn.

Juli-Sept. **Astilbe rivularis** (120 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
De bloem gelijkt veel op die van de Spiraea, doch is meer opvallend. Ze groeit het liefst in vochtigen bodem en vereischt geen bijzondere zorg.

BLOEITIJD.

Juli-Sept. **Astilbe Thunbergi** (50 cM.)
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Deze uit Japan ingevoerde soort heeft evenals de voorgaande veel overeenkomst met de Spiraea's en heeft zeer schoone, witte bloempluimen.

Juli-Sept. †**Astilbe Thunbergi major** (*Backhousei*) (120 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Deze groeit veel hooger dan de voorgaande, terwijl de bloemen veel grooter zijn. Prachtige sierplant en snijbloem met losse gebogen stengels.

April-Juni. **Aubriëtia croatica**, p. 10 st. f 1.50, p. st f 0.20

Laaggroeiend kruipend rotsplantje met blauwe bloemen.

April-Juni. †**Aubriëtia deltoidea** (15 cM.)
p. 10 st. f 0.80, p. st. f 0.10

Bloeit zeer vroeg met talrijke lilakleurige bloemtrossen. Een der schoonste Rotsplanten.

April-Juni. †**Aubriëtia graeca** (15 cM.)
p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15

Heeft veel overeenkomst met de vorige, alleen zijn de bladeren en bloemen iets grooter; de laatste hebben eene violetblauwe kleur.

April-Juni. **Aubriëtia Hendersoni** (10 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze variëteit heeft bloemen van eene fluweelachtige, donkerblauwe kleur.

BLOEITIJD.

April-Juni. **Aubriëtia Leichtlini** (15 cM.)
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Van alle Aubriëtia's is deze nieuwe soort zonder twijfel de schoonste en eene verbetering der beide voorgaande. De prachtige bloemen zijn karmijnachtig rose gekleurd.

Mei-Juni. **Baptisia australis** (75 cM.)
p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Eene krachtig groeiende plant met eenigszins vederachtig loof; zij draagt lange trossen van schoone donkerblauwe bloemen; moet bij strenge vorst gedekt worden.

(Doorbloeiend) **BELLIS PERENNIS FL. PL.**

De dubbele Madeliefjes behooren tot de oudst bekende planten en door velen worden ze als te ouderwetsch en te stijf afgekeurd. Daar ze echter zoo dankbaar bloeien, namelijk vroeg in het voorjaar en laat in den herfst, behoorde men er toch meer aandacht aan te schenken. Ook gedijen ze goed in bijna elken niet te droogen grond.

Bellis perennis Brillant (15 cM.)
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Nieuw extra grootbl. madeliefje met schoone roode bloemen.

Bellis perennis fl. pl. rose gepijpt . . p. st. f 0.15

Bellis perennis fl. pl. rozeroode Reuzen, „ „ - 0.15

Bellis perennis Perle von Wehrden (15 cM.)
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Zeer groote en schoone bloemen, rose met wit.



Bocconica japonica (cordata).

Bellis perennis rubra fl. pl.
(15 cM.) p. 10 st. f 0.50, p. st. f 0.10

Dubbel rood madeliefje.

Bellis perennis Sneeuwwitje
(15 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Zuiver witte grootbloemige soort.

Bellis perennis fl. pl. Sneeuwbal
(15 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Dubbel madeliefje met groote dubbele sneeuwwitte bloemen. Bloeit het geheele jaar door.

Bellis perennis fl. pl. Victoria
p. st. f 0.20

Grootbloemig, dubbel wit.

Bellis perennis fl. pl. Westfalia
p. st. f 0.20

Met prachtig gevormde groote rose bl.

BLOEITIJD.

Juni-Juli.. **Betonica superba**
(30 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze vaste plant heeft roodachtig violette bloemen.

Juni-Juli. **Betonica superba alba**
(30 cM.) p. 10 st. f 1.50, p, st. f 0.20

Witte varieëteit der voorgaande.

Aug.-Oct. **Bigelowia graveolens**
(1 M,) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Nieuwe struikachtige plant met lange trossen van fijne goudgele bloempjes.

Juni-Aug. **Bletia hyacinthina**
(30 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Zeer schoone paarsroode, bloeiende Orchideae voor den vollen grond.

Juli-Sept. †**Bocconia jap. (cordata)**
(150 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st, f 0.15

Ongemeen schoone decoratieplant met grijsgr. bladeren, waarboven de sierlijke

stengels met witte bloempluimen zeer schoon uitkomen. Alleen of in een groep van 3 of meer planten bij elkaar in een gazon geplant, maakt deze plant zeer veel effect. Men moet haar des winters met een dun laagje stroo of blad bedekken.

BLOEITIJD.

Juli-Sept. **Bocconica microcarpa** (180 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze variëteit heeft licht rose bloemen; ze onderscheidt zich van de gewone door haar hoogen groei. De bladeren zijn aan de onderkant geheel wit.

Sept.-Nov. **Boussingaultia Baselloides** p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze schoone klimplant groeit zeer snel en is dus aan te bevelen voor waranda's, berceaux, balcons enz. Ze heeft een rijke bladergroei en kleine witte bloempjes die in trossen groeien en een zachte geur verspreiden.

Caltha palustris, zie onder *Waterplanten* en *Nieuwigh.*

Juli-Aug. **Calystegia pubescens fl. pl.** p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Eigenaardige klimmende plant met dubbele roode bloemen.

CAMPANULA'S.

De *Campanula's* of Klokbloemen mogen tot de fraaiste sierplanten worden gerekend. Dit geslacht wordt in de plantenwereld door een bijna onnoemelijk aantal vertegenwoordigd. Ik heb alleen echter die soorten gemeend te moeten aanbieden, die werkelijk voor onze Hollandsche tuinen geschikt zijn.

Juni-Aug. **Campanula azurea** (15 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Laaggroeiende soort, met hemelsblauwe bloemen.

Juni-Aug. †**Campanula Burghalti** (60 cM.) p. 10 st. f 3.50, p. st. f 0.40

Met groote lila bloemen.

Juli-Sept. †**Campanula carpatica**, *Bl. Klokje,* (30 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

De schoone blauwe klokvormige bloemen staan op dunne stengels, waardoor de plant er zeer elegant uitziet.

Juli-Sept. †**Campanula carpatica nivéa** (30 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Zuiverwitte variëteit der voorgaande.

Juni-Aug. **Campanula celtidifolia coelestis** (60 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Heeft veel overeenkomst met grandis; de kleur is iets lichter.

Mei-Juli, **Campanula garganica** p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Allerliefst kruipend plantje, dat in den bloeitijd geheel met helderblauwe bloempjes overdekt is. Voor hangplant in waranda's of bloemstukken en rotspartijen zeer aan te bevelen.

Juli-Sept. **Campanula glomerata alba** } (45 cM.)
„ „ „ „ **dahurica** }
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Beide soorten hebben flinke losse elegante bloemstengels; de eerste met witte de andere met blauwe bloemen.

BLOEITIJD.

Juli-Sept. **Campanula (Platycodon) grandiflora** (45 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Zeer schoone sierplant met groote blauwe bloemen, welke tot laat in den herfst bloeit.

Juli-Sept. **Campanula (Platycodon) grandiflora alba** (45 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Witte verscheidenheid van de voorgaande.

Juli-Sept. **Campanula (Platycodon) grandiflora Mariesi** (20 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze variëteit kenmerkt zich door een zeer gedrongen groeiwijze, terwijl de bloemen grooter zijn dan van C. grandiflora.

Juni-Aug. †**Campanula grandis** (60 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Krachtig groeiende soort met groote blauwe bloemen in lange trossen.

Juli-Aug. **Campanula lactiflora** (50 cM.) p. st. f 0.50

Deze planten komen voor in nuances van licht- en donkerblauw.

Juni-Juli. †**Campanula macrantha** (75 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Een der schoonste Campanula's met groote violetblauwe bloemen. Deze plant heeft bovendien het voordeel dat zij goed in de schaduw groeit, zelfs onder hooge boomen, waar andere bloemen gewoonlijk mislukken.

Juni-Aug. †**Campanula persicifolia fl. albo pl.** (60 cM.) p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.35

Een der schoonste Campanula's met fraaie zuiver witte bloemen, welke in elegante trossen op lange bloemsteelen zijn gezeten en daardoor zeer geschikt voor bouquetten.

Campanula persicifolia Moerheimi, *zie Nieuwigheden.*

Juni-Aug. †**Campanula persicifolia grandiflora alba** (60 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Prachtige variëteit met groote helderwitte klokken. Zij wordt ook Campanula Backhousei genoemd.

Juni-Aug. †**Campanula persicifolia grandiflora coerulea** p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Deze komt geheel overeen met de voorgaande, maar de kleur der groote klokbloemen is helderblauw.

Juli-Sept. **Campanula van Houttei** (60 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Zeer schoone hybride met buitengewoon groote donkerblauwe bloemen.

April-Juni. †**Cardamine pratensis fl. pl.** (30 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Dubbele variëteit der zoo algemeen bekende Pinksterbloem met schoone hemelsblauwe bloemen.

Carex scapósa, *zie Nieuwigheden.*

Juni-Oct. **Carlina acaulis** (15 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Een distelachtige Alpenplant met groote witte bloemen en grove, scherpe bladeren.

Juni-Aug. †**Catananche coerulea fl. pl.** (60 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

De bloemen hebben eenige overeenkomst met de korenbloem en zijn purperblauw gekleurd.

CENTAUREA.

De verschillende soorten van het geslacht *Centaurea*, waartoe ook de bekende wilde korenbloem behoort, munten alle zonder uitzondering uit door bevallige losse bloemen. Zoowel de lagere als de hooggroeiende soorten kunnen tot de dankbaarste vaste planten gerekend worden, zoowel voor sierplanten als voor snijbloemen.

BLOEITIJD.

Juni-Sept. †**Centaurea dealbata** (30 cM.)
p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Deze is een der fraaiste van dit geslacht; de bloemen zijn zeer fijn franjeachtig en levendig rose gekleurd. Bloeit zeer lang.

Juli-Aug. †**Centaurea glastifolia** (150 cM.) p. st. f 0.20

Hooggroeiende sierplant met heldergele franje-achtige bloemen.

Juli-Aug. †**Centaurea macrocephala** (90 cM.)
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Met groote gele kogelvormige bloemen op dikke stijve steelen. Prachtige vreemde decoratieplant.

April-Juli. †**Centaurea montana alba**, wit
„ „ „ „ „ **coerulea**, blauw
„ „ „ „ „ **carnea**, lila
„ „ „ „ „ **Lady Florence Hastings**, wit
(p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20)
„ „ „ „ „ **rosea**, rose
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Deze zijn varieteiten van de overblijvende of alpen-korenbloem. Zij bloeien nagenoeg den geheelen zomer. De laatste is de schoonste; deze heeft meer gevulde bloemen en groeit iets hooger dan de andere, die niet hooger worden dan 30 cM.

Mei-Juli. †**Centaurea ruthenica** (120 cM.)
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Een uit Rusland ingevoerde, hooggroeiende soort. Ze heeft diep ingesneden bladen, en bloemen van een stroo-gele kleur. Het is een der schoonste Centaurea's; gewoonlijk bloeit zij ook nog laat in den herfst. De bloemen zijn op zeer lange, elegante, doch stevige stengels gezeten.

Juni-Aug. **Centranthus ruber** (60 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze plant is zeer sterk en groeit in bijna elken niet te natten grond. Zij bloeit zeer rijk en vraagt weinig zorg. De lichtroode of witte bloemen zijn in trossen bijeen gezeten.

Juni-Juli. **Cephalaria alpina** (2 à 2½ M.)
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Kolossale sierplant met groote, langgesteelde bloemen, die veel met Scabiosa overeenkomt.

Mei-Juni. *m*†**Cerastium tomentosum** (kruipend)
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Zooals de naam dit aanduidt heeft deze plant viltachtige bladeren, die zilverachtig wit zijn en haar zeer geschikt maken voor randen of mozaiekvakken. De fijne bloempjes zijn zuiverwit.

Juli-Oct. †**Chelone barbata** (60 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Met zeer schoone scharlakenroode bloemen, welke eenigszins leeuwenbekachtig zijn gevormd.

Aug.-Oct. †**Chelone glabra alba** (60 cM.)
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

De fraaie witte bloemen zijn aan lange aren dicht aaneen gezeten.

†Zomer-Chrysanthemums.

Sedert eenige jaren zijn de Japansche Chrysanthemums zoo in de mode geraakt, dat men althans in de steden tegenwoordig in het najaar bijna geen huiskamer of serre kan denken, waar deze planten niet zijn vertegenwoordigd. Op kleinere plaatsen is men echter dikwijls niet in de gelegenheid ze te koopen. Voor velen, die toch gaarne deze schoone bloemen wenschen te bezitten is het daarom van belang, dat in de laatste jaren door hybridisatie de vroegbloeiende of Zomer-Chrysanthen zoodanig zijn veredeld, dat vele in vorm en kleur aan de Japansche nabij komen. Het zijn daarbij bizonder dankbare bloeiers; sommige beginnen reeds te bloeien in Mei en bloeien door tot laat in den herfst. Ze vereischen weinig zorg, alleen moeten ze in den winter een weinig met ruigte worden bedekt, of in de koude bak overwinterd. Ook laten ze zich uitstekend gebruiken voor potcultuur. Ik behoef er niet aan toe te voegen, dat het uitmuntende en dankbare snijbloemen zijn. Onderstaande collectie bestaat uit een sortiment van de beste soorten.

p. stuk

Edith Syrath, donkerrose, achterzijde licht, rijkbloeiend . . . . f 0.30

Gustav Grunerwald, een der allerschoonste, bloeit reeds in Juni en bloeit onophoudelijk door tot laat in den herfst; de bloemen zijn deels licht, deels donkerrose. Prachtige snijbloem . . . - 0.50

Harvest Home, rijk bronskleurig met goudgele punten, zeer schoone variëteit . . . . . . - 0.40

Jardin des Plantes, wit / „ „ „ **geel** — beide zijn bekende oudere, maar zeer rijkbloeiende soorten . . . . p. 10 st. f 1.— - 0.15

Mad. C. Desgrange, met schoone witte bloemen en licht geel hart; japansche vorm, prachtige snijbloem . . . . - 0.40

Mad. Desgrange Yellow, gele variëteit van de voorgaande en even schoon als deze . . . - 0.40

Mad. Marie Masse, zacht lilakleurig rijkbloeiend - 0.30

M. A. Herlaut, met roode uiteinden en geel hart - 0.30

Miss Martin, wanneer de bloemen zich eerst openen zijn ze licht rose, maar later worden ze zuiverwit, de buitenste bloembladeren zijn omgekruld - 0.30

Othello, bruin . . . . - 0.15

Piercy's Seedling, geelachtig bruin . . . . . - 0.25

Strathmeath, licht rose . . . . - 0.30

Juli-Oct. †**CHRYSANTHEMUM MAXIMUM** (60 cM.)
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Deze schoone vaste plant heeft oorsprong gegeven aan een groot aantal variëteiten van welke ik de voornaamste hieronder laat volgen. De bloemen hebben, wat vorm en kleur betreft veel overeenkomst met de gewone Margrieten die in 't wild voorkomen, doch hebben een middellijn van omstreeks 10 centim. Zij bloeit zeer rijk en lang, zelfs tot laat in den herfst. Daar de bloemen op zeer lange stengels zijn gezeten, kan men ze ook uitmuntend voor snijbloemen gebruiken.



Chrysanthemum maximum filiferum.

BLOEITIJD.

Juli-Sept. †**Chrysanthemum maximum filiferum** (60 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Door de fijn ingesneden bloembladeren heeft deze een zeer eigenaardig voorkomen. De bloemen houden zich lang goed.

Juli-Oct. †**Chrysanthemum maximum Gräfin Anna** p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.35

De bloemen van deze variëteit zijn niet groot, maar zeer los gevormd en de buitenste bloembladeren spits, zoodat deze een der beste is voor bouquetten.

Juli-Oct. **Chrysanthemum maximum Goliath** p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.35

Zeer grootbloemig met enorme groote en breede bloembl.

Chrysanthemum maximum laciniatum Robinsoni, *zie Nieuwigheden.*

" " **W. H. Gabb,** " "

BLOEITIJD.

Juli-Sept. †**Chrysanthemum maximum „Triumph"** (75 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

De groote, prachtige bloemen zijn van een onberispelijken vorm; ze zijn soms 12 cM. in doorsnede en hebben een helderwitte kleur. De plant wordt hooger dan de gewone Chrysanthemum maximum en kan beter tegen de koude. De afbeelding geeft eenig idee van de schoonheid dezer variëteit.

Sept.-Nov. †**Chrysanthemum (Pyrethrum) uliginosum** (120 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze, in het laatst der herfst nog bloeiende plant, heeft eene groote menigte zuiver witte bloemen. Zeer aan te bevelen voor snijbloemen.

Juli-Sept. †**Cimicifuga racemosa** (120 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Zeer schoone hooggroeiende sierplant met vederachtige witte bloemen.

Juli-Sept. **Clematis coccinea** p. st. f 0.50

Zeer elegante klimplant met vurig karmijnroode bloemen.

Juli-Sept. **Clematis Douglasi** (60 cM.) p. st. f 0.40


Fraaie vaste plant met blauwe bloemtrossen.

April-Mei. †**Convallaria majalis,** *Lelietje der dalen* (15 cM.) Zware pollen p. 10 st. f 3.50, p. st. f 0.40

Jonge planten . . . . p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Dit plantje met welriekende witte bloemen is genoeg bekend om eene beschrijving geheel overbodig te maken.

Juni-Sept. †**Coreopsis grandiflora** (60 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15



Chrysanthemum maximum „Triumph."

Bekende schoone vaste plant. Onder de geel bloeiende planten kan men deze zonder twijfel een der allerschoonste noemen. De bloemen van eene doorschijnende heldere goudgele kleur zijn op stevige, lange, draadvormige, eenigszins gebogen steelen gezeten.

Coriaria terminalis, *zie Nieuwigheden.*

*m***Cotula squalida** . . p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Uit Nieuw-Zeeland ingevoerd zodenvormend plantje met fijne bladeren. Zeer geschikt voor bekleeding van rotspartijen.

BLOEITIJD.

Juli-Aug. **Crambe cordifolia** (2.10 M.) . p. st. f 0.40

Deze plant brengt enorme wijdvertakte bloemstengels voort van meer dan een mans-lengte, met een menigte kleine witte bloemen; zij maakt als alleenstaande plant een verrassend effect.

Crinum Powelli, *zie Nieuwigheden.*

Crocosmia aurea imperialis, *zie Nieuwigheden.*



Cyclamen europeum.

Aug.-Oct. †**Cyclamen europeum** (15 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

De beste van de Cyclamen-soorten voor den vollen grond. Zij bloeit in den herfst en de bloemen zijn van eene violet-roode kleur en komen veel overeen met die van de gewone kas-Cyclamen. Zij vereischt niet veel zorg, doch moet niet te diep geplant worden; des winters moet ze met een weinig blad of eenige dennetakken worden gedekt. Het blad heeft veel overeenkomst met de klimop.

Juni-Juli. †**Cypripedium spectabile** (40 cM.) p. 10 st. f 3.50, p. st. f 0.40

Bizonder schoone vollegronds-Orchidee met groote eigenaardig gevormde bloemen, die wit met helderrose gekleurd zijn. Gewoonlijk zijn 2 bloemen bij elkaar op de lange stevige fraai bebladerde stengels gezeten. Een der schoonste snijbloemen.

Juni-Oct. †**Delphinium Bella donna** (60 cM.) p. st. f 0.50

Deze zeldzaam schoone plant bloeit nagenoeg den geheelen zomer met hemelsblauwe bloemen, die op zeer losse stengels zijn gezeten. Men kan zich bijna geen dankbaarder plant voor snijbloemen denken, reden waarom zij zeer sterk gevraagd wordt.

Delphinium cardinale (1 M.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Hooggroeiende soort met lange bevallige bloemstengels en scharlakenroode bloemen.

Juli-Sept. †**Delphinium cashmerianum** (60 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Deze soort heeft zeer schoon, donker groen, palmachtig blad en groote bleekblauwe bloemen.

Juli-Sept. †**Delphinium cashmerianum album** (60 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Variëteit van de voorgaande met witte bloemen.

Juli-Sept. †**Delphinium formosum** (45 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Bizonder schoone helderblauwe grootbloemige soort, die zeer rijk bloeit.

Delphinium grandiflorum fl. pl., *zie Nieuwigheden.*

†DELPHINIUM HYBRIDUM

(RIDDERSPOREN.)

De overblijvende Riddersporen kunnen tot de schoonste sierplanten worden gerekend. Zij vormen forsche bossige planten met talrijke stevige bloemstengels, die tot 6 voet hoog worden en van onderen tot boven dicht met bloemen zijn bezet. De kleur der bloemen komt het meest voor in nuances van blauw, violet en purper. Toen dus niet lang geleden een witte en een licht gele variëteit in den handel werden gebracht, (zie Nieuwigheden) hebben deze verbazend veel opgang gemaakt.

De afgesneden bloemen van Delphiniums blijven zeer lang frisch en zijn zeer geschikt voor bouquetten en vooral tot het vullen van groote vazen. De bloeitijd is Juli-Aug. maar gewoonlijk bloeien zij door tot in October.

Hybriden in prachtige enkele en dubbele soorten gemengd . . . . . . p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

BLOEITIJD.

Juli-Sept. †**Delphinium nudicaule** (45 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Een dwergachtige soort met schitterend roode bloemen zij maakt in massa een zeer schoon effect.

Juli-Sept. †**Delphinium sinense** (50 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze soort heeft een gedrongen groeiwijze en sierlijke bloemtrossen van helder blauwe kleur.

Juli-Sept. †**Delphinium sinensis flore albo** p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Variëteit van de voorgaande met witte bloemen.

Juli-Oct. †**Delphinium speciosum glabratum** (120 cM.), p. st. f 0.35

Nieuwe soort met prachtige donkerblauwe bloemstengels.

Juli-Sept. †**Delphinium Zalil (sulphureum)** p. st. f 0.80

Eigenaardige zwavelgele soort die sterk vertakte bloemstengels geeft en 120 cM. hoog wordt.

Dianthus alpinus . . . p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.35

Zeer fraaie alpenplant met fijn loof en zeer groote rozeroode bloemen.

Dianthus fimbriatus (8 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Laaggroeiend plantje met witte bloemen.

Dianthus plumarius Artis, *zie Nieuwigheden.*

" " **Marktkönigin** (30 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze soort bloeit 14 dagen vroeger dan Mrs. Sinkins, de bloemen zijn wit, evenals van deze.

Judi-Juli. †**Dianthus plumarius Mrs. Sinkins** (30 cM.) *Dubbele witte grasanjelier.* p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Deze plant met lichtgroene, smalle bladeren en welriekende dubbele witte bloemen, is zoowel geschikt voor randen als tot het maken van bouquetten.

Juni-Juli. †**Dianthus suavis** (30 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Zeer kleine Anjer met helder-lilakleurige bloemen.



Dictamnus Fraxinella.

BLOEITIJD

Juni-Juli. †**Dictamnus Fraxinella**, rood (45 cM.) p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.35

Juni-Juli. † „ **Fraxinella alba**, wit p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.35

Bovenstaande beide planten worden ook wel *Esschenkruid* of *Vuurwerkplant* genoemd. Het blad komt veel overeen met dat van den Esch en zooals de afbeelding doet zien komen de schoone bloemen er flink boven uit. Deze hebben de merkwaardige eigenschap, dat zij een vluchtige olie afscheiden, die ontploft zoodra men er een brandende lucifer bij houdt. Zij verdienen ten volle een plaatsje in onzen bloementuin en bloeien het schoonst wanneer ze een of twee jaar gestaan hebben, zonder te zijn verplant.

Dictamnus caucasicus, *zie Nieuwigheden.*

Mei-Juli. †**Dielytra spectabilis**, *Gebroken hart* (30 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Zoowel de elegante bladeren als de fijne hartvormige losse bloemen zijn van eene fraaie roode kleur en geven de plant een bevallig aanzien.

Sept.-Nov. †**Diplostephium amygdalinum** (120 cM.) (*Boltonia latisquama*) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

De met lancetvormige blauw-groene bladeren bezette bloemstengels, vertakken zich van boven sterk en brengen eene groote menigte schoone witte bloemen voort, die gelijken op herfst-asters. Zeer geschikt voor bouquetten.

Mei-Juni. †**Dodecatheon Jeffrayanum** (45 cM.) p. 10 st. f 4.—, p. st. f 0.45

Deze plant heeft lange, rechte bladeren met hooge bloemstengels waarop groote trossen donker rose bloemen met een geel hart.

Maart-Mei. †**Doronicum caucassicum** (30 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Schoone vroegbloeiende plant met groote oranjegele bloemhoofdjes met donkergeel hart. Is een der eerste voorjaarsbloeiers.

Maart-Aug. †**Doronicum plantagineum excelsum** (*Harpur Crewe*) (90 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

De hoogstgroeiende variëteit, die zeer lang bloeit en een overvloed van schoone goud-gele bloemen voortbrengt. Zij kan zoo wel in de schaduw als in de volle zon gekweekt worden.

Maart-Mei. †**Doronicum magnificum** p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze soort heeft een eenigszins gedrongen groei, doch levert ook zeer schoone bloemen, van zuiver gele kleur.

*m***Dryas Drummondi** . . p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Laaggroeiend alpenplantje met gele bloemen.

BLOEITIJD.

Aug.-Oct. †**Echinacea augustifolia** (90 cM.) p. st. f 0.30

Deze is niet zoo bekend als de volgende soort, maar overtreft die in grootte der bloemen. Het blad is ook langer en smaller.



Echinacea purpurea.

Aug.-Oct. †**Echinacea (Rudbeckia) purpurea** (90 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Hooggroeiende plant. De straalbloemen van deze soort zijn van een purperroode kleur. Zeer schoon en wel aan te bevelen, ook als alleenstaande plant.

Juli-Aug. †**Echinops banaticus** (120 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Hooggroeiende soort, met groote kogelronde bloemhoofdjes, met grijsblauwe bloemen.

Juli-Aug. †**Echinops Ritro** (60 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Zeer eigenaardige distelachtige plant met van stekels voorziene groene bladeren en fraaie hemelblauwe bloemhootdjes. Ook in gazons maakt deze plant een schoon effect. Zij wordt ook wel Kogeldistel genoemd.

Juli-Aug. †**Echinops ruthenicus** (90 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Komt veel overeen met de voorgaande, maar is hooger; de Echinops-soorten worden zeer veel gebruikt voor droge- of Makart-bouquetten.

Juli-Aug. †**Echinops sphaerocephalus giganteus**, *Reuzen-Kogeldistel* ($2^1/_2$ M.) p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.35

De grootste van alle.

EPIMEDIUMS.

Onder de vroegbloeiende planten nemen de *Epimediums* een voorname plaats in. De bloemen doen dikwijls denken aan kleine Orchideeën en komen reeds in April te voorschijn. Ook de bladeren zijn zeer fraai gevormd en kunnen even zoo goed als de bloemen voor bindwerk worden gebruikt. Zij kunnen ook in de schaduw worden geplant en gedijen in bijna elken grond.

Epimedium alpinum (30 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

BLOEITIJD.

April-Juni. †**Epimedium coccineum** (30 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Een alpenplantje met aardige, rood met witte bloemen en schoone bladeren; zeer goed bestand tegen de koude.

Mei-Juli. †**Epimedium macranthum** (30 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Voor het maken van bouquetten is deze plant onmisbaar, daar zoowel de bevallige blaadjes als de fijne melkwltte losse bloemen zich daàr uitmuntend toe leenen.

Mei-Juli. †**Epimedium niveum** (30 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

De bloemen dezer soort zijn zuiverwit en zeer schoon.

Mei-Juli. †**Epimedium sulphureum** (30 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Zeer fraaie soort met sierlijke zwavelgele bloemen.

Juni. **Eremurus himalaicus** (2 M.) . . p. st. f 1.—


Deze zoowel als de beide volgende soorten zijn zeldzaam schoone planten met enorme lange bloemstengels met honderden bloemen. Zij moeten in het najaar worden geplant, maar daar zij vrij zeldzaam zijn, worden in het voorjaar reeds bestellingen aangenomen.

Juni. **Eremurus robustus** (2 M.) rose . . p. st. f 4.—

„ „ „ **Ellwesianus** (2 M.) geel „ „ - 7.50

Juni-Aug. †**Erigeron aurantiacus** (30 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Bloeit rijk met groote helder oranjegele bloemen.



Erigeron Coulteri.

BLOEITIJD.

Juni-Juli. †**Erigeron Coulteri** (45 cM.) p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.35

Deze nieuwe uit N.-Amerika ingevoerde plant heeft veel overeenkomst met Erigeron speciosus, maar de bloemen zijn zuiver wit, zoodat zij een groote aanwinst kan worden genoemd.

Mei-Juli. †**Erigeron Freemonti** (15 cM.) p. st. f 0.50

Prachtige grootbloemige met lila bloemen.

Erigeron grandiflorus elatior, *zie Nieuwigheden.*

Mei-Aug. †**Erigeron purpureus** (30 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Lief plantje, dat gedurende den geheelen zomer bloeit met purperroode bloemen.

Juli-Oct. †**Erigeron salsuginosus** (60 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Licht rose, bijna wit.

Juni-Oct. †**Erigeron spesiosus superbus** (60 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Dit is een der schoonste Erigerons. Zij bloeit verbazend rijk en zonder ophouden tot laat in den herfst. De prachtige lila bloemen met geel hart blijven zeer lang goed. Een der beste Vaste Planten voor perken en voor bouquetten.

Juli-Aug. **Erithrochaete palmatifida** (90 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Zeer decoratieve plant met groote grillig gevormde ingesneden bladeren en groote gele bloemen. Ook als gazonplant zeer aan te bevelen.

Mei-Aug. **Erodium chamaedrioides** . . p. st. f 0.35

Zeer fraai kruipend alpenplantje met fijne witte bloempjes.

Juni-Sept. †**Erodium Manescavi** (30 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Buitengewoon dankbaar bloeiende plant met lange stevige bloemstengels. De bloemen zijn paarsrood en zij bloeit den geheelen zomer tot laat in den herfst.

ERYNGIUMS.

(Edeldistels.)

De eigenaardig gevormde bloeiwijze en de fraaie staalblauwe kleur, die de stengels der meeste soorten aannemen, maken de Edeldistels tot de meest gezochte planten voor vulling van groote vazen. De afgesneden stengels blijven eenige maanden goed, hetgeen slechts van weinige planten kan gezegd worden.

Juli-Aug. †**Eryngium alpinum** (75 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Wel een der schoonste van dit geslacht; de groote, sierlijk gevormde bloemhoofden zijn evenals de bloemstengels van een heldere staalblauwe kleur.

Juni-Juli. †**Eryngium giganteum** (60 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Deze wordt ook Ivoordistel genoemd. In vorm komt zij veel overeen met E. Oliverianum, maar de kleur is prachtig zilverwit.

Juli-Sept. †**Eryngium Oliverianum** (60 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Deze variëteit moet niet verward worden met de Eryngium amethystinum, onder welke naam ze dikwijls verkocht wordt. De Eryngium Oliverianum is een der schoonste der bestaande vaste planten. De kleur is prachtig staalblauw. De bloemen blijven, na afgesneden te zijn eenige weken geheel onveranderd en maken een zeer schoon effect, wanneer er eenigen bij elkaar in een vaas worden geplaatst. Ook zeer geschikt voor Makart-bouquetten. Zie afb. p. 90.

ERYNGIUM (vervolg).



Eryngium Oliverianum.

BLOEITIJD.

Juli-Oct. †**Eryngium planum** (90 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Met kl. helderbl. bloemen, welker stengels ook blauw worden.

Juli-Oct. †**Eryngium planum coelestinum** (90 cM.)
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Belangrijke verbetering der voorgaande met donkerder blauw gekleurde bloemen en stengels. Prachtige snijbloem.

Eryngium Zabelli, *zie Nieuwigheden.*

Juni-Juli. **Euphorbia polycroma** (60 cM.) p. st. f 0.25

Deze plant behoord tot de familie der Wolfsmelk; de bloemtrossen zijn heldergeel, terwijl ook de schutbladen geel gekleurd zijn.

*m***Evonymus radicans fol. var.**
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Zilverbonte kruipende plant met glanzige bladeren, zeer geschikt voor randen en mozaïekvakken.

Festuca glauca (30 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Siergras met fijn blauwgroen blad.

†**Fragaria lucida** (15 cM.) . . . . . p. st. f 0.15

Met glanzend blad en groote witte bloemen.

BLOEITIJD.

Juli-Sept. **Fuchsia americana** (60 cM.)
p. 10 st. f 1.50. p. st. f 0.20

Deze winterharde Fuchsia met karmijnroode bloemen is ook wel een plaatsje in den tuin waard, daar zij zeer lang bloeit.

Aug.-Sept. **Fuchsia Riccartoniana** (60 cM.)
p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.35

Deze uit Amerika ingevoerde soort brengt grootere bloemen voort dan de voorgaande en heeft ook fraai blad.

FUNKIA'S.

Op beschaduwde plaatsen, waar vele planten minder goed groeien, kan men aan deze planten een plaatsje inruimen en men zal er geen spijt van hebben.

De meeste Funkia's worden meer geplant om de ongemeen schoone bladeren, welke in de meest verschillende nuances voorkomen, dan om de lila-achtige klokvormige bloemen, die bij de meeste soorten weinig verschil opleveren. Zij bloeien in Juli-Aug. en worden circa 30 à 50 cM. hoog.

Funkia cucullata medio picta . . . . p. st. f 0.70

Met zeer schoone groote bladeren, welke wit gevlekt zijn.

Funkia Fortuneï . . . . p. st. f 0.75

„ „ **fol. var.** . . . . „ „ - 0.90

Deze beide zijn ongetwijfeld de schoonste van alle Funkia's. De groote stevige bladeren zijn bij de eerste lichtblauw gekleurd en de andere heeft donkergroene vlekken, hetgeen een zeer schoon effect maakt. De bloemen zijn van wit tot lichtblauw.

Funkia glauca, zeegroen blad p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

„ **grandiflora**, grootbloemige
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Prachtige variëteit met groote melkwitte, somtijds 10 cM. lange welriekende bloemen en schitterende lichtgroene bladeren.

„ **japonica gigantea** p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25
Met zeer groote bladeren.

„ **ovata aureo striata** p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Met goudgeel gestreepte bladeren.



Funkia undalata medio-var.

Funkia undalata medio-var p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

De mooiste van de witbonte Funkia's; ze wordt zeer veel gebruikt voor randen en maakt daar ook een bizonder schoon effect. Zeer aan te bevelen.

BLOEITIJD.

Juli-Oct. †**Gaillardia maxima** (75 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

De *Gaillardia's* kunnen tot de schoonste en dankbaarste planten worden gerekend, zoowel door haar langdurigen bloei als door de eindelooze kleurschakeeringen tusschen geel, rood en purper waarin hare prachtige bloemen worden aangetroffen. Voor perken maken zij een uitmuntend effect.

Gaillardia Neudorfer, *zie Nieuwigheden.*

Juni-Oct. †**Gaura Lindheimeri** (90 cM.)
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Deze plant bloeit met losse witte bloemtrossen.



Gentiana acaulis.

Maart-Juni. †**Gentiana acaulis** (15 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

De Gentiaan der Alpen is een der schoonste Vaste Planten. De trechtervormige 5 à 6 cM. lange bloemen hebben een prachtige donkerblauwe kleur De afgesneden bloemen behouden zeer lang hare frischheid. Deze plant slaagt het best in humusrijken, vochtigen doch goed gedraineerden grond.

Juni-Juli. †**Gentiana asclepiadea** (30 cM.)
p. st. f 0.70

Zeer schoone Gentiaan met helderblauwe bloemen.

Juni-Juli. **Geranium nepalense** (30 cM.)
p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Deze plant heeft fraaie roode bloemen.

Juli. **Geranium platypelatum** (60 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Ouderwetsche sierplant met groote paarsche bloemen.

Mei-Aug. **Geranium sanguineum** (20 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Zeer schoone plant, geschikt voor randen en rotspartijen. De bloemen zijn groot en diep rood-purperkleurig; zij bloeit den geheelen zomer.

Mei-Aug. **Geranium sanguineum album** (20 cM.)
p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Deze schoone nieuwe variëteit van de voorgaande heeft prachtige zuiver witte bloemen van een losse, elegante vorm. Ze bloeit den geheelen zomer en is zeer geschikt voor randen en perken. Op 19 Juni 1900 werd zij te Londen bekroond met een Award of Merit.



Gaillardia maxima.

BLOEITIJD.

Juni-Sept. †**Geum atrosanguineum** (50 cM.)
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Deze Geum is de donkerste van haar geslacht, en heeft zeer fraaie goedgevulde donkerroode bloemen.

April-Juni. †**Geum Heldreichi** (45 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Een vrij nieuwe variëteit met heldere oranjebloemen en zeer rijkbloeiend.

Geum Heldreichi splendens, *zie Nieuwigheden.*

Mei-Juni. †**Geum miniatum** (30 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Gelijkt veel op de Geum coccineum maar met grootere oranje bloemen.

Juli-Aug. †**Gillenia trifoliata** (60 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze plant, ook wel ten onrechte *Spiraea* genoemd, heeft zeer losse bloemtuilen met fijne witte franjeachtige bloemen. Prachtig voor bouquetten.

BLOEITIJD.

April-Mei. **Globularia vulgaris** (30 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Een der vroegst bloeiende Alpenplanten m. lichtbl. bloemen.

Glyceria spectabilis fol. var., *zie Nieuwigheden.*

Juli-Sept. **Gnaphalium margaritaceum** (40 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Eigenaardige plant met wollige lichtgrijze bladeren en bloemen, welke laatste veel aan Immortellen doen denken.

Juni-Juli. **Gnaphalium Leontopodium**, *Edelweiss* (15 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Dit is het lieve Alpenplantje dat steeds de aandacht trekt van alle reizigers, die Zwitserland bezoeken, en meestal als een souvenir van hunne reis wordt medegenomen. Het groeit daar op rotsen en berghellingen. De bladeren zoowel als de witte stervormige bloemen zijn geheel wolachtig, en de plant heeft daardoor een zeer eigenaardig aanzien. Op Rotspartijen maakt het een ongemeen schoon effect. Het groeit best in lichten zandgrond met steenen vermengd.



Gnaphalium Leontopodium.

Juni-Juli. †**Gypsophila paniculata**, *Gipskruid* (60 cM.) p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15

De zeer talr. kleine lichtr. bloemen, welke op fijne dunne stengels zijn gezeten, geven aan deze plant een zeer schoon en bevallig aanzien, uitm. voor bouquetten.

Gypsophila repens monstrosa, *zie Nieuwigheden.*

HARPALIUM RIGIDUM.

Deze behoort met zijne variëteiten en evenals de Helianthussoorten, tot de overblijvende Zonnebloemen. Zij verschillen van de eenjarige, door veel eleganter groeiwijze. De bloemen zijn los gevormd en daar ze lange en stevige stengels hebben, kunnen ze voor versiering van vazen bizonder worden aanbevolen.

Juli-Sept. †**Harpalium rigidum** (120 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Sierlijke rijkbloeiende gele overbl. Zonnebloem.

Juli-Sept. †**Harpalium rigidum Miss Mellish** (180 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze verscheidenheid onderscheidt zich van de voorgaande door grootere en half dubbele bloemen, die op de wijze der Cactus-Dahlia's eenigszins omgebogen zijn.

Juni-Aug. †**Harpalium rigidum praecox** (120 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Vroeger bloeiende soort, iets kleiner dan de voorgaande, doch dezelfde kleur van bloemen. Evenals de vorige zeer geschikt voor snijbloemen.

BLOEITIJD.

Aug.-Oct. †**Harpalium rigidum semiplenum** (120 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

De laatstbloeiende soort met iets minder gevulde bloemen, die heldergeel zijn.

Juni-Aug. †**Hedysarum multijugum** (60 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Sterk vertakt heesterachtig gewas met zeer schoone roode vlinderachtige bloemen; bloeit rijk en lang.

Aug.-Nov. **Helenium autumnale superbum** (240 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze plant van reusachtige grootte heeft prachtige goudgele bloemen, die een diameter hebben van 3 à 4 cM. De stengels verdeelen zich ongeveer 1 M. boven den grond in vele vertakkingen aan welker uiteinden de bloemen zich vertoonen, zoodat de geheele plant uit de verte het aanzien heeft van een reusachtig bouquet.



Helenium Bigelowi.

Juli-Sept. †**Helenium Bigelowi** (75 cM.) p. 10 st! f 1.20, p. st. f 0.15

Deze uit Noord-Amerika ingevoerde plant bloeit in een tijd dat er weinig langstelige bloemen zijn, n.l. na de Doronicums en vóór de Coreopsis en Harpaliums. Zooals de afbeelding laat zien brengt ze zeer vele goudgele bloemen voort met een donker hart, en van een eleganten vorm.

BLOEITIJD

Juni-Sept. †**Helenium Bolanderi** (60 cM.)
p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15

Deze plant bloeit zeer rijk en heeft op lange rechte bloemstengels schoone gele bloemen met een donker hart. Zeer in het oog vallende plant.

Juni-Sept. †**Helenium grandicephalum striatum** (120 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Met donker-oranjegele bloemen, die onregelmatig karmijnrood gevlekt en gestreept zijn.

Juni-Sept. †**Helenium Hoopesi** (60 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze schoone Helenium heeft veel overeenkomst met H. Bolanderi, maar de bloemen zijn helder oranje.

Juni-Oct. †**Helenium pumilum** (60 cM.)
p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15

Zeer rijkbloeiend met groote zuivergele bloemen. Deze plant bloeit aanhoudend door gedurende het grootste gedeelte van den zomer.

Helenium pimilum magnificum, *zie Nieuwigheden.*

Juni-Aug. *m***Helianthemum amabile fl. pl.** (20 cM.)
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Zeer eigenaardig en schoon rotsplantje, ook wel zomerroosje genoemd. De bladerengroei is compact en gedrongen, terwijl de plant des zomers steeds bedekt is met een onnoemelijk aantal gevulde scharlakenroode bloemen. Zeer geschikt voor rotspartijen en randen.

Juni-Aug. *m***Helianthemum amabile Orange double** (20 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Deze variëteit heeft fraaie helder oranjekleurige bloemen en is overigens gelijk aan de voorgaande.

HELIANTHUS.

Hetzelfde wat hierboven van de Harpaliums is gezegd, geldt ook geheel voor deze klasse der overblijvende Zonnebloemen.

Aug.-Sept. †**Helianthus doronicoides** (120 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Kleinbloemige overblijvende Zonnebloem.

Sept.-Oct, †**Helianthus microcephalus** (120 cM.)
p. 10 et. f 1.50, p. st. f 0.20

Met zwavelgele, kleine elegante bloemen op lange stengels.

Aug.-Sept. †**Helianthus multiflorus Meteor** (150 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze uit Duitschland tot ons gekomen variëteit heeft denzelfden rijkdom van bloemen als de andere Helianthussoorten, en vereenigt bovendien in zich de elegante vorm van de enkele- en de gevuldheid der dubbele soorten.

Aug.-Sept. †**Helianthus multiflorus Soleil d'Or** (150 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Dicht gevulde bloemen met breede bloembladeren. De bloemen zijn van eene schitterende goud-gele kleur en zijn zeer schoon voor groote bouquetten.

Sept.-Oct. †**Helianthus strumosus** (150 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Laatbloeiende variëteit met tamelijk groote goudgele bloemen in bosjes bij elkaar.

Juli-Sept. †**Heliopsis Pitcheriana** (75 cM.)
p. 10 st. f 2.—. p. st. f 0.25

Een losse, elegante plant m. helderg. bl. en een donkerbr. hart.

Juli-Sept. †**Heliopsis scabra major** (90 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Gelijkt veel op de voorg., maar heeft de bloemen iets grooter.

BLOEITIJD.

Nov.-Maart. †**Helleborus niger grandiflorus,** grootbloemige Kerstroos (20 cM.) p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.35

Daar deze plant bloeit op een tijd dat men tevergeefs andere bloemen op den open grond zou zoeken, kan zij als sierplant zoowel als voor snijbloem niet genoeg worden gewaardeerd. De schoone zuiver witte bloemen steken fraai af bij de donkergroene handvormige glanzige bladeren. Opdat de bloemen in den winter niet te veel van de wind en regenvlagen te lijden hebben, geve men deze plant een beschutte en half beschaduwde standplaats. Als men er een oud raam over legt, blijven ze langer mooi. Deze variëteit heeft bizonder groote bloemen.

Juni-Aug. †**Helonias bullata** (20 cM.)
p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Schoone vollegronds-Orchidee met helderrose bloemen.

Hemorecallis aurantiaca major, *zie Nieuwigheden.*

Mei-Juni †**Hemerocallis flava** (60 cM.)
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Schoone sierplant met gele bloemen.

Mei-Juni. †**Hemerocallis fulva fol. var.** (60 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Bontbladerige variëteit, zeer schoon.

Mei-Juni †**Hemerocallis fulva fl. pl. fol. var.** (60 cM.)
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Evenals de voorgaande, maar met schoone dubbele bloemen.

Mei-Juni. †**Hemerocallis hybrida Apricot** (60 cM.)
p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.35

Kruising met oranjekleurige bloemen.

Hemerocallis hybrida Gold Dust, *zie Nieuwigheden.*
„ „ **Orange Man** „ „
„ „ **Sovereign** „ „


Juli-Aug. †**Hemerocallis Middendorfiana** (60 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

De fraaie lelieachtige oranje-gele bloemen zijn zeer schoon voor bouquetten, en maken deze plant, met de lange breede grasachtige bladeren, tot een der schoonste sierplanten.

Febr.-April. **HEPATICA'S** (20 cM.)

De Hepatica's of Leverbloemen moet men een halfbeschaduwde niet te droge standplaats geven. Zij bloeien zeer vroeg en men kan ze onder de schoonste voorjaarsbloemen rangschikken.

Hepatica angulosa grootbl. blauw
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25



Hepatica triloba.

Hepatica triloba blauw p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
„ „ **fl. pleno** dubbel blauw p. st. f 0.70
„ „ **alba** wit p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
„ „ **alba plena**, *zie Nieuwigheden.*
„ „ **rubra** rood p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25
„ „ **rubra plena** dubbel rood
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

BLOEITIJD.
Mei-Juni. †**Hesperis matronalis fl. albo pl.** (90 cM.)
p. 10 st. f 3.50, p. st. f 0.40

Zeer schoone, losse plant met groote zuiver witte dubbele bloemen; zij is ook bekend als „Bloem van Damast."

Mei-Juni. **Heuchera alba** (60 cM.) . . p. st. f 0.20

Nieuw ingevoerde plant welker bloemen eenige overeenkomst hebben met H. sanguinea; zij zijn echter wit.

Heuchera brizoïdes, *zie Nieuwigheden.*
„ **sanguineum grandiflorum**, *zie Nieuwigheden.*


Heuchera sanguinea splendens.

Mei-Juni. †**Heuchera sanguinea splendens** (50 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

De prachtige bloedroode bloemen, welke leeuwenbek-achtig zijn gevormd, zijn op zeer dunne bloemstengels gezeten, en vormen bizonder bevallige ijle bloemtrossen. Voor bouquetten is deze onovertrefbaar.

Juni-Sept. †**Hieracium aurantiacum** (40 cM.)
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Schoone rijkbloeiende alpenplant met levendig gekleurde van goudgeel naar oranje en purper overgaande bloemhoofdjes.

Mei-Juli. †**Hoteia (Spiraea) japonica** (40 cM.)
p. 10 st. f 0.75, p. st. f 0.10

Algemeen bekende plant met zilverwitte prachtige bloemtrossen. Zij wordt evenals de volgende veel gebruikt om in den winter in bloei te worden getrokken.

Mei-Juli. †**Hoteia japonica compacta multiflora** (30 cM.)
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Nieuwe variëteit welke een meer gedrongene groeiwijze heeft. De bloemtrossen zijn ook dichter en zij is rijkbloeiender dan de vorige.

Humulus Lupulus aureus . . . . . . p. st. f 0.30

Nieuwe goudgele hop. Zeer schoone snelgroeiende klimplant, die met hare heldergele bladeren een zeer fraai effect maakt.

BLOEITIJD.
Juli-Oct. †**Hypericum Moserianum** (30 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Met groote gele bloemen, die met hare talrijke goudgele meeldraden een schoon effect maken.

Juli-Sept. **Hypericum Moserianum tricolor** (20 cM.)
p. st. f 0.40

Een zeer schoone plant met groenachtig gele bladeren, die rood omrand zijn. De bloemen zijn geel met scharlakenroode meeldraden. Vereischt eenige bedekking gedurende den winter.

Mei-Juni. †**Iberis Garrexiana** (15 cM.)
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Deze plant is gedurende den bloeitijd met sneeuwwitte dichte bloemschermen geheel overdekt, na het bloeien vertoonen zich tot laat in den herfst nog eenige bloemstengels. Zeer aanbevelenswaardig.

April-Juni. **Iberis sempervirens Little Gem.** (10 cM.)
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Een dwergachtige variëteit die zeer gedrongen en dicht groeit en zeer langen tijd als bedekt is met sneeuwwitte bloemen, zeer schoon voor rotspartijen en perken.

April-Juni. †**Iberis sempervirens superba** (30 cM.)
p. st. f 0.30

Schoone grootbloemige Iberis met zuiverwitte bloemen.

Incarvillea Delavayi, *zie Nieuwigheden.*

Mei-Juni. †**Incarvillea Olgae** (45 cM.) . p. st. f 0.20

Een prachtige, uit Turkestan ingevoerde soort. Ze heeft groote trompetvormige bloemen van een schitterend rose kleur, terwijl de binnenkant rood is.

Juni-Aug. †**Incarvillea variabilis** (45 cM.) p. st. f 0.30

Eene verbetering der voorgaande, daar zij veel rijker bloeit.

Aug.-Oct. **Inula buboninm** (60 cM.) . . p. st. f 0.40

Eigenaardige plant met goudgele bloempjes op kleine doch krachtige stengels. Zij bloeit door tot het begint te vriezen.


Inula ensifolia.

Juli-Aug. **Inula ensifolia** (30 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze soort vormt kogelronde bosjes, die in den bloeitijd met eene groote menigte helder gele bloemen bedekt zijn.

BLOEITIJD.

Mei-Juli. †**Inula glandulosa grandiflora** (60 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

De oranjegele bloemen dezer plant hebben dikwijls een middellijn van meer dan 12 cM. Zij is een der schoonste *Compositae* en hoewel de bloemhoofdjes zoo groot zijn, geven haar de lange en eenigszins gekrulde straalbloemen een zeer bevallig aanzien.

Juni-Aug. †**Inula macrocephala** (1.20 M.)
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Prachtige sierplant met kolossaal groote bladeren. De bloemstengels worden bizonder hoog en dragen aan het uiteinde groote oranjegele bloemen.

April-Juli. †**Iris florentiana alba** (45 cM.)
p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15

Laaggroeiende witte Iris met prachtige bloemen, die dikwijls een zachte geur verspreiden; zij laat zich zeer gemakkelijk kweeken.

†Iris germanica (60 cM,)

De waarde van deze Iris-groep voor onze bloementuinen kan niet licht te hoog worden geschat. Zij zijn verbazend gemakkelijk te kweeken, daar zij na het planten niet de minste zorg vereischen en bijna elke grondsoort voor lief nemen. Op een droge en zonnige standplaats zullen zij echter het rijkst bloeien. Zij bloeien Juni—Juli en de prachtige op orchideeën gelijkende bloemen komen in de meest verschillende kleuren-nuances voor. Vooral als zij een jaar op dezelfde plaats hebben gestaan, bloeien zij bizonder rijk. Om ze den eersten zomer na de planting volop in bloei te hebben, moet men ze reeds in Augustus of September planten ofschoon ze ook wel in 't voorjaar kunnen worden verplant.

Soortenlijst.

	p. 10	p. stuk
Amelie, lichtblaaw	f 1.20	f 0.15
Aurea, goudgeel	- 1.50	- 0.20
Bridesmaid, licht rose	- 1.50	- 0.20
Dona Marie, wit met rose	- 1.20	- 0.15
Emilie, blauw	- 1.50	- 0.20
Flavescens, lichtgeel	- 1.20	- 0.15
Gracchus, citroengeel, purper gestreept	- 1.20	- 0.15
Innocenza, wit met oranje, laat bloeiend	- 1.20	- 0.15
La Perle, licht lila	- 1.20	- 0.15
Maori King, geel met denkerbruin	- 1.50	- 0.20
Mr. Gladstone, wit	- 1.50	- 0.20
Pericles, blauw	- 1.20	- 0.15
Plicata, licht en donker blauw	- 1.20	- 0.15
Queen of May, rose purper	- 1.20	- 0.15
Violacea, violet	- 1.20	- 0.15
Virginalis, wit	- 1.20	- 0.15
10 stuks in 10 soorten naar mijne keus		- 1.20

†Iris Kaempferi (90 cM.)

Prachtige groep, geheel verschillend van de andere soorten. De bloemen zijn grooter en wijduitstaand en in de schoonste kleuren. Deze groeien het best in een niet te drogen grond en zijn daarom zeer aanbevelenswaardig voor beplanting aan den waterkant. Zij bloeien in Juli-Aug.

Soortenlijst.

	p. 10	p. stuk
Type, grootbloemige blauwe Iris	f 1.—	f 0.15
Alex. von Humboldt, zuiver wit	- 1.—	- 0.15
Gabrielle de Nokkei, lichtpaars	- 2.—	- 0.25
Henderson, donkerpaars	- 2.—	- 0.25
Hoopesii, purper met gele streep	- 2.—	- 0.25
Leichtlini, gele bloemen	- 2.—	- 0.25
Saturnus, blauw, licht gestreept	- 2.—	- 0.25
Souvenir, lila	- 2.—	- 0.25
Violacea splendens, grootbloemige, paars met lichte strepen	- 3.—	- 0.40
10 stuks in 10 soorten naar mijne keus		- 1.80
m **Iris pumila**, (20 cM.)	f 1.—	- 0.15

Deze laaggroeiende Iris-soort begint gelijk met de Crocus te bloeien, dus van Maart-Mei. Ze is zeer geschikt voor randen en rotspartijen en laat zich goed op elken bodem kweeken.

Iris pallida fol. var., *zie Nieuwigheden.*

Iris sibirica, in onderstaande soorten
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Iris sibirica, *blauw.*
" " **alba**, wit.
" " **atropurpurea**, donker purperkleurig.
" " **nigrescens**, zwart.
" " **atro-nigrescens**, fluweel-zwart.

Deze IRIS-groep heeft lang grasachtig blad en bloemen welker kleur variëert tusschen diep blauw, violet en wit. Ze bloeit in Juni.

BLOEITIJD

Juni-Sept. †**Lathyrus latifolius albus** ($1^1/_2$ M.)
p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Prachtige klimplant met talrijke, schoone zuiverwitte bloemen (vlinderbloemig.)

Leontopodium alpinum, *zie Gnaphalium.*

Juli-Sept. **Liatris pycnostachia** (90 cM.)
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

De bloemstengel is bezet met zeer schoone, schitterend-purperkleurige bloemen.

Aug.-Sept. **Liatris scariosa** (60 cM.)
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Prachtige donker-purperen bloemen.

Sept. **Liatris spictata** (45 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Fraaie sierplant met lange purperachtig roode bloemaren. Zij gelukt het best in lichten tuingrond en op een halfbeschaduwde standplaats.

Juni-Juli. *m.* **Linum perenne** (45 cM.) *Overblijvend vlas,*
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Zeer schoone hemelsblauwe bloemen. Dit plantje is bijzonder geschikt voor rotspartijen en randen en vereischt een drooge, zonnige standplaats.

Juni-Juli. *m.* **Linum perenne album** (45 cM.)
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Schoone variëteit met helder witte bloemen.

Juni-Aug. **Lithospermum prostratum** (7 cM.)
p. 10 st. f 2.—. p. st. f 0.25

Zeer schoon kruipend plantje. De purperachtig blauwe bloemen komen zeer fraai uit boven de donkergroene bladeren



Lobelia cardinalis.

BLOEITIJD.

Juli-Oct. †**Lobelia cardinalis Queen Victoria** (60 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Prachtige forsche plant met donkebruine bladeren en groote schitterend scharlakenroode bloemen. Zij vereischt in den winter eenige bedekking. Zeer geschikt voor bloemperken.

Juli-Aug. **Lobelia littoralis** . . . . . p. st. f 0.25

De bloemen van dit aardig kruipend plantje zijn rose, maar hebben niet veel te beteekenen. De aardige paarsroode bessen, waarmee het in het najaar overdekt is, maken het echter tot een zeer schoone hangplant. Niet geheel winterhard.

Juni-Juli. †**Lupinus polyphyllus** (100 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Krachtige, hooggroeiende Lupine met lange bloemaren in blauwe tinten.

Juni-Juli †**Lupinus polyphyllus albus** (100 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Zuiver witte variëteit der voorgaande. Zeer geschikt voor snijbloemen.

Juni-Juli. **Lychnis chalcedonica rubra** (80 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Dichte bloemtrossen van schitterend scharlakenroode bloemen.

Juni-Juli. **Lychnis chalcedonica rubra plena** (80 cM.) p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.40

Variëteit der voorgaande met dubbele bloemen; deze vereischt een lichte bedekking in den winter

Juni-Sept. †**Lychnis Flos-cuculi „Ad. Muss"** (30 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Deze dubbele zoogen. „Koekoeksbloem" heeft dichte schoone rozenroode bloemen. Zij bloeit bijna onafgebroken den geheelen zomer en herfst, en in de kas goed in het licht geplaatst, ook des winters. Zeer geschikt voor fijne bouquetten.

Juli-Sept. †**Lychnis vespertina plena** (75 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Schoone plant, die bijna den geheelen zomer bloeit met groote dubbele bloemen.

Juli-Sept. †**Lychnis viscaria alba grandiflora** (50 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Deze soort heeft enkele witte bloemen.

BLOEITIJD.

Juli-Sept. †**Lychnis viscaria splendens plena** (40 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Fraaie dubbele vuurroodde Lychnis, die buitengewoon rijkbloeiend is. Deze plant, die vroeger meer algemeen bekend was onder den naam van „Pekanjer," wordt thans weinig meer in de tuinen aangetroffen. Ze verdient echter alle aanbeveling.

Juli-Aug. **Lythrum roseum superbum** (1 M.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Schoone lange trossen helder roode bloemen; geschikt voor randen of voor den waterkant.

Juni-Oct. †**Malva Alcea** (180 cM.) . . p. st. f 0.20

Zeer decoratieve plant. De enorme bloemstengels zijn zeer fijn en ijl. De fijne bloempjes zijn wijnrood.

Juni-Aug. **Malva moschata alba,** *witte Kaasjesbloem.* (60 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Eene schoone plant met groote witte bloemen, welke in geen enkelen tuin moest ontbreken.

Nov.-April. **Megasea cordifolia** (30 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze plant behoudt hare fraaie hartvormige of ovale lederachtige bladeren ook des winters en bloeit bovendien in een tijd des jaars wanneer men geen andere bloemen ziet. Zeer geschikt voor rotspartijen; groeit ook goed in vochtigen bodem bij watervallen of vijvers.

Nov.-April. **Megasia lingulata Leichtlini,** (50 cM.) p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.35

Deze groeit sterker dan de andere soorten en heeft donkerroode bloemen; zeer schoon.

Mei-Juni. †**Mertensia sibirica** (30 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Prachtige plant, die aan lange bloemstengels eene menigte helder blauwe bloemen voortbrengt, die als trossen afhangen en een zeer schoon effect maken. Zij wordt ook genoemd Lindelofia spectabilis.

Meum athamanticum (25 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

De bladeren dezer plant zijn zeer fijn ingesneden en hebben eene heldergroene kleur, waardoor dezelve onschatbaar zijn voor bouquetten. De bloemen zijn onaanzienlijk.

Juli-Sept. **Modeola geranioides** p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.10

Zeer aardig kruipend plantje met purperroode bloemen. Moet 's winters bedekt worden.

Juni-Juli. **Monarda didyma** (60 cM.) vuurrood p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Deze en navolgende soorten leenen zich zeer goed voor beplanting van randen aan heesterperken; zij vereischen weinig zorg.

Juni-Juli. **Monarda didyma rosea** (60 cM.) rose p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Juli-Aug. „ **fistulosa** (75 cM.) lichtrose p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

„ „ „ **alba** (60 cM.) wit p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

„ „ **Russelliana** (75 cM.) licht violet p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

†MONTBRETIA'S.

De Montbretia's behooren tot de dankbaarste en rijkstbloeiende planten. Uit de rietachtige bladeren verheffen zich de elegant vertakte bloemtrossen, die gevormd zijn uit sterachtige bloempjes van een kleur, die naar dat de soort is, varieert tusschen geel, oranje en donkerrood. Zeer geschikt voor bouquetten.

Het uitplanten der bollen geschiedt in April of Mei; in den herfst moeten ze opgenomen worden om droog en vorstvrij gedurende den winter te worden bewaard. Men kan ze evenwel onder eene goede bedekking buiten doen overwinteren. Ze bloeien van Juli tot November en groeien circa 60 cM. hoog.

Montbretia Crocosmiaeflora p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
Met zeer schoone lange vuurroode met geel gevl. bloemen.

Montbretia aurea . . p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
Met groote stervormige, schitterend oranjekleurige bloemen.

Montbretia Drap d'Or . p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
Goudgele bloemen.

Montbretia Gerbe d'Or p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
Groote gele bloemen.

Montbretia Germania, *zie Nieuwigheden.*

Montbretia Phare . . p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
Van buiten helder oranjerood, van binnen geel.

Montbretia Soleil couchant p. 10 st. f 1.—, p. st f 0.15
Oranjerood.

Montbretia Sulphurea . p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
Zwavelgele bloemen.

Montbretia Potsii . . p. 10 st. f 0.80, p. st. f 0.10
De bloemen dezer variëteit zijn kleiner en donkerrood gekl.

BLOEITIJD

Mei-Juli. †**Myosotis dissityflora „Blue Perfection"** (30 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Schoone, grootbloemige variëteit van de zoogen. „Vergeet-mij-niet, die in het voorjaar bloeit maar in de koude bak moet overwinteren.

Mei-Oct. †**Myosotis palustris Deutscher Stern** (30 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Nieuwe doorbloeiende Vergeet-mij-niet met groote helderblauwe bloemen met wit hart. Het is eene verbetering van „Nixenauge."

Mei-Oct. †**Myosotis palustris Nixenauge** (30 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
Prachtige grootbloemige *Vergeet-mij-niet* met wit hart. die door haar stevige bloemstengels, uitmuntend geschikt is voor bouquetten. Zij kan echter niet tegen een al te droogen grond.

Juni-Oct. **Nepeta Mussini** (40 cM.) p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15
Deze plant bloeit gedurende den geheelen zomer en herfst met eene ontelbare menigte lichtblauwe bloemen.

Juni-Sept. **Nierembergia rivularia** (8 cM.) p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.35
Prachtige kruipplant met groote witte bloemen. Geheel winterhard.

BLOEITIJD.

Juni-Aug. **Oenothera eximea** (15 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30
Nieuwe plant met lichtgroene in een wortelrozet bijeengezeten bladeren, uit welks midden de ± 20 centimeter lange bloemen voortkomen. Deze hebben een middellijn van 10 à 12 centim. en zijn zeer welriekend. De goudgele meeldraden steken fraai uit boven de zuiverwitte welriekende bloemen, en maken haar te meer aantrekkelijk. Het eigenaardige dezer plant is, dat de bloemen zich eerst laat in den middag openen, en zich 's morgens omstreeks 9 uur sluiten.

Indien men de bloemen afsnijdt vóór dat ze ontluiken, ontwikkelen ze zich even fraai en blijven even lang goed als aan de plant zelve.

Juli-Sept. †**Oenothera missouriensis** (30 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30
Deze soort heeft prachtige buitengewone groote, zwavelgele bloemen.

Juli-Sept. **Oenothera speciosa** (60 cM.) p. 10 st. f 5.—, p. st. f 0.60
Bizonder schoone en zeldzame soort met groote witte bloemen, die ook den geheelen dag open blijven. Behalve dat zij ook veel hooger groeit, komen de bloemen veel overeen met *O. eximea.*

Juni-Sept. †**Oenothera Youngi** (50 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Deze variëteit heeft donkergele bloemen, en bloeit zeer rijk.

Maart-Mei. †**Omphalodes verna** (30 cM.) p. 10 st. f 0.80, p. st. f 0.10
Deze plant met hemelsblauwe Vergeet-mij-niet-achtige bloemen, bemint een half beschaduwde standplaats.

Maart-Mei. †**Omphalodes verna alba** (30 cM.) p. 10 st. f 0.80, p. st. f 0.10
Witte variëteit der voorgaande. Beide bloeien ook nog dikwijls in het najaar.

Mei-Sept. **Onosma taurica** (30 cM.) . . p. st. f 0.50
Een der schoonste alpenplanten, uit den Caucasus ingevoerd met welriekende heldergele bloemen, die in neerhangende trossen bijeen zijn gezeten.

Maart-Mei. **Orobus vernus** (30 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
Vroegbloeinde plant met helder karmijnroode vlinderachtige bloemen.



Paeonia sinensis fl. pl.

PAEONIA SINENSIS.

(PIOENROOS.)

Men kan zich als sierplant in den tuin moeilijk een dankbaarder plant denken dan de pioenroos, welke in de laatste jaren door hybridisatie zoodanig is verbeterd, dat men ze in allerlei kleuren aantreft. Opdat ze goed zal groeien en bloeien, moet de grond flink diep worden omgespit en bemest. Hieronder bied ik eene uitgezochte collectie aan, welke uitmunt door prachtige gekleurde, groote bloemen.

NIEUWE ENKELBLOEMIGE VARIËTEITEN.

Clothos, helderrose . . . . p. st. f 0.90
Festiva fragans . . . . „ „ - 1.—

Met prachtige, reusachtige welriekende bloemen, die zachtrose gekleurd zijn; de bloemen bereiken een middellijn van 15 à 20 centim.

Lemon Queen, nieuw, citroengeel . . . p. st. f 2.50
Mikado, nieuw, donkerrood met geel hart „ „ - 1.50
Whittleyi major . . . . „ „ - 1.80


De bloemen dezer variëteit zijn buitengewoon groot en zuiver wit.

DUBBELE VARIEËTEITEN.

p. stuk

Agnes Mary Kelway, lichtrose, van binnen geel f 2.50
Arthur, lichtrose . . . . - 0.60
Augustin Dhour, vleeschkleurig . . . . . . - 0.50
Bar. James de Rotschild, lichtrood, naar buiten in licht rose overgaand . . . . - 0.30
Beauté française . . . . - 0.50
Caroline Allain, donker paarsrood . . . . . - 0.30
Chrysanthemiflora, licht vleeschkleurig, van binnen wit met geel, meeldraden citroengeel; vroegbloeiend . . . . - 0.80
Canarie, wit, van binnen zwavelgeel . . . . - 1.80
De Candolie, rose met zalmkleur, v. binn. rood - 0.50
Etendard du Grand Homme, donker rose . . - 0.30
Festiva, wit, grootbloemig . . . . - 1.—
Hericartiana, rose met zalmkleur . . . . . - 0.50
Labolos, purperrose, van binnen geel getint. . - 2.—
Lara, rose . . . . - 1.20
Louis d,Estrée, lichtrood . . . . - 0.40
Mad. Louise Mere, grootbloemig rood . . . . - 0.60
Monsieur d'Offroy, donkerr. m. lichten weerschijn - 0.40
Natalis, vleeschkleur . . . . - 1.80
Oberlin, karmijnrood . . . . - 0.40
Professeur Morren, licht rose met wit, donker geaderd . . . . - 0.40
Pulcheriana, lichtrood . . . . - 0.45
Queen's Perfection, licht rose met wit en geel - 0.80
Rubicunda alba marginata, rose met zalmkleur en rood . . . . - 0.30
Rosea elegans, vleeschkleur . . . . - 0.40
Thorbecki, lichtrood . . . . - 0.35
Tricolor grandiflora, grootbloemig, vleeschkleur van binnen zalmkleur . . . . - 0.40
Verschaffelti, paarsachtig rood . . . . . . - 0.25
Whittleï, zuiver wit met gele meeldr., vroegbl. - 0.80

10 dubbele Pioenrozen, in 10 soorten, naar mijne keus f **3.50.**



Paeonia temnifolia fl. pl.

DIVERSE ANDERE PIOENROZEN.

Paeonia lobata, *zeldzaam* . . . . . . p. st. f 2.50
„ **officinalis mutabilis,** p. 10 st. f 3.50, „ „ - 0.40

De bloemen dezer pioen zijn eerst rose, welke kleur later overgaat in wit.

Paeonia officinalis rosea pl., dubbel rose p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25
„ „ **rubra pl.,** dubbel rood p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25
„ **tenuifolia fl. pl.** (*zie afbeelding*) p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.35

De bladeren dezer plant zijn zoodanig ingesneden, dat ze op franje gelijken. De schoone donker scharlakenroode bloemen komen prachtig uit boven het fijne loof.

Paeonia Whittmanniana . . . . . . p. st. f 2.50

Zeldzame Pioen met enkele gele bloemen.

Papaver alpinum, *zie Nieuwigheden.*

---

†PAPAVER ORIENTALE.

Bij de tegenwoordig heerschende voorliefde voor groote, langstelige bloemen, worden deze planten zeer terecht meer algemeen gewaardeerd. Voor versiering van groote vazen zijn ze bizonder schoon. Ook maken ze met hare schitterende bloemen, die reeds van verre de aandacht trekken, een zeer fraai effect, wanneer men ze groepsgewijs in het gazon plant of langs den rand van heesterperken. Ze bloeien in Juni—Juli, maar ook gedurende geheelen zomer en in het najaar komen af en toe nog bloemen te voorschijn.

†Papaver orientale Beauty of Livermere (120 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Groote bloedroode bloemen met een zwart hart, staande op sterke hooge bloemstengels.

†Papaver orientale Duke of Teck (75 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Schoone bloemen van eene schitterend scharlakenr. kleur.

†Papaver orientale Grand Mogul (100 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Zeer schoone en groote bloemen van een diep roode kleur.

Papaver orientale Hesperia, *zie Nieuwigheden.*
„ „ **Proserpine** „ „
„ „ **Psyche** „ „
„ „ **Royal Scarlet** (80 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Met groote scharlakenroode bloemen.

†**Papaver orientale Silver Queen** (60 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Deze voor eenige jaren ingevoerde variëteit onderscheidt zich door haar rijkdom van bloemen en haar lagen groei. De bloemen zijn vleeschklenrig, bijna wit, met een schoone zilverachtige tint.

BLOEITIJD
Mei-Aug. †**Papaver nudicaule** (30 cM.)
p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15
Deze plant groeit niet hoog, maar de lange draadvormige kale bloemstengels zijn ongeveer een voet lang. Ik kan deze Papaver als eene der dankbaarste en rijkstbloeiende der Vaste Planten aanbevelen. Hare bloemen zijn zeer elegant gevormd en geel, rood, oranje of wlt gekleurd. Ze zijn bijzonder geschikt voor bouquetten.

Juli-Sept. **Papaver rupifragum** (40 cM.)
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25
Deze soort heeft steenroode bloemen, op lange dunne bloemstengels gezeten.

Pentstemon barbatus, *zie Chelone.*

Juni-Sept. †**Pentstemon ovatus** (60 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Zeer schoone plant met blauwachtige eenigszins klokvormige bloemen.

Juli-Sept. †**Penstemon tubiflorum** (60 cM.)
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25
Een der schoonste van dit geslacht. De klokvormige bloemen zijn roseachtig wit.

Juni-Sept. †**Phlox amoena** (15 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Een der schoonste laagblijvende Phlox.

Mei-Juli. †**Phlox Carolina** (30 cM.) . . p. st. f 0.30
Weinig bekende schoone plant met helderrose bloemen op lange stevige stengels.

†PHLOX DECUSSATA.

(HERFST-SERINGEN.)

Van deze algemeen bekende en gewaardeerde sierplant zal een beschrijving geheel overbodig zijn. Zij beginnen te bloeien in Juli en bloeien den geheelen nazomer door tot somtijds in 't begin van October. De bloemen, welke in de rijkste kleurschakeeringen voorkomen, bewaren, als ze afgesneden zijn, lang hare frischheid, hetgeen haar een onschatbare waarde geeft als snijbloem.

Nieuwere extra grootbloemige soorten.

Hoogte in centimeters.

80. **Bachante,** nieuw grootbloemig, paarsrood met lila gevlamd . . . . . . p. st. f 0.40
90. **Coquelicot** . . . . „ „ - 0.35
Oranje-scharlaken met purperen hart, zeer schoon.

Hoogte in centimeters.

50. **Diadème** . . . . p. st. f 0.20
Zuiver wit, met groote kroonvormige trossen.
70. **Eclaireur** . . . . p. st. f 0.20
Schitterend purperrood, extra grootbloemig.
80. **Etna** . . . . p. st. f 0.30
Vurig oranje-scharlaken, de schitterendst gekleurde.
50. **Flocon de neige** . . . . p. st. f 0.20
Extra grootbloemig, wit, met langwerpige trossen.
50. **Lord Raileigh** . . . . p. st. f 0.50
Zeer bijzonder donker purperblauwe kleur, zooals men bij geen enkele andere soort aantreft, extra grootbl.
50. **Météor** . . . . p. st. f 0,40
Nieuw, van zeer zacht rose, overgaand naar rood, een der allerschoonste.
80. **Pantheon** . . . . p. st. f 0.30
Schitterend donkerrose met losse bloemtrossen; extra grootbloemig, zeer schoon.
100. **Pêcheur d'Islande** . . . . p. st. f 0.50
De stengels dezer soort zijn glanzend zwart, de bladeren zeer donker en de bloemen zalmkleurig scharlakenrood met helder wit oog.

Van elk der 10 bovenstaande extra soorten één stuks, f 3.—.

Extra grootbloemige laaggroeiende soorten,
in vele kleuren gemengd,
p. 100 st. f 10.—. p. 10 st. f 1.50

Algemeene Soortenlijst.

Hieruit zijn eenige minder schoone soorten verwijderd en door betere vervangen.

Hoogte in centimeters.

65. **Amphitrion,** licht met donker lila, extra grootbl.
90. **Antoine Six,** zuiver wit.
80. **Avenir,** rood met donker oog.
70. **Azurea,** purper blauw.
50. **Beatrice,** grootbloemig, karmijn met rose.
100. **Bertier Rendathler,** paarsachtig rose met karmijn.
90. **Boule de feu,** schitterend vuurrood.
100. **Cameron,** wit met lichtrood oog.
50. **Champignol,** wit met lila gevlamd.
80. **Champs Elysée,** donker wijnrood.
50. **Epopée,** karmijn violet.
60. **Eugéne Scott,** porseleinblauw met wit.
110. **Figaro,** paarsachtig rood met karmijn centrum.
100. **Fortuneï,** rose met karmijnrood oog.
90. **Gloire d'Orleans,** bontbladerig wit met rood oog.
70. **Hecla,** wit met violet, grootbloemig.
80. **Henri Martin,** donkerrood.
70. **Héroine,** purperblauw.
85. **Irene,** donker karmijnrood.
90. **James Galloway,** donkerrose.
70. **Jean Bart,** zalmkleur met donker oog.
80. **Jeanne d'Arc,** zuiver wit.
65. **Jenny Grieve,** wit met rood oog.
90. **Louis Gaulet,** zuiver wit.

Hoogte in centimeters.

60. **Mad^{elle} Miolan Carvalho.**
Een der beste witte Phlox, vormt groote trossen van groote sneeuwwitte bloemen.
40. **Marie Kuppenheim**, wit.
80. **Mars**, rose karmijn met donker oog.
50. **Mistral**, rose-lila met wit.
100. **Phileas Fogg**, wit met rood oog.
60. **Proffessor Schliemann**, rose met karmijn oog.
90. **Rachel**, lila met wit.
90. **Salteri**, bontbladerig, wit.
75. **Semiramis**, rose-lila met wit centrum.
50. **Sonnenkind**, donkerrose met licht centrum.
80. **Tourmasse**, schitterend vuurrood.
90. **Victor**, vlammend rood.

Bovenstaande soorten der algemeene soortenlijst per stuk f 0.15.

10 stuks in 10 soorten der algemeene soortenlijst, naar mijne keus, f 1.—.

Phlox Decussata Suffruticosa.

Deze groep bloeit ongeveer den geheelen zomer. De bloemen zijn echter niet zoo groot als de beste van de Decussata-soorten terwijl de bladeren glanzend zijn.

Hoogte in Centimeters.

80. **Arnold Fournier**, wit met klein rood oog.
90. **Belle pyramide**, paarsachtig rood.
90. **Forward**, gelijkt veel op Lady Musgrave, doch kleiner.
70. **Harrisons Seedling**, wit.
70. **James Ross**, paarsrood.
90. **Lady Musgrave**, paars, elk bloemblad wit omzoomd.
50. **Mr. James Young**, grootbloemig wit, met klein paars centrum.
80. **Nettie Stuart**, wit.
70. **Snowdon**, sneeuwwit, de rijkstbloeiende van alle zeer schoon voor perken en bouquetten.

PRIJZEN der Phlox Suffruticosa in de bovenstaande soorten:

per stuk . . . . f 0.20
„ 10 stuks in 5 soorten, naar mijne keus . . - 1.50


BLOEITIJD.

April-Juni. †**Phlox divaricata canadensis** (20 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25
Met schoone blauwachtig witte bloemtrossen op stevige bloemstengels van ongeveer 20 c.M. hoog.

April-Juni. †**Phlox canadensis alba** (20 cM.) p. st. f 0.30
Zeer schoone witte voorjaarsbloeier, die verdient aangeplant te worden naast de bovenstaande bekende blauwe.

Mei-Juni. *m***Phlox frondosa** p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
Met fraaie helderrose bloemen, welke voorzien zijn van een donker oog. Deze kruipende Phlox wordt, evenals de volgende soorten, hoe langer zoo meer gewaardeerd wegens hare schoone bloemen en eigenaardige groeiwijze. Voor rotspartijen zijn zij onmisbaar.

Mei-Juni. †**Phlox ovata** (20 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
Laaggr. Phlox m. ronde gladde bladeren en roode bloemen.



Phlox setacea nivalis.

BLOEITIJD		p. stuk
Mei-Juni.	*m***Phlox setacea atro-purpurea**, rood	f 0.20
„	„ „ „ **lilacina**, lila . . .	- 0.20
„	„ „ „ **nivalis**, wit . . .	- 0.20
„	„ „ „ **Morgenstern**, nieuw wit met roode ster .	- 0.40
„	„ „ „ **pallida**, lichtrood .	- 0.20

De Pholox setacea-soorten zijn zeer schoone kruipende planten, die zeer rijk bloeien en voor randen als rotspartijen zeer zijn aan te bevelen.

Mei-Juni. *m***Phlox stellaria erubescens** . p. st. f 0.20
Nieuwe kruipende soort met fijn blad en rose bloemen.

April-Juni. †**Phlox verna** (15 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
Schoone voorjaars-Phlox. De rozeroode bloemen zijn in het midden rood gekleurd.

Juli-Sept. **Physalis Alkekengi** (30 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
Het eigenaardigste dezer plant is dat zoodra de onaanzienlijke geelachtig witte bloemen uitgebloeid zijn, de kelk zoodanig begint te groeien, dat deze om het zaad heen groeit en een vuurroode kleur aanneemt.

Juli-Sept. **Physalis Franchetti** (50 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
Chineesche Lampionplant, die in bladeren zoowel als bloemen grootere afmetingen heeft dan de voorgaande. De oranjeroode zaadkelk bereikt een middellijn van 5 à 6 centim. Zeer merkwaardige plant.

Juni-Aug. †**Physostegia virginica alba** (75 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25
„ „ † „ **carnea** (75 cM.) „ „ - 0.40
Deze beide planten behooren tot de schoonste vaste planten, ook voor snijbloemen. Ze hebben de eigenaardigheid, dat men de bloemen heen en weer kan doen draaien en een bepaalden stand aannemen. De eerste is wit, de andere licht rose.

Aug.-Oct. †**Pittyrospermum acerinum** (90 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
Schoone decoratieplant met vederachtige witte bloemen. Bloeit laat in den herfst.

Aug.-Oct. **Plumbago Larpentae** (40 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25
Zeer schoone plant, met diep blauwe bloemen, die in dichte bouquetten boven op de stengels prijken. Zij is ingevoerd uit Formosa en is geheel winterhard.

BLOEITIJD.

Mei-Juni. †**Polemonium album** (30 cM.)
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Witte variëteit van de hieronder voorkomende Polemonium Richardsoni.

Mei-Juni. †**Polemonium Richardsoni** (30 cM.)
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Een weinig bekende doch zeer schoone uit Amerika ingevoerde plant. De bloemen hebben een fraaie hemelsblauwe kleur met goudgele meeldraden.

Sept.-Nov. †**Polygonum amplexicaule var. oxyphyllum** (2 M.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Indien men deze plant laat in den herfst ziet, aan elk harer takken met groote roseachtig witte bloemtrossen, zoo zou men haar eerder voor een heester aanzien, dan voor een Vaste Plant, welker bladeren en stengels des winters telkens afsterven. De fijne bloemen leveren in een tijd dat alle bloemen schaars zijn een onschatbaar bouquetmateriaal, en een weinig vorst doet ze nog niet verwelken. Voor gazons is dit eene plant bij uitnemendheid, daar zij ook zonder eenige bedekking overwintert.

Polygonum Baldschuanicum, *zie nieuwigheden.*

„ **Sachalinense** (180 cM.)
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Snelgroeiende plant met een heesterachtig gewas en groote bladeren. Zij laat zich zeer goed gebruiken als dekking en onder boomen.

†POTENTILLA'S (45 cM.)

De Potentilla's kunnen zonder twijfel tot de dankbaarste Vaste Planten worden gerekend. Zij bloeien den geheelen zomer tot laat in den herfst en zijn wat behandeling of grondsoort betreft niet zeer kieskeurig, zoodat dit dus niemand behoeft te weerhouden deze schoone planten aan te schaffen. De afgesneden bloemen laten zich ook uitnemend gebruiken.


Soortenlijst.

Arguta Grandiflora, enkel zwavelgeel.
California, geel.
Formosa, kersrood, rijkbloeiend, enkel.
Purpurea plena, donkerrood.
Perfecta plena, oranje en geel.
Victor Lemoine, vermiljoenrood met geel.
Wm. Rollison, helder vermiljoenrood.

Potentilla's in bovenstaande soorten p. stuk f 0.20
10 „ „ 5 der „ „ . . . - 1.80

Maart-Mei. **Primula acaulis** (15 cM.)
p. 100 st. f 5.—, p. 10 st. f 0.60, p. st. f 0.10

De enkele laaggroeiende *Sleutelbloem* maakt als alleenstaande plant weinig effect, maar voor randen of beplanting van beschaduwde boschkanten kan zij niet genoeg worden aanbevolen, daar zij zoo vroeg en zoo rijk bloeit. De plantjes moeten dan dicht aaneen worden gezet.



Primula acaulis coerulea.

BLOEITIJD

Maart-Mei. **Primula acaulis coerulea** (15 cM.)
p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Deze schoone, blauwe vollegronds-Primula is met veel moeite, na jarenlange proeven gewonnen in het buitenland. De bloemen zijn schoon gevormd en van eene diep blauwe kleur. Ze is zeer rijkbloeiend en kan als een groote aanwinst beschouwd worden.



Primula acaulis plena.

April-Mei. *m***Primula acaulis alba plena**, wit.
„ „ „ **lilacina plena**, lila.
„ „ „ **purpurea** „ rood.
„ „ „ **sulphurea** „ geel.
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Bovenstaande laaggroeiende *Primula's* zijn zeer lieve plantjes met goed gevulde bloemen. Zij bloeien zeer vroeg en rijk en groeien 15 centim. hoog.

April-Mei. *m***Primula acaulis Miss Massey** p. st. f 0.35

Fraaie enkelbloemige variëteit met donker fluweelachtige purperroode bloemen.

BLOEITIJD

April-Mei. **Primula Auricula** (15. cM.)

Luiksche in vele prachtsoorten gemengd.

p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

De Luiksche Aurikels of Beerenooren komen in de meest verschillende kleurennuances voor, zooals donker fluweelbruin, olijfbruin, purper, bloedrood, oranjegeel, amarantrood enz. doch hebben alle een geel of wit oog, terwijl de uiteinden der bloembladeren meestal licht gezoomd zijn.



Primula Cashmeriana.

Maart-Mei. †**Primula Cashmeriana** (30 cM.)


p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15

Deze vroegbl. Primula heeft schoone lichtbl. bloemhoofdjes.

Mei-Juni. †**Primula frondosa** (30 cM.)

p. 10 st. f 3.50, p. st. f 0.40

Zeer rijkbloeiend met helderrose bloemen; de bladeren zijn aan de achterkant wit.



Primula japonica.

Mei-Juni. †**Primula japoncia** (30 cM.)

p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Bloeit met verschill. nuanceeringen tusschen purper en wit.

BLOEITIJD.

April-Mei. †**Primula Munroi** (15 cM.)

p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.35

Ze heeft zeer schoone, zuiverwitte bloemen en houdt van een vochtigen bodem. Geschikt voor rotspartijen.

Juni. †**Primula nivalis** (30 cM.) . . . p. st. f 0.50

Met zuiver witte bloemen.

Maart-Mei. †**Primula officinalis grandiflora** (30 cM.)

p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Deze nieuwe variëteit vindt reeds overal grooten bijval en is voor allerlei doeleinden aan te bevelen, bijzonder voor snijbloemen. De kleur der schoone, welriekende bloemen is helder oranje-geel.

Maart-Mei. †**Primula rosea** (20 cM.)


p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Nieuwe uit het Himalayagebergte ingevoerde plant, waar zij op een hoogte van 3000 meter werd gevonden. De schoone helderrose bloemen hebben een donkergeel hart en zitten aan bloemhoofdjes bijeen.

Maart-Mei. †**Primula rosea grandiflora** (20 cM.)

p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0,25

Verbeterde nieuwe variëteit met grootere bloemen dan de oorspronkelijke voorgaande soort.



Primula Sieboldi grandiflora.

Mei-Juni. †**Primula Sieboldi grandiflora** (30 cM.)

p. 10 st. f 1.60, p. st. f 0.20

Met zeer schoone, groote, roode bloemen en frissche rechtopstaande bladeren. Voor decoratie zoowel als voor bouquetten kan deze plant niet genoeg gewaardeerd worden.

PRIMULA SIEBOLDI

in onderstaande soorten:

Alba Magna, wit.
Arthur, licht rose.
Atlas, helder karmijnrood met wig oog.
Beauty of Sale, wit met rose.
Bruce Finlay, Heliotropenblauw.
Etoile, van buiten rose, van binnen wit.

Laciniata, schitterend rood m. franjeachtige bloembladeren.
Lurley, zalmkleurig met wit.
Maidens Blush, helderrose met vleeschkleur en eenigszins gekrulde bloembladen.
Mrs. Ryder, vleeschkleur.
Nymphe, zuiver wit.
Tragédie, schitterend rood met wit oog.

Per stuk f 0.30, 10 stuks in 10 soorten f 2.50.

BLOEITIJD.
April-Mei. †**Primula viscosa major** (30 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30
Met talrijke zeer fraaie rozeroode bloemen.

Maart-Mei. **Primula veris elatior** (30 cM.) p. 10 st. f 0.60, p. st. f 0.10
Bekende Sleutelbloem, een der vroegste voorjaarsbloemen; zij wordt veel gebruikt voor randen om heesterperken. Ook kan men deze planten zeer goed een plaatsje geven in een perk met struikrozen, mits deze niet te dicht op elkaar zijn geplant. Zij bloeien dan wanneer de rozen nog geheel kaal zijn, terwijl des zomers de rozen haar niet zullen hinderen.

†PYRETHRUMS.

De *Pyrethrums* kunnen zonder twijfel onder de schoonste vaste planten worden gerekend. Ze zijn zeer rijkbloeiend, en wanneer men in Juni zorgdraagt de uitgebloeide bloemstengels af te snijden, zullen de planten bij een goede behandeling niet nalaten in het najaar nogmaals te bloeien.

Soortenlijst.

	p. st
Aphrodite, schoone zuiverwitte	f 0.25
Agnes Mary Kelway, enkel karmijnrose . . .	- 0.20
Carl Vogt, de schoonste en vroegst bloeiende dubbele witte, met bizonder fraai gevormde bloemen; meermalen bekroond	- 0.30
Cleopatra, dubbel geel met wit	- 0.30
James Kelway, enkel, donker fluweelachtig scharlakenrood; zeer schitterende kleur	- 0.30
Jubilee, schitterend vuurrood, enkel	- 0.30
Mad. Meunier, dubbel rose	- 0.25
Princesse Marie, enkel wit	- 0.20
De geheele Collectie van 8 stuks in 8 soorten	- 1.75

BLOEITIJD.
Mei-Juli. **Ramundia pyrenaica** (15 cM.) p. 10 st. f 5.—, p. st. f 0.60
Prachtige rotsplant uit de Pyreneeën met lederachtige donkergroene bladeren; de bloemen zijn violetpurper met een oranje midden. Voor de noordelijke helling van een rotspartij bestaat er geen schooner en dankbaarder plant. Zij verlangt lichten humusachtigen grond.

Mei-Juni. †**Ranunculus aconitifolius fl. pl.** (45 cM.) p. 10 st. f 2. —, p. st. f 0.25
Een der beste vaste planten. Een perk daarvan levert gedurende den bloeitijd een zeer schoon gezicht. De dubbele sneeuwwitte bloemen gelijken op miniatuur Camellia's en zijn onovertrefbaar voor bouquetten, daar de bloemtrossen bovendien een lossen vorm hebben

Mei-Juni. †**Ranunculus acris fl. pl.** (60 cM.) p, 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Met dicht gevulde goudgele bloemen.

BLOEITIJD.
Mei-Juni. **Ranunculus speciosus fl. pl.** (30 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Deze dubbele gele boterbloem met groote bloemen heeft eene gedrongen groeiwijze en is zeer rijkbloeiend.

Rheum, in soorten, zie onder *Gazonplanten.*
Rhomneya Coulteri, *zie Nieuwigheden.*
Rubus sorbifolius, zie onder *Vruchtstruiken.*
„ **xanthocarpus**, zie onder *Nieuwigheden.*

Juni-Aug. †**Rudbeckia laciniata Golden Glow.** *Nieuw!* (180 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
Deze schoone nieuwe decoratieplant werd in Juli '97 te Amsterdam met de hoogste onderscheiding bekroond. De goedgevulde goudgele bloemen zijn op lange stengels gezeten. Voor groote vaasbouquetten zijn ze bizonder geschikt.

Sept.-Oct. †**Rudbeckia nitida „Autumn Glory"** (120 cM.) p. st. f 0.25
Deze is een der schoonste van de Rudbeckia's. Ze heeft prachtige bloemen met eenigszins hangende bloembladeren van een zuivere goudgele kleur. De langstelige bloemen, die in groote menigte de plant versieren, blijven in water 1 à 2 weken goed.

Juli-Oct. †**Rudbeckia Newmanni** (30 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Zeer schoone decoratieve plant met groote stevige heldergele bloemen met zwart hart. De afgesneden bloemen blijven zeer lang goed.

Sept.-Oct. †**Rudbeckia subtomentosa** (90 cM.) p. st. f 0.30
Met enkele gele bloemen. Zeer rijkbloeiend.

Rudbeckia angustifolia, *zie Echinacea.*
„ **purpurea**, „ „

Juli-Oct. †**Salvia patens** (50 cM.) . . . p. st. f 0.25
Bloeit zeer rijk met prachtige helderblauwe bloemen. De wortels moeten even als de Dahlia's worden overwinterd.

Juli-Oct. **Salvia tenori** (50 cM.) . . . p. st. f 0.25
Met licht blauwe bloemen.

April-Mei. **Sanguinaria canadensis** (15 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Vroegbloeiend plantje met witte bloemen, die aan Anemonen doen denken. Zeer geschikt voor boschkanten en half beschaduwde plaatsen.

SAXIFRAGA'S.

Dit geslacht van Rotsplanten levert een talrijk aantal soorten op, welke zoowel aanbevelenswaardig zijn wegens de schoon gevormde bladeren, als de bloemen, welke meest eene witte of rose kleur hebben. Voor beplanting van Rotspartijen zijn ze onmisbaar. De meeste soorten bloeien zeer vroeg in het voorjaar en laten zich uitnemend gebruiken voor snijbloemen. Ze nemen den schraalsten grond voor lief, en een half beschaduwde standplaats.

Saxifraga acanthifolia . p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
„ **altissima** . . „ 10 „ - 1.—, „ „ - 0.15
„ **Andrewsi** . . „ 10 „ - 1.—, „ „ - 0.15
Schoone hybride met 30 cM. hooge bloemstengels en sappig groen blad.

Saxifraga Colvilie . . p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
„ **Cotyledon pyramidalis** (75 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Een der schoonste Saxifraga's. Zij vormt een groote rozet van wit gerande bladeren, waaruit 60 à 70 cM. hooge bloemstengels met tallooze witte bloemen te voorschijn komen. Ook zeer geschikt voor potcultuur.

Saxifraga cuneifolia. . p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
„ **Geum ovalifolia** „ 10 „ - 1.—, „ „ - 0.15
„ **granulata fl. pl.** (20 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Deze knollen vormende soort heeft zeer schoone, helderwitte gevulde bloemen. Uitnemend geschikt voor bouquetten.

Saxifraga Gutheriana . p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
„ **Haworthii** . „ 10 „ - 1.—, „ „ - 0.15
„ **incurvifolia** . „ 10 „ - 1.—, „ „ - 0.15
„ **intermedia** . „ 10 „ - 1.—, „ „ - 0.15
„ **muscosa** . . „ 10 „ - 2.—, „ „ - 0.25
„ **pectinata** . . „ 10 „ - 1.50, „ „ - 0.20
„ **Rhei** (15 cM.) „ 10 „ - 1.50, „ „ - 0.20

Deze soort vormt een dichte, groene massa, die gelijkt op een kussen dat op den grond is uitgespreid en waarboven tamelijk groote rose bloempjes zich verheffen.

Saxifraga Sternbergii . p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
„ **umbrosa fol. var.** *bontbladerig.* p. 10 st. f 1.—, p. st. - 0.15

10 Saxifraga's in 10 soorten naar mijn keus - 1.20
100 „ „ 10 „ „ „ „ - 8.—

BLOEITIJD.

Juni-Oct. †**Scabiosa caucasica** (75 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Gedurende den geheelen zomer tot laat in den herfst bloeit deze heerlijke plant met prachtige groote langstelige hemelsblauwgekleurde bloemen, die door haar fraaien vorm reeds van verre de aandacht trekken. De afgesneden bloemen blijven lang frisch.

Juli-Sept. †**Scabiosa caucasica alba** (60 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Deze nieuwe witte variëteit van de vorige is zonder twijfel een der schoonste snijbloemen.

Scabiosa caucasica Perfecta, *zie Nieuwigheden.*

Juni-Sept. †**Scabiosa gigantea** (180 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

De bloemen dezer hooggroeiende plant hebben denzelfden vorm als die der voorgaande, maar ze zijn zwavelgeel.

Juni-Oct. †**Scabiosa ochroleuca** (60 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

De bloemen dezer soort zijn veel kleiner dan die der vorige, zeer fraai gevormd. Zij bloeit zeer lang.

Sedums en Sempervivums.

Hetgeen van de Saxifraga's gezegd is, geldt grootendeels ook voor deze beide geslachten van Rotsplanten, welke echter meer eigenaardig zijn wegens den bizonderen vorm der bladeren met verschillende nuances van groen, waardoor ze zich, behalve voor Rotspartijen, uitmuntend laten gebruiken voor blijvende mozaïekvakken. Beide behooren tot de familie der Crassulaceën of Vetplanten.

Sedum Anacampseros, met blauwgroen blad p. 10 st. f 1.50. p. st. f 0.20
„ **asiaticum,** schoon grijs blad p. 10 st. f 1.20, p. st. - 0.15
„ **Ewerssii** . . . „ 10 „ - 1.20, „ „ - 0.15
„ **glaucum,** lichtgrijze bladeren p. 10 st. f 1.—, p. st. - 0.15
„ **japonicum macrophyllum,** grootbladerig p. 10 st. f 1.50, p. st. - 0.20
„ **Lydium,** bruinachtig groen blad p. 10 st. f 0.80, p. st. - 0.10
„ **roseum,** met roseachtig blad p. 10 st. f 1.50, p. st. - 0.20

Sedums in vele soorten naar mijne keus p. 100 st. f 6.—, p. 10 st. - 0.80

Sempervivum arachnoïdeum p. 10 st. f 1.—, p. st. - 0.15

Zooals de naam reeds aanduidt, zijn de bladeren van deze soort als met een spinneweb overdekt van fijne witte draden; een der beste voor mozaiekwerk.

Sempervivum Comollii . p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
„ **cornutum** „ 10 „ - 1.—, „ „ - 0.15
„ **Funckii** . „ 10 „ - 0.80, „ „ - 0.10
„ **Powelli,** zeer schoone soort p. 10 st. f 1.—, p. st. - 0.15
„ **Pyrenaicum,** „ 10 „ - 1.50, „ „ - 0.20

De groote bladeren dezer soort zijn donkerrood gekleurd; een der schoonste voor rotspartijen en mozaiekvakken.

Sempervivum Verloti . p. 10 st. f 0.80, p. st. f 0.10

100 Sempervivum's in soorten naar mijne keus f 4.—

BLOEITIJD

Mei-Juni. **Senecio doronicum** (45 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Zeer schoone, tamelijk groote straalbloemen, van een helder oranjegele kleur.

Juli-Aug. †**Shortia galacifolia** (30 cM.) . p. st. f 0.70

Prachtige rotsplant met glanzige bladeren en zeer fijne witte bloemen. Zeldzaam.



Sidalcea candida.

BLOEITIJD.

Juni-Juli. †**Sidalcea candida** (60 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

De fraaie witte bloemen dezer plant zijn aan lange bloemstengels gezeten en maken een mooi effect boven de donkergroene bladeren. De bloemen blijven lang goed; en wanneer men de stengels afsnijdt en in 't water zet, openen zich de knoppen en bloeien nog zeer lang.

Juli-Oct. †**Sidalcea malvaeflora Listeri** (1 M.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20


Fraaie weinig bekende plant met hooge losse bloemstengels. De bloemen zijn groot, elegant en van een schoone satijnachtig rose-kleur. Zeer aan te bevelen.

Juli-Sept. **Silphium perfoliatum** (1.50 M.) p. st. f 0.40

Deze plant met groote gele bloemen heeft de eigenaardigheid, dat de bladeren die twee aan twee ter weerszijden van den stengel zijn gezeten, telkens een beker vormen, die gewoonlijk met water gevuld is.

Mei-Juli. †**Sisyrinchium striatum** (50 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Bloeit den geheelen zomer met geelachtig witte bloemen. Moet 's winters een weinig gedekt worden.



Soldanella alpina.

Juni-Juli. **Soldanella alpina** (15 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Dit plantje wordt in wilden toestand in de Alpen gevonden. Het heeft schoone, ronde, groene bladeren, die aan zeer dunne steeltjes bevestigd zijn. De klokvormige bloempjes zijn van eene diepblauwe kleur. Dit plantje vereischt een koele, schaduwrijke plaats.

Soldanella montana (echt) *zie Nieuwigheden.*

Aug.Oct. **Solidago canadensis nana** (30 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

In het najaar vormt deze plant schoone gele bloemtrossen en maakt vooral, wanneer er veel bij elkaar staan een eigenaardig effect.

Sept.-Oct. **Solidago Shorti** (30 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Laaggroeiende geelbloeiende soort.

Aug.-Oct. **Solidago virgaurea** (90 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Goudgeel bloeiende najaarsplant met schoone vederachtige bloemtrossen, die elken grond en standplaats voor lief neemt en daarom zeer kan worden aanbevolen.

BLOEITIJD.

Juni-Juli. †**Spiraea Aruncus** (120 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Vooral als alleenstaande plant in gazons is deze plant zeer aan te bevelen. De talrijke prachtige lange bloemaren zijn met een ontelbare menigte kleine witte bloempjes overdekt.

Spiraea Aruncus chinensis, *zie Nieuwigheden.*

Spiraea Aruncus var. Kneiffi, *zie Nieuwigheden.*

Juni-Juli. †**Spiraea Astilboïdes** (30 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Schoone plant met fijne witte bloemaren.

Juni-Juli. †**Spiraea Astilboïdes floribunda** (30 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Deze verscheidenheid is zeer rijkbloeiend en heeft forscher bloemtrossen.

Juni-Juli. †**Spiraea filipendula fl. pl.** (45 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Midden uit het rozet van varenachtige bladeren, welke zoowel des winters als des zomers groen blijven, komen de fraaie bloemtrossen met dubbele witte bloemen te voorschijn.

Juli-Aug. †**Spiraea gigantea** (150 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

De grootste van alle Spiraea's m. lange witte bloemstengels.

Juli-Aug. **Spiraea Humboldti** (1 M.) . p. st. f 0.35

Deze heeft eveneens witte bloemen.

Spiraea japonica, zie **Hoteia's.**

Juli-Aug. †**Spiraea palmata** (45 cM.) p. 10 st. f 1.—. p. st. f 0.15

De diep roode kleur der stengels overgaande in het karmijnrood der breede bloemtuilen, steekt fraai af bij het blad, dat i/d herfst schoone tinten van bruin en goudg. vertoont.

Juli-Aug. **Spiraea palmata maxima** (50 cM.) p. st. f 0.40

Nieuwe grootbloemige variëteit.

Juni-Juli. †**Spiraea venusta (lobata)** (90 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Zeldzame Spiraea met schoone purperachtig rose bloemen.

*m***Stachys lanata** . . . p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Bekende plant met witte wolachtige bladeren, welke vooral voor randen een fraai effect maken. Men moet de bloemen geregeld afsnijden om de planten goed gevuld te houden.

Juli-Sept. †**Statice latifolia** (45 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

De stevige bloemstengels komen voort uit een rozet van gegolfde bladeren. Zij zijn als het ware overladen met een ontelbare menigte van fijne lichtblauwe bloempjes. Voor bouquetten zijn ze zeer schoon. Ook kan men ze, zoodra ze beginnen te ontluiken, afsnijden en drogen, door ze op een droge donkere plaats in bosjes op te hangen, evenals men dit met de immortellen doet.

Stipa pennata, zie **Siergrasen.**

Sept.-Oct. †**Stockesia Cyanea** (40 cM.) . p. st. f 0.60

Deze plant bloeit zeer laat en doet denken aan Centaurea montana rosea; zeer schoone snijbloem. Moet des winters een weinig gedekt worden.

Aug.-Sept. **Telekia (Buphtalmum) speciosa** p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Schoone plant voor gazons om alleen te staan. Uit het midden der groote bladeren verheffen zich de twee Meter hooge bebladerde en sterk vertakte bloemstengels met groote, oranjegele straalbloemen.

BLOEITIJD.

Juni-Juli. †**Thalictrum adianthifolium** (50 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Het fijne blad van deze gelijkt op Adianthum. Prachtig voor snijgroen.

Juni-Juli. †**Thalictrum Aquilegiaefolium** (90 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Schoone hooggroeiende sierplant met bladeren als van de Akelei en mooie witte bloemen.

Juni-Juli. †**Thalictrum petaloideum**
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Schoone snijbloem met fijne witte bloemen.

Mei-Juli. †**Thermopsis montana** (40 cM.) p. st. f 0.40

Weinig bekende plant met heldergele bloemen.

Juni-Sept. **Thladiantha dubia** p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze klimplant bereikt soms eene hoogte van meer dan 6 Meter. Ze laat zich zeer gemakkelijk kweeken in allerlei bodem. De bloemen zijn geel en vormen vruchten ter grootte van een kippenei die eerst groen zijn en later een schoone roode kleur bekomen. Zeer schoone plant en geschikt voor prieeltjes.

*m***Thymus citriodorus fol. var.** (25 cM.)
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Deze goudbonte Thym heeft de eigenaardigheid dat hare bladeren eene zeer sterke citroenlucht hebben.

*m***Thymus lanuginosus** . p. 10 st. f 0.80, p. st. f 0.10

Kruipende plant, welke den grond geheel als een mosachtig tapijt bedekt van een donker blauwgroene kleur. Zeer schoone plant voor mozaïekvakken en rotspartijen.

Juni-Juli. *m***Thymus serpyllus albus**
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

„ *m* „ „ **coccineus**
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Deze beide laatste soorten hebben beide lichtgroen blad; de eerste heeft witte, de andere roode bloemen. Het zijn zeer aardige kruipende plantjes.

Mei-Juni. †**Tiarella cordifolia** (30 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze plant met hartvormige bladeren en sierlijke witte bloemen verlangt een halfbeschaduwde standplaats.

Juni-Aug. **Tradescantia virginica**, blauw (45 cM.)
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

„ „ „ **alba**, wit (45 cM.)
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

„ „ „ **lilacina**, lila (45 cM.)
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

„ „ „ **rubra**, purperr. (45 cM.)
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

„ „ „ **fl. pl.**, dubbel blauw,
(45 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

De *Tradescantia's* in hare verschillende soorten vormen een zeer decoratieven groep van sierplanten. Daar zij zeer lang bloeien, kan ik ze ten zeerste aanbevelen.

Mei. **Tricyrtis hirta** (75 cM.) p. 10 st. f 3.50, p. st. f 0.40

Deze schoone plant gelijkt eenigszins op sommige orchideëen. De grondkleur der bloemen is rose, maar ze zijn purperrood gespikkeld.

*m***Trifolium repens atro purpureum** (10 cM.)
p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Vierbladerige klaver (Gelukskaver) met zwartrood blad. Zeer geschikt voor mozaïekvakken of randen.

BLOEITIJD.

April-Mei. †**Trillium grandiflorum**, (20 cM.)
p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15

Prachtige voorjaarsbloem met grooten sneeuwwitten driedeeligen bloemkroon, welker slippen eenigszins teruggebogen zijn.



Tritoma.

†TRITOMA's (Vuurpijlen).

Zoowel als Gazonplanten of wel als snijbloemen voor groote vazen, worden de Tritoma's door weinig andere planten in schoonheid overtroffen. Uit de smalle overhangende rietachtige bladeren komen de tot 2½ M. lange stengels te voorschijn, welker bloemen varieeren tusschen geel en rood.

BLOEITIJD.

Juli-Oct. **Tritoma Clotho** . . . . . . p. st. f 0.30

Met groote donkerroode bloemen.

Juli-Oct. **Tritoma Corallina**, (60 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Deze laaggroeiende Tritoma is een van de schoonste en heeft schitterend groen loof en bloemtrossen van scharlakenroode tot oranje-roode kleur.

Juli-Nov. **Tritoma H. Cannell**, (120 cM.) p. st. f 0.35

Deze is een der beste. Zij vormt bizonder groote trossen van groote donkerroode bloemen.

Juli-Oct. **Tritoma John Benary** (90 cM.)
p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.35

Deze soort heeft dichte trossen van koraalroode bloemen.

Juli-Nov. **Tritoma Lachesis**, p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Bloemen van een schoone abrikozen-gele kleur.

Juli-Oct. **Tritoma Mac Owani**, (45 cM.)
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Zeer los en elegant-bloeiende variëteit met oranje-gele bloemen; de laagstgroeiende. Zij is zeer rijkbloeiend.

Juli-Oct. **Tritoma Otto Mann** p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Eveneens een zeer elegante plant met groote trossen bloemen van een bleeke oranje-kleur.

Juli-Oct. **Tritoma Pfitzeri**, (120 cM.)
p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Zeer schoone variëteit met prachtige zuiver roode bloemen zonder eenige andere tint.

Juli-Oct. **Tritoma recurvata** p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Helder oranje-gele bloemen.

BLOEITIJD.

Juli-Oct. **Tritoma Triumph** . . . . . p. st. f 1.50

Nieuw! Met enorme bloemstengels met prachtige goudgele bloemen. Een der schoonste van alle, en zonder twijfel ook de grootste.

Mei-Juni. **Tritoma Tucki** . . . . . . p. st. f 0.40

De vroegst bloeiende; bloemen rood in geel overgaand.

Aug.-Oct. **Tritoma Uvaria glaucescens,** (90 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Vermillioen-scharlakenkleurige bloemen met oranje-tint.

Juli-Oct. **Tritoma Uvaria grandiflora,** gewone vuurpijl p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

†TROLLIUS (60 cM.)

Deze behooren zeker tot de beste en schoonste vaste planten van het voorjaar. De langstelige handvormige bladeren vormen krachtige boschjes, waaruit zich de slanke bloemstengels verheffen. De bloemen hebben, al naardat de soort is, eene prachtige goudgele tot donker oranje-gele kleur en blijven, na afgesneden te zijn, lang goed. Zij bloeien van Mei-Juni, en gewoonlijk ook nog in den nazomer.

Trollius asiaticus geel p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
„ „ **flore croceo,** zuiver oranje p. st. f 0.60
„ **caucasicus Orange Globe** . . p. st. f 0.60

Deze soort heeft zeer groote oranje-geele bloemen, een der schoonste.

Trollius europaeus, geel . . p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
„ „ **albus,** wit „ 10 „ - 2.—, „ „ - 0.25
„ „ **Rheingold,** goudgeel . „ „ - 0.25
„ **Gibsoni,** . . . . „ „ - 0.60

Grootbloemig, oranje-geel met donker hart.

Trollius giganteus, geel p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.35
„ **japonicus fl. pl,** „ 10 „ - 2.50, „ „ - 0.30

Goed gevulde oranjekleurige variëteit.

Trollius japonicus Excelsior, *zie Nieuwigheden.*
„ **Ledebourii,** geel p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
„ **Loddigesii,** geel „ 10 „ - 2.50, „ „ - 0.30
„ **Napellifolius,** geel „ 10 „ - 1.50, „ „ - 0.20
„ **Smouthi,** grootbloemig lichtgeel p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
„ **Thomas S. Ware,** oranjegeel p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.35

Juli-Oct. **Tropaeolum speciosum** p. 10 st. f 1.60, p. st. f 0.20

Schoone klimplant met fijne bladeren. Ofschoon zij jaarlijks tot boven den grond afsterft, bereikt zij des zomers in korten tijd eene hoogte van 3 meter en dikwijls nog veel hooger, en bloeit met prachtige scharlakenroode bloemen. Van deze plant kunnen alleen worteljes worden afgeleverd, die eenige centimeters onder de oppervlakte in den grond moeten worden ingegraven.

Mei-Juni. **Veronica amethystina** (40 cM.) p. st. f 0.25

Met amethystblauwe bloemen.

Mei-Juni. *m***Veronica gentianoides fol. var.** (30 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Deze soort heeft fraai zilverbont blad. De bloemen zijn wit met blauwe aderen.

BLOEITIJD.

Juli-Sept. **Veronica Hendersoni** (40 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30


Rijkbloeiende plant met groot donkerblauwe bloemaren.

Juni-Juli. **Veronica incana** (45 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Prachtig zilvergrijs blad, met violette bloemen.

Mei-Juni. *m***Veronica repens** p. 10 st. f 1.60, p. st. f 0.20

Zeer fraai laagblijvend zodenvormend plantje, dat reeds vroeg bloeit met fraaie lichtblauwe bloempjes.



Vinca minor.

Mei-Juni. *m***Vinca minor,** *Maagdepalm* p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
„ *m* „ „ **fol. arg. var.,** *Zilverbonte Maagdepalm,* p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
„ *m***Vinca minor fl. albo,** witbloeiend p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

De beide eerste dezer kruipende planten, zoowel de groene met hare glanzige bladeren, als de schoone zilverbonte, hebben helderblauwe bloemen, ze kunnen niet genoeg worden aanbevolen voor randen. Zelfs onder boomen groeien ze goed, en maken wanneer ze eenigen tijd gestaan hebben een tapijt van blad en bloemen. Zooals de afbeelding laat zien kunnen ze ook als hangplant dienst doen.

April-Juni. **Viola cornuta alba** (15 cM.)

Overblijvend viooltje met kleine witte bloemen; zeer rijkbloeiend.

Viola cornuta hybriden.

(Tufted pansies.)

Deze nieuwe viooltjes, ontstaan door eene kruising van Viola cornuta × Viola tricolor maxima, zijn in Engeland reeds eenige jaren in cultuur en hebben daar reeds, dank zij de vele goede eigenschappen, die deze hybriden van hare beide ouders hebben overgenomen, eene vrije algemeene bekendheid verworven. Zij hebben de groeiwijze van V. cornuta, en bloeien vanaf April tot in het late najaar bijna zonder ophouden, terwijl zij volkomen winterhard zijn. De bloemen komen, wat vorm en grootte betreft, overeen met de gewone grootbloemige penseés, doch de kleuren zijn meer effen en zuiverder.

VIOLA CORNUTA HYBRIDEN (vervolg.)

Acme, purperrood.
Archie Grant, donkerpurper grootbloemig.
Ardwell Gem, heldergeel.
Beauty of Norton blauw.
Charmer, purper, van boven wit.
Countesse of Hopetown, zuiver wit.
„ „ **Kintore**, blauwachtig purper m. witten rand.
Edelstein, donkerblauw.
G. H. Riding, purperblauw.
Goldfinch, geel met purperen rand.
Gypsy's Bride, zeer licht lila met violet.
Hemy's Gold, geel.
Lilacina, lila.
L'unique, donkerblauw, bovenste bloembladeren licht.
Max Kolb, purperblauw.
Minnie Baxter, licht karmijnrood, van boven wit.
Mrs. Gray, wit.
Nellie, roomwit, extra grootbloemig.
Purple Queen, purperrood.
Snowflake. zuiverwit met geel oog.
Sylvia, licht geel, extra.
Thomas Glenn, helder licht blauw.
White Duchess, wit met bruinen rand.

100 stuks in 10 soorten naar mijn keus f 9.—
100 „ „ 20 „ „ „ „ - 10.—
10 „ „ 10 „ „ „ „ - 1.50

Viola cucullata grandiflora, *zie nieuwigheden.*

VIOLA ODORATA.

Deze zijn bijzonder aan te bevelen daar ze vroeg in het voorjaar en laat in den herfst bloeien wanneer er niet veel andere bloemen zijn. Ze laten zich ook gemakkelijk forceeren in den bak. Van wege den geur worden ze ook *Welriekende Viooltjes* genoemd.

Soortenlijst.

	p. stuk
Amiral Avelan, grootbl.; de purperblauwe bloemen gelijken op Cyclamen	f 0.20
Belle de Chatenay, blauw	- 0.15
Blanche de Chevreuse, wit	- 0.25
Californica, blauw	- 0.15
Gloire de Bourg-la-Reine, roodachtig	- 0.20
Graf Moltke, blauw	- 0.20
Kaiser Friedrich, blauw	- 0.20
Kaiser Wilhelm, *zie Nieuwigheden.*	
Kermesina, karmijnachtig	- 0.20
La France, *zie Nieuwigheden.*	
Mad. E. Arène	- 0.20
Perle rose, nieuw, rose van kleur	- 0.40
Princesse de Galles	- 0.15

Zeldzaam schoon doorbloeiend viooltje; de schoone groote helderblauwe bloemen zijn op zeer lange stevige stengels gezeten, waardoor deze soort een der beste is voor bouquetten.

	p. stuk
Princesse Marie de Savoye	f 0.25
Rawson's White, wit	- 0.25
Regina Victoria	- 0.15
Tricolor plena	- 0.25
Welsiana	- 0.20

BLOEITIJD
Mei-Juli. **Wulfenia carinthiaca** (20 cM.). p. st. f 0.35

Laaggroeiend alpenplantje met blauwe bloemen.

Juni-Juli. **Yucca flaccida** (75 cM.) . . p. st. f 0.60

Deze schoone sierplant doet veel denken aan een Aloë. De smalle grijsgroene bladeren zijn neerhangend aan de uiteinden; terwijl de bloemen aan lange stevige stengels zijn gezeten en klokvormig neerhangen en wit met een zachte groene tint gekleurd zijn.

Siergrassen en Gazonplanten.

Weinig planten zijn er, die in een tuin zooveel afwisseling aanbrengen als juist deze. Hetzij men ze plaatst aan den rand van een vijver, of als alleenstaande planten, midden in het gazon, ze maken overal een even schoon effect. Sommige moeten in den winter worden bedekt voor de vorst met een flinke hoop drooge bladeren.

Acorus japonicus fol var. p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Schoone sierplant met smalle zilverwit gestreepte bladeren. Geheel winterhard.

Aralia Cashmeriana ($1^1/_2$ M.) . . . . p. st. f 0.50

Prachtige bladplant met kolossale ingesneden bladeren. Zeer geschikt voor gazons. Winterhard.

Arundo Donax . . . . p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Deze reusachtige sierplant is uitnemend geschikt om bij waterpartijen te worden geplant, of in groepen bij een heesterperk. In goeden eenigszins vochtigen grond bereikt zij een hoogte van 3 à 4 Meter. Ook leent deze plant zich uitmuntend om sommige gedeelten van den tuin of oude muren te maskeeren. In ons klimaat komt deze plant zelden in bloei. Winterhard.

Arundo Donax fol. var., *zie Nieuwigheden.*

Bambusa Metake (180 cM.) . . . . . p. st. f 0.50

Prachtige plant om gazons mee te versieren; de stammen die goudgeel zijn steken zeer eigenaardig af bij het lichtgroene blad. Des winters moet ze gedekt worden.
Prachtige winterharde bamboesplant met groote donkergroene ingesneden bladeren. Ze heeft een oostersch aanzien.

Carex japonica fol. var. (60 cM.) . . p. st. f 0.20

Eene schoone bontbladerige Zegge die ook een zeer geschikte potplant is. De bladeren zijn zilverbont gestreept.

Eulalia japonica gracillima univittata ($1^1/_2$ M.) p. st. f 0.30

Zeer decoratieve plant met lange, uiterst smalle, sierlijk aan den top neerhangende bladeren. Winterhard.

Eulalia japonica fol. var. ($1^1/_2$ M.) . . p. st. f 0.30

De smalle, lange, bonte bladeren buigen zich naar alle kanten rondom de plant met een sierlijke ronding naar buiten, wat aan deze plant een bijzonder schoon aanzien geeft. Winterhard.

Eulalia japonica zebrina (180 cM.) . . p. st. f 0.30


De bladeren van deze variëteit zijn *dwars* gestreept, als de huid van een Zebra, met scherpgeteekende, geelachtige lijnen. Zeer schoon, winterhard.



Gunnera scabra.

Gunnera scabra, flinke planten . . . . p. st. f 0.50
„ „ extra zware planten . . „ „ - 1.—


De bladeren dezer plant hebben eenigszins den vorm van de Rhabarber, doch zijn veel grooter, en geven haar een tropisch aanzien. Moet gedekt worden.



Gunnera manicuta.

Gunnera manicata, zeer zeldzaam . . . p. st. f 5.—

De bladeren dezer soort zijn nog grooter en overvloediger.



Gynerium argenteum.

Gynerium argenteum, *Pampasgras,* zware zaailingplanten p. st. f 0.50

Van deze plant kan niet worden gegarandeerd, dat ze alle zilverwitte bloempluimen zullen geven.

Planten van de echte, die uitsluitend zilverwitte pluimen voortbrengt en zeer rijk bloeit (in mijne kweekerij had ik eene plant met 30 pluimen) . . . p. st. f 1.50

Rheum Emodi . . . . , . . . p. st. f 0.40
Grootbladerige Rabarber.

Rheum palmatum . . . . p. st. f 0.30
Deze is een der grootstbladerige van de Rabarber-soorten; de bladeren bereiken kolossale afmetingen en zijn zeer fraai gevormd en ingesneden.

Stipa pennata . . . p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Fraai siergras met zeer fijne aren.

Behalve de bovengenoemde, zijn nog van de in de lijst van Vaste Planten en Rotsplanten voorkomende soorten als *gazonplanten* aan te bevelen:

Acanthus latifolius	Polygonum amplexicaule oxyphyllum
Agapanthus	Rheums
Aralia Cashmeriana	Rudbeckia nitida Autumn Glory
Bocconica's	„ laciniata Golden Glow
Cimicifuga's	Scabiosa's
Crambe cordifolia	Spiraea Aruncus
Echinacea's	„ gigantea
Erithrochaete palmatifida	„ venusta (lobata)
Harpaliums	Telekia speciosa
Helianthus	Tritoma's
Inula macrocephala	
Paeonia's	
Papaver orientale var.	

Varens voor den open grond.

Voor het aanleggen van perken op beschaduwde plaatsen, waar andere planten niet groeien willen, komen de vollegronds-Varens hoe langer zoo meer in gebruik. Vele soorten, vooral de Adianthum met fijne bladeren, leveren een onschatbaar materiaal voor bouquetten.

Vooral op stijve kleigronden verzuime men niet den grond te vermengen met bladaarde, boschgrond of turfstrooisel. Ofschoon bij elke plant de gemiddelde hoogte is aangegeven, moet men hierop niet te veel rekenen, want deze hangt veel af van de grondsoort. Ook groeien de planten, indien ze een of twee jaar vastgestaan hebben, gewoonlijk hooger dan het eerste jaar na de planting. Des winters bedekke men ze met zeer weinig blad of ruigte.

Adianthum pedatum (20 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Deze kan men gerust een der schoonste vollegronds-varens noemen. Zij wordt ook Venushaar of in 't Engelsch „Maidenhair" genoemd. De waaiervormig uitgespreide fijne bladeren, maken met haar staalblauwe bladsteelen een onvergelijkelijk schoon effect ook in bouquetten.

Athyrium Filix-foemina (60 cM.)
p. 10 st. f 0.80, p. st. f 0.10

„ „ **Frizellae** (30 cM.)
p. 10 st. f 3.50, p. st. f 0.40

Prachtige variëteit met smalle bladeren.

Athyrium Filix-foemina Victoria (60 cM.) p. st. f 0.60

Zeer schoone variëteit met eigenaardig gevormde sierlijke bladeren.

Blechnum spicant (30 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Met glanzende, donkergroene bladeren.

Cyrtomium falcatum (30 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Groenblijvend, met lichtgroen blad; niet geheel winterhard.

Cyrtomium Fortunei (40 cM.) . . . . p. st. f 0.30

Deze soort heeft grover blad dan de voorgaande; beide zijn prachtige potplanten.

Cystopteris asplenioïdes (15 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

„ **fragilis** (20 cM.) „ 10 „ - 2.—, „ „ - 0.25

Hypolipsis millifolia (30 cM.) . . . . „ „ - 0.50

Zeer fijnbladerig varentje met fijn ingesneden blad. Prachtig voor bouquetwerk.

Lastrea (Aspidium) Filix Mas (60 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

De bladeren zijn van een fijne bleekgroene kleur en houden zich lang goed.

Lastrea marginale (45 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Uit Amerika ingevoerde Varen.

Lastrea spinulosa (45 cM.) p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.40

Onoclea sensibilis (60 cM.) „ 10 „ - 2.—, „ „ - 0.25

Schoone forschgroeiende varen.

Osmunda cinnamomea (75 cM.) p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.40

Dit is eene zeer schoone, sterk groeiende soort met fraai blad.

Osmunda claytoniana (75 cM.) p. 10 st. f 3.—, p. st. f 0.40

Zeer zeker is dit de schoonste en de elegantste van deze soort. De bladeren hebben aan de voorzijde een schoon fluweelachtig aanzien.

Osmunda gracilis (75 cM.) p. 10 st. 4.50, p. st. f 0.50

Zooals de naam reeds aanduidt heeft deze varen met haar slanke bladeren een eleganten, sierlijken vorm.

Osmunda regalis (90 à 120 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Koningsvaren. Deze draagt de sporen niet zooals de meeste soorten onder aan de bladeren, doch in schoone bruine pluimen aan 't einde der bladsteelen.

Polypodium dryopteris (20 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Schoone fijnbladerige varen.

Polypodium phegopteris (20 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Prachtige laaggroeiende variëteit.

Polypodium vulgare (30 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Polystichum acrostichoides (50 cM.) p. 10 st. f 2.50, p. st. f 0.30

Schoone Varen, die ook voor de koude kas kan worden gebruikt.

Polystichum aculeatum (60 cM.) p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Deze varen heeft een schoone groeiwijze; de bladeren zijn fijn gepunt.

Polystichum angulare proliferum (60 cM.) p. 10 st. f 3.50, p. st. f 0.40

Met prachtig fijn ingesneden blad.

Pteris Aquilina (90 à 150 cM.) p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Deze wordt algemeen Adelaarsvaren genoemd, daar men in de stengels als men die doorsnijdt, den Russischen adelaar kan waarnemen in de doorsnede.

Scolopendrium vulgare (30 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Met eigenaardige onverdeelde lichtgroene bladeren.

Scolopendrium vulgare undulatum (30 cM.) p. st. f 0.60

Schoone varieteit met sierlijk gegolfd blad.

Struthiopteris germanica (75 cM.) p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Duitsche kelk- of bekervaren, zoogenoemd omdat de bladeren in den vorm van een beker groeien.

E. WINTERHARDE WATERPLANTEN.

Liet men vroeger het begroeien van vijvers, grachten enz. en de oevers daarvan geheel aan de natuur over, in den laatsten tijd heeft men ingezien, dat men deze met weinig kosten en moeite kon versieren. Die met * zijn gemerkt plante men aan den oeverkant, zoodanig dat de wortelen steeds vochtig kunnen blijven. De andere planten plaatse men in zandigen tuingrond in een oude mand of kist, op den bodem waarvan men eenige steenen heeft gelegd, Deze late men voorzichtig zinken, daar waar het water 2 à 3 voet diep is. De verzending der waterplanten geschiedt vanaf omstreeks half April tot einde Mei. De soorten, die voor kleine aquariums geschikt zijn heb ik met de letter *a* aangeduid.

***Acorus Calamus**, *Kalmuswortel* . . . p. st. f 0.15

***Alisma Plantago**, *Waterweegbree* . . . „ „ - 0.15

Deze plant geeft wijdvertakte 3 voet hooge bloemschermen met fijne licht blauwe bloempjes.

***Butomus umbellatus** . p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Zwanebloem met prachtig purperroode bloemschermen.

a ***Calla palustris** . . p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

De witte bloemen hebben veel overeenk. met de Aaronskelk.

a ***Caltha palustris** . . p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Vroegbloeiende gele moerasplant.

a ***Caltha palustris fl. pl.** p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25

Deze moerasplant geeft groote dubbele goudgele bloemen en bloeit zeer vroeg.

Caltha palustris semi-plena, *zie Nieuwigheden.*

***Eriophorum angustifolium,** p. 10 st. f 0.60, p. st. f 0.10
Moerasplant met zilverwitte wolachtige pluimen.

a **Hottonia palustris,** . p. 10 st. f 0.80, p. st. f 0.10
Losdrijvende waterplant met zeer schoone rozeroode bloemtrossen.

***Iris Pseudacorus,** *Gele Zwaardlelie,*
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

a ***Juncus Tabernaemontani zebrinus**
p. 10 st. f 6.—, p. st. f 0.75
Eigenaardige bies, die ruim 1 M. hoog groeit, en welker stengels zachtgroen zijn gelijkelijk met wit afgewisseld.

a **Menyanthes trifoliata,** p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
Waterdrieblad, zeer schoon gevormde vleeschkleurige bloemen welke veel op Orchideeën gelijken.

Nuphar luteum, *Gele Waterlelie,* p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20

Nymphaea alba, *Witte Waterlelie,*
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
De Waterlelies zijn voldoende bekend, om elke aanbeveling overbodig te maken. Een schotel van deze bloemen met bruine beukenbladeren er tusschen maakt een hoogst verrassend effect. De navolgende collectie van uit het buitenland geïmporteerde Waterlelies met verschillend gekleurde bloemen kan ik naast de witte en gele zeer aanbevelen. Zij zijn echter zeer zeldzaam en daardoor hoog in prijs.

Nymphaea Laydekerii purpurata, . . . p. st. f 7.50
Nieuwe variëteit met groote wijnroode bloemen, naar het midden tot karmijnrood overgaand. Een der beste en sterkste soorten.

Nymphaea Marliacea albida . . . . . p. st. f 6.—
Deze heeft kolossale witte bloemen, welke dubbel zoo groot zijn als die van de gewone witte Waterlelie.

Nymphaea Marliacea chromatella . . . p. st. f 3.50
Fraaie plant met prachtige kanarie-gele bloemen en bruin gemarmerde bladeren.

Nymphaea Marliacea rosea . . . . . p. st. f 9.50
Prachtige nieuwe variëteit; de bloemen zijn eenigszins gevuld en zacht rose gekleurd.

Nymphaea odorata Caroliniana . . . . p. st. f 9.—
De bloemknoppen dezer soort zijn zalmkleurig en gaan later over in zacht rose.

Nymphaea odorata rosea . . . . . . p. st. f 4.50
Schoone rose-roode Waterlelie.

Nymphaea sphaerocarpa rubra . . . . p. st. f 12.50
Deze soort komt uit Zweden en is tegen de strengste winters bestand. De bloemen zijn eerst paarsachtig rose, dat later in violet rood overgaat.

a ***Sagittaria sagittifolia,** *Pijlkruid.*
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

a ***Sigittaria japonica fl. pl.** „ 10 „ - 5.—, „ „ - 0.60
Deze prachtige verscheidenheid gelijkt eenigszins op het gewone Pijlkruid, doch heeft forscher groeiwijze. De groote dubbele witte bloemen hebben een middellijn van 3—4 cM. en maken langs oevers van vijvers of grachten een zeer schoon effect.

Scirpus lacustris, *Bies,* p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15


Typha angustifolia . . „ 10 „ - 1.50, „ „ - 0.20
Met zeer eigenaardige bruine zaadpluimen.

Typha latifolia . . . p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Evenals de vorige, blad iets breeder.


a **Utricularia vulgaris,** *Blaasjeskruid,*
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15
Zeer eigenaardig gewas, dat gewoonlijk onder water groeit. Tegen den bloei vullen zich de blaasjes met lucht, waardoor de plant aan de oppervlakte komt en dan bloeit met fraaie gele bloemen.

a **Valisneria spiralis** . p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
Eigenaardig waterplantje met zeer fijn gekruld blad.

a **Villarsia nymphaeoides** p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
De bladeren hebben eenige overeenkomst met de witte Waterlelie en zijn bruin gevlekt. De bloemen zijn geel.



Afdeeling III.



Boomen en Heestergewassen.

A. ROZEN.

Iets over de behandeling der Rozen.

Het planten geschiedt het best vanaf October tot einde November, of van half Maart tot begin Mei. De bodem moet voor rozen minstens 60 cM. diep omgewerkt zijn, en zwaar, vruchtbaar en vochthoudend wezen.

Waar de bodem te vast en te nat is, vermenge men dien met fijn turfstrooisel, verteerd blad en mest; door drogen zandigen grond menge men eenigen klei of leem en vooral koemest. Men moet ze niet plaatsen bij groote boomen of in den schaduw. Bij het planten make men vooral ruime gaten, en terwijl men zorgt dat de mest niet aan de wortels raakt en deze laatste goed uitgespreid worden, vulle men het gat half met aarde, en verder met water. Is het water weggezakt, dan kan men verder met aarde aanvullen.

Voor den winter bedekke men de stamrozen op de volgende wijze: Aan eene zijde van de roos neme men vlak bij den stam eenige aarde weg en buige naar dien kant den stam om, totdat de kroon den grond raakt. Dan houde men haar in deze positie door twee kruislings over elkaar gestoken stokken en bedekke zoowel de kroon als de stam met aarde, ongeveer ter hoogte van 30 cM.

De struikrozen worden als volgt behandeld: de struiken worden tot op een voet hoogte rondom aangehoogd met aarde en de daardoor ontstane gaten met verteerde koemest gevuld. Men bedekke daarna het geheele perk met droog blad, waarover men eenige dennentakken kan leggen voor het opwaaien der bladeren.

In plaats van droog blad kan men ook turfstrooisel nemen.

Het snoeien der rozen geschiedt jaarlijks in April, sterk groeiende soorten moeten lang gesnoeid worden, d. w. z. de takken moeten niet te sterk worden ingekort, want anders zou de struik wel veel nieuwe takken vormen maar weinig bloeien. Zwak groeiende soorten moeten evenwel sterk worden ingesnoeid, daar men anders spoedig veel zwak hout zou krijgen en ze toch van nature reeds goed bloeien. Het oude en zwakke hout, alsook waterlooten, moeten zooveel mogelijk worden verwijderd en krachtige gezonde eenjarige takken behouden. Men verzuime vooral niet de in 't voorjaar geplante rozen direct na het planten te snoeien, en wel voor de eerste maal alle soorten zeer kort. Het is meermalen gebeurd, dat men mijn advies vraagde over het slecht groeien van nieuw geplante rozen en meestal bleek mij dat ze geheel zonder snoeien waren geplant en de struiken of kroonen dus voorgoed bedorven waren.

Al mijne rozen, zoowel Stam- als Struikrozen, zijn op Rosa canina (bottel) geoculeerd, en veel sterker dan die welke op andere onderlagen zijn veredeld. Die welke dikwijls voor veel lagere prijzen in de nieuwsbladen worden aangeboden en meestal op Kaneelstam zijn geoculeerd, kunnen hiermede niet vergeleken worden. Alleen zware en gezonde planten worden afgeleverd.

Hieronder volgt de naamlijst eener collectie, welke in alle opzichten aanbeveling verdienen kan. Van enkele soorten zijn alleen Hoogstammen, van andere slechts struiken voorhanden; **men gelieve dus de keuze der soorten zooveel mogelijk aan mij over te laten.** Men kan er evenwel steeds op rekenen, dat bij het sorteeren voor zooveel mogelijk uiteenloopende kleuren gezorgd wordt.

N.B. Wenscht men de keuze der soorten zelf te bepalen, zoo kan het voorkomen dat er dan soorten besteld worden die niet in den verlangden vorm van stam of struik voorhanden zijn.

In dat geval zal ik zoo vrij zijn dezelve door andere te vervangen, die de gewenschte het meest in kleur nabij komen. Het verdient dus aanbeveling eenige soorten meer op te geven dan men exemplaren bestelt.

N.B. H beteekent: hybride-remontant;

T: theeroos; N: noisette; B: bourbon; TH: thee-hybride.

EXTRA COLLECTIE ROZEN.

in nieuwe of zeer aanbevelenswaardige prachtsoorten.

Onderstaande Collectie biedt het schoonste aan van de minder algemeen bekende en nieuwere soorten. Deze soorten paren bijna alle aan eene buitengewone rijkbloeiendheid eene zeer beknopte groeiwijze, waardoor ze voor perken bijzonder zijn aan te bevelen. De allernieuwste rozensoorten worden door mij niet aangeboden, daar het aantal soorten reeds zoo groot is en ze dikwijls zoo weinig van de andere verschillen. Ze worden in mijne kweekerij eerst een paar jaren beproefd alvorens ze aan te bieden.

T **Baronne Henriette de Loeuw,** rose met goudgeel.
T **Beauté de l'Europe,** donkergeel.
TH **Belle Siebrecht,** zeer schoon, zacht rose en zeer rijkbl.
H **Captain Hayward,** schitterend karmozijn hooggroeiend.
TH **Caroline Testout,** vleeschkleurig.
T **Cathérine Mermet,** licht vleeschkleurig rose.
TH **Clara Watson,** satijnwit midden lichtrood.
H **Clio,** vleeschkleur met donkerrose hooggroeiend.
T **Comtesse de Frigneuse,** schitterend kanariegeel.
T **Docteur Grill,** eerst koperkleurig, daarna helderrose.
T **Duchesse Marie Salviati,** oranjegeel met rood.
T **Erzherzog Franz Ferdinand,** perzikrood met geel.
T **Francis Dubreuil,** purper-karmijnrood.
T **Gloire de Deventer,** roomwit, knop spits, zeer schoon.
T **G. Nabonnand,** donkerrose met geel.
T **Grace Darling,** wit met rose.
TH **Grosherzog Ernst Ludwig,** karmijnrood; wordt ook roode Maréchal Niel genoemd.
TH **Kaiserin Auguste Victoria,** van buiten wit, binnen geel.
T **Leon XIII,** wit met licht stroogeel.
TH **L'Innocence,** glanzendwit, grootbloemig.
T **Mad. Jules Siegfried,** roomwit, met vleeschkleur.
N **Madame Pierre Cochet,** goudgeel.
T **Maman Cochet,** vleeschkleur, karmijn met geel.
T **Maréchal Niel,** donkergeel.
B **Philémon Cochet,** licht rose.
T **The Bride,** wit met groene weerschijn.
T **Thérèse Glück,** rose, van buiten donkerrood extra.
T **Witte Maman Cochet,** prachtige snijroos zelfde vorm als Maman Cochet.
T **Witte Maréchal Niel,** vorm als de gewone bekende Maréchal Niel, maar wit.
T **Yvonne Gravier,** roomgeel, van binnen licht kanariegeel, extra.

Algemeene Soortenlijst.

H **Aimée Vibert,** wit.
H **Abel Carière,** purper karmijnrood.
H **Annie Wood,** rood.
TH **Augustine Guinoisseau,** vleeschkleurig.
H **Baron de Bonstetten,** donker karmijnrood.
H **Baronne A. de Rotschild,** rose.
T **Belle Lyonaise,** kanariegeel.
N **Bouquet d'or,** donkergeel.
H **Captain Christy,** vleeschkleurig.
T **Céline Forestier,** donkergeel.
TH **Cheshunt hybrid,** kersrood.
N **Duarte de Oliveira,** rose met kopergeel.
H **Duchess of Teck,** scharlakenrood.
H **Duc de Cazes,** donker bloedrood.
H **Elise Boëlle,** wit.
H **Empereur du Maroc,** zwartrood.
T **Etoile de Lyon,** zwavelgeel.
H **Fisher en Holmes,** vuurrood.
T **Franziska Krüger,** zalmkleurig rose.
T **Fürst Bismarck,** zuiver geel.
H **Général Jacqueminot,** bloedrood.
T **Gloire de Dijon,** zalmkleurig.
H **Jean Liabaud,** donkerrood.
T **Kaiser Wilhelm,** witachtig geel, van binnen donkergeel.
TH **La France,** zacht rose.
TH **La France de '89,** helderrood.
H **Mad. Bellender Ker,** zalmkleur, wit.
T „ **Bérard,** geel met rose.
T **Magdelaine Beauvillain,** helder wit met lichtrose.
T **Marie van Houtte,** geelwit, rose omzoomd.
T **Medea,** citroengeel.
H **Monsieur Boncenne.** fluweel zacht purper.
H **Paul Neyron,** donker rose.
H **Prince Camille de Rohan,** donker karmijn.
H **Princesse de Béarn,** zwartrood, rijkbloeiend.
T **Reine Marie Henriette,** kersrood.
N **Rève d'or,** donker geel.
H **Sénateur Vaisse** helderrood.
B **Souvenir de la Malmaison,** licht geelkleurig.
H „ „ **Spa,** donkerrood.
H **Triomphe de Luxembourg,** helderrood.
N „ „ **Rennes,** zwavelgeel.
N **William Allen Richardson,** zuiver oranje.

HOOGSTAMROZEN

per stuk in soorten der Extra Collectie . .	f 0.90
„ 10 „ „ 10 „ „ „ „ . .	- 8.50

HOOGSTAMROZEN.

Per stuk in soorten der algemeene soortenlijst	f 0.80
„ 10 „ „ 10 „ „ „ „	- 7.50
„ 25 „ „ 25 „ „ „ „	- 17.50

HALFSTAMROZEN.

Per 10 st. in 10 soorten der Algem. soortenlijst f 6.50

STRUIKROZEN.

Per stuk in soorten der Extra Collectie . .	f 0.30
„ 10 „ „ 10 „ „ „ „ . .	- 2.75
„ 20 „ „ 20 „ „ „ „ . .	- 5.25

N.B. De Nieuwe prachtige *Witte Maman Cochet* is niet onder de prijzen dezer collectie begrepen, maar kost per stuk f 0.50.

STRUIKROZEN.


Per 10 st. in 10 soorten der algem. soortenlijst	f 2.—
„ 100 „ „ 25 „ „ „ „	- 17.50

STRUIK-MOSROZEN in soorten.

Per 10 st. in 5 soorten naar mijne keus . . . f 2.—

Nieuwe roos „SOLEIL D'OR" struiken . p. st. f 1.—

Kruising tusschen de eenmaal bloeiende roos „Peniau Yellon met een hybride. De bloem is prachtig geel en heeft een heerlijke geur. Daarbij is zij, volgens den winner, volkomen winterhard.



Rosa rugosa.

JAPANSCHE ROZEN.

ROSA RUGOSA.

Deze rozen kunnen zonder eenige bedekking den strengsten winter doorstaan. Zij groeien tot 2 Meter hoog, en bloeien gedurende den geheelen zomer. De takken zijn over de geheele lengte met groote, dicht opeengeplaatste stekels voorzien, waardoor ze uitmuntend geschikt zijn tot het aanleggen van heggen, die spoedig zoo worden, dat er hond noch kip door kan. De bloemen zijn enkel doch schoon gevormd.

Rosa rugosa, helder karmijnrood, en wit gemengd, p. 10 st. f 1.60, p. st. f 0.20

„ „ jonge struikjes . . . p. 10 st. f 1.—

Rosa rugosa Conrad Ferdinand Meijer . p. st. f 1.—

Nieuwe bizonder schoone volkomen winterharde roos, door kruising met een theeroos ontstaan. De kleur is heerlijk zacht rose en de bloemen goed gevuld. Zeer aanbevelenswaardige nieuwe roos voor perken, daar zij niet behoeft te worden gedekt.

Rosa rugosa Mad. Georges Bruant, wit halfdubbel, p. st. f 0.30

„ „ **rubra plena,** purperrood dubbel „ „ - 0.30

KLIMROZEN.

Deze leenen zich uitmuntend tot het bekleeden van waranda's, muren en schuttingen; vooral waar men ze een plaatsje op het zuiden kan geven, zullen ze door rijken bloei haar dankbaarheid toonen.

Nieuwe klimroos „Turner's Crimson Rambler." p. st. f 0.30.

Deze uit Japan ingevoerde Klimroos munt uit door sterken groei en glanzige donkergroene bladeren. De tallooze vurig karmijnroode bloemen zijn in dichte piramidevormige trossen bijeen gezeten en komen prachtig uit tegen het frische groen. Een der beste klimrozen.

Aglaia, groenachtig geel.
Daniël Lacombe, lichtgeel met rose weerschijn, later bijna wit.
De la Grifferaie, purperkarmijnrood.
Euphrosine, rose.
Felicité et Perpétue, vleeschkleurig wit.
Thalia, zuiver wit, kleine bloem.
Thoresbyana, wit, half dubbel.
William's Evergreen, wit, naar het midden licht rose.

Bovenstaande soorten p. st. f 0.25, p. 10 st. f 2.—.

De volgende soorten zijn ook geschikt, om als klimrozen te worden aangeplant, maar vereischen dan gedurende den winter eenige bedekking. Men vindt ze hiervoren beschreven en aangeboden: Bouquet d'or, Captain Christy, Francisca Krüger, Gloire de Dijon, Reine Marie Henriette, Rêve d'or.



B. GROENBLIJVENDE SIERHEESTERS en AZALEA'S.

RHODODENDRON-HYBRIDEN.

Van dit schoone plantengeslacht met donkergroene glanzige bladeren, welke ook gedurende den winter het oog aangenaam aandoen, kan ik eene zeer schoone collectie aanbieden, welke de meest mogelijke variatie van rijkgekleurde bloemen oplevert. Op kleiachtige gronden moet de aarde met turfmolm of turfstrooisel worden vermengd, indien men de planten flink wil laten groeien en bloeien. Zij teelen het weligst in zwarte, liefst veenachtige tuinaarde. Een flinke bemesting met zuivere koemest kan in alle gevallen worden aanbevolen.

De prijs hangt af van de grootte der planten. Soortenlijst op aanvraag verkrijgbaar.

Flinke planten in soorten, met knoppen, naar mijne keus p. st. f 0.60 à f 0.90

Zware planten in soorten, met knoppen, naar mijne keus p. st. f 1.— à f 1.50

Flinke planten in soorten, zonder knoppen, naar mijne keus p. st. f 0.50 à f 0.70

Zware planten in soorten, zonder knoppen, naar mijne keus p. st. f 0.80 à f 1.20

ALPEN-RHODODENDRONS of ALPENROZEN.

Alle onderstaande soorten behooren tot de Alpen-Rhododendrons en zullen aan degenen, die in Zwitserland of Tyrol gereisd hebben niet onbekend wezen. Ze onderscheiden zich door hun schoone bloemen terwijl sommige reeds zeer vroeg bloeien.

Rhododendron ferruginium . . . p. st. f 0.45—0.55
„ „ **album** . „ „ - 0.50—0.60
„ **hirsutum** . . . . „ „ - 0.45—0.60
„ **myrtifolium** . . . „ „ - 0.50—0.60
„ **praecox** . . . . „ „ - 0.50—0.80

AZALEA PONTICA HYBRIDEN.

Deze hebben veel overeenkomst met de Rhododendrons, doch laten des winters hare bladeren vallen. Zij bloeien veel vroeger in de schoonste nuancen van geel en rood en zijn tegen den strengsten winter bestand.

Flinke planten, met knoppen, in schoone soorten op naam, naar mijne keus . . . p. st. f 0.60 à f 0.80

AZALEA MOLLIS HYBRIDEN.

Deze Azalea-groep is evenals de Pontica-hybriden bij uitstek geschikt om in perken te worden geplant. Zij bloeien eveneens vroeg in het voorjaar en de schitterend gekleurde bloemen trekken reeds van verre de aandacht. Zij zijn ook volkomen winterhard.

Flinke planten, met knoppen, in schoone soorten op naam, naar mijne keus . . . p. st. f 0.60 à f 0.80

Zware planten, met knoppen, in schoone kleuren, zonder namen . . . . . . p. st. f 0.40 à f 0.60

Ilex Aquifolium, *Groene Hulst*, hoog 1 M. p. st. f 1.60
„ „ **fol. aurea var.**, *Goudbonte Hulst*, hoog 1 M., p. st. f 2.50

KALMIA LATIFOLIA.

Een der schoonste en dankbaarste groenblijvende Heesters, welke gedurende de maanden Mei en Juni overdekt is met prachtige vleeschkleurige bloemen, welke tegen de donkergroene bladeren fraai afsteken.

Flinke planten met knoppen, p. st. f 0.50 à f 0.75

MAHONIA AQUIFOLIUM.

Schoone groenblijvende heester met glanzige donkergroene bladeren die stekelig zijn evenals die der Hulst. Zij bloeit vroeg in het voorjaar met gele trossen, en brengt blauwe bessen voort. De bladeren worden vooral des winters veel gebruikt in bouquetten en bloemstukken, daar deze dan een schoone donkerbruine kleur aannemen.

Flinke planten, p. st. f 0.25

PERNETTYA'S.

Deze heesters hebben schoone witte bloemen en leveren in den winter aardige roode en witte vruchten.

Flinke planten, p. st. f 0.60 à f 0.80

PRUNUS LAURO-CERASUS.

Laurierkers met glanzige donkergroene bladeren. Bij zeer strenge winters is deze struik niet volkomen winterhard.

Zware struiken, p. st. f 0.60

c. CONIFEEREN.

Bijna alle soorten van Conifeeren blijven ook des winters groen. Ze worden veelvuldig geplant zoowel in groepen of perken en als alleenstaande boomen. Wil men schuren, muren of schuttingen aan het oog onttrekken, zoo zijn daarvoor de Conifeeren bij uitstek geschikt. Op kleigronden is het aanbevelenswaardig om den grond met turfstrooisel te vermengen. In alle geval moet vóór de planting de grond flink diep worden losgewerkt.

De door mij gekweekte Conifeeren zijn dikwijls verplant en hebben daardoor vaste kluiten, hetgeen de kans op goed aangroeien aanmerkelijk verhoogt. Men vraagt mij dikwijls hoeveel stuks men benoodigd is voor een perk. Dit kan men echter zelf gemakkelijk uitrekenen, wanneer men nagaat, dat het aantal vierkante meters van de oppervlakte van het perk, ook nagenoeg het aantal der benoodigde Conifeeren aanwijst.

N.B. De meest geschikte tijd om Conifeeren te verplanten is van begin April tot einde Mei, en half Augustus tot half October. Ze worden in verschillende grootte geleverd en hoofdzakelijk in de volgende soorten.

	Hoogte in M.	Prijs p. stuk
Abies Nordmanniana, prachtige Noorsche den met breede takken	1.20—1.40	f 2.—
„ **subalpina**, schoone uit Amerika ingevoerde den met een blauwachtigen glans . . .	1.00—1.20	- 1.20
Chamaecyparis Lawsoni, algemeen bekende snelgroeiende donkergroene Cypres	1.30—1.50	- 0.70
„ „	1.60—1.80	- 0.90
„ „	1.90—2.00	- 1.20
„ „ **Alumi**, donker fluweelgroen, zuilvormig	1.00—1.10	- 0.60
„ „ „	1.20—1.30	- 0.70
„ „ „	1.40—1.50	- 0.90
„ „ „	1.60—1.70	- 1.10
„ „ „	1.80—1.90	- 1.40

	Hoogte in M.	Prijs p. stuk
Chamaecyparis Lawsoni argentia Waterer, fraai zilverbont	1.00—1.10	f 0.65
„ „ „ „	1.20—1.30	- 0.90
„ „ **aurea nova,** prachtig goudgeel	1.20—1.30	- 1.20
„ „ „ „	1.40—1.50	- 1.40
„ „ **elegantissima,** met zilverachtigen glans aan de toppen	1.00—1.10	- 0.90
„ „ **erecta alba,** zilverbont met rechtopgroeiende takken	1.20—1.30	- 0.90
„ „ „ „	1.40—1.50	- 1.20
„ „ „ **viridis,** heldergroen met rechtopgaande takken	1.10—1.20	- 0.90
„ „ „ „	1.30—1.40	- 1.—
„ „ „ „	1.50—1.60	- 1.20
„ „ **Fraseri,** blauwachtig groen, zeer schoon	1.00—1.20	- 0.60
„ „ „	1.30—1.40	- 0.75
„ „ **intertexta,** met smalle takken	1.20—1.30	- 1.—
„ „ „	1.40—1.50	- 1.20
„ „ **Kloosterhuisi,** ijle groeier met losse takken	1.00—1.20	- 1.—
„ „ „	1.30—1.40	- 1.10
„ „ **minima glauca,** blauwachtig groene dwergsoort	0.30—0.40	- 0.80
„ „ **monumentalis glauca,** prachtige blauwgroene soort	1.00—1.20	- 0.70
„ „ „ **nova**	1.20—1.30	- 0.90
„ „ **nana argentea var.,** zilverbont met gedrongen groeiwijze	0.80—0.90	- 0.60
„ „ „ „ „	1.00—1.10	- 0.75
„ „ **robusta,** forsch groeiend donkergroen, bevriest nooit	1.30—1.40	- 0.80
„ „ „	1.50—1.70	- 1.20
„ „ „	1.80—1.90	- 1.50
„ „ „ **argentea**	0.90—1.10	- 0.75
„ „ **Silver Queen,** met zilverwitte uiteinden aan alle takken; de schoonste van alle zilverbonte	1.20—1.30	- 1.—
„ „ „ „	1.40—1.50	- 1.20
„ „ **Triomf v. Boskoop,** nieuw, een der schoonste met blauwgroen loof	1.20—1.30	- 1.—
„ „ „ „ „	1.40—1.50	- 1.20
„ „ „ „ „	1.60—1.70	- 1.50
„ „ **Versicolor,** goudbonte, zeer schoon	1.00—1.10	- 0.75
„ „ „	1.20—1.30	- 0.95
„ „ „	1.40—1.50	- 1.25
„ „ **Westermanni,** schoon goudgeel loof	0.90—1.00	- 1.—
„ „ „	1.10—1.20	- 1.30
„ „ **Wisseli,** eigenaardige zuilvormige groeiwijze	0.90—1.00	- 1.20
„ „ „	1.10—1.20	- 1.50
„ **pisifera plumosa,** met lichtgroen gekruld loof	1.10—1.20	- 0.80
„ „ „	1.30—1.40	- 1.—
„ „ „ **aurea,** met goudgeel gekruld loof	1.10—1.20	- 0.80
„ „ „ „	1.30—1.40	- 1.10
„ „ **squarrosa,** met grijsgroen gekruld loof	1.10—1.20	- 0.90
„ „ „	1.30—1.40	- 1.20
Picea excelsa, gewone fijne Spar, herhaaldelijk verplant en ruim gekweekt, waardoor het prachtplanten zijn met vaste kluiten	1.00—1.10	- 0.30
	1.20—1.30	- 0.40
„ „ **Alcockiana,** fraaie fijne Spar, met takken die aan de onderzijde blauw zijn	1.50—1.60	- 1.50
„ „	1.70—1.80	- 1.80
„ „	1.90—2.—	- 2.25
„ „ **Finedonensis,** fraaie zilverbonte fijne Spar	1.40—1.60	- 1.50
„ „	1.70—1.90	- 1.80
„ „ **inverta,** prachtige treurspar met neerhangende takken	1.40—1.70	- 2.50
„ „	1.80—2.00	- 3.50
„ „ **Merki,** gedrongen groeiende Spar	0.60—0.80	- 1.—
„ **pungens glauca,** prachtige lichtblauwe Spar, zeer zeldzaam	± 1.—	- 3.—
Pinus Strobus, zeer fraaie den met fijne grijze naalden	1.00—1.20	- 0.60
„ „	1.30—1.50	- 0.80
Taxus baccata, bekende Taxus	0.80—0.90	- 0.80
„ „	0.90—1.00	- 1.—
„ „ **fastigiata,** zuilvormig	0.50—0.60	- 1.—
„ „ „	0.70—0.80	- 1.40
Thuya occidentalis, gewone groene Thuya, die veel gebruikt wordt voor hagen	1.00—1.20	- 0.50
„ „	1.30—1.50	- 0.70
„ „ **globosa,** zuilvormig	1.00—1.20	- 0.70
„ „ **semper aurea**	1.00—1.10	- 1.10
„ „ „ „	1.20—1.30	- 1.40

	Hoogte in M.	prijs p. stuk
Thuya occidentalis semper aurea	1.40—1.50	f 1.70
„ „ **Standishi**	0.80—0.90	- 0.70
„ „ „	1.00—1.10	- 0.85
„ „ **Wareana lutescens**	0.70—0.80	- 0.70
„ „ „ „	0.90—1.—	- 0.85
Thuyopsis borealis	0.90—1.—	- 0.80
„ „	1.10—1.20	- 0.95
„ **dolabrata**, zeer eigenaardige groeiwijze	0.40—0.50	- 0.75
Tsuga canadensis, zeer fraaie den met fijn blad	1.00—1.40	- 0.75
„ „	1.50—2.—	- 1.—

D. BLOEM- en STRUIKHEESTERS.

Deze zijn verkrijgbaar in onderstaande soorten, welke allen uitmunten hetzij door schoone bloemen of door fraaie bladeren. Behalve voor het planten van perken of singels, waar ze in elken tuin op hun plaats zijn, leveren vele soorten ook een goed materiaal voor bouquetten.

Ze worden geleverd in flinke struiken van 1 Meter en hooger, behalve eenige dwergachtige soorten.

Men verzuime vooral niet om vóór het planten de dikke wortels glad af te snijden waar deze afgestoken zijn. De haarwortels mogen echter niet worden ingekort. Direct na het planten moeten de heesters worden gesnoeid. Waar dit verzuimd wordt zal men nooit mooie gevulde struiken verkrijgen. In 't vervolg snoeie men vroegbloeiende heesters zooals Seringen enz. niet in het voorjaar, daar men dan de bloemknoppen zou wegsnoeien; men snoeie ze in den zomer, direct na den bloei.

Acer Negundo fol. arg. var. . . . . . p. st. f 0.30
Zilverbontbladerige Eschdoorn.

Acer Negundo fol. aur. marg. . . . . p. st. f 0.45
Goudgele Eschdoorn.

Acer Negundo Odessana, *nieuw,* . . . p. st. f 1.—
Prachtige goudbladerige soort, die zeer sterk groeit.

Aralia pentaphylla . . . . p. st. f 0.40
Zeer sierlijke heester met groote bladeren.

Amygdalis persica fl. pl. . . . . . . p. st. f 0.45
Dubbele perzik; zeer schoone heester.

Berberis vulgaris atro purpurea . . . „ „ - 0.30
Bruinbladerige Berberis.

Calycanthus floridus . . . . „ „ - 0.35
Met fluweelachtig bruine, heerlijk riekende bloemen; ook het hout heeft een aangenamen geur.

Cornus alba Späthi robusta, *nieuw* . . p. st. - 0.40
In tegenstelling met alle andere bonte *Cornus*-soorten, is deze heester zeer sterk groeiend en heeft forsche, zeer schoone goudbonte bladeren.

Cornus sanguinea . . . . p. st. f 0.20
Bloedroode Kornoelje, zoo genoemd daar de bladeren in den herfst een bloedroode kleur aannemen. Ook geschikt voor heggen en om onder boomen te planten.

Cornus sibirica . . . . p. st. f 0.20
Schoone heester met donkerrood hout.

Cornus sibirica fol. arg. var. . . . . „ „ - 0.30
Zilverbonte Kornoelje; zeer schoone heester.

Corylus Avellana atro purpurea, zwarte Hazelaar - 0.35

Cydonia Japonica, Japansche Kwee . . p. st. - 0.30
Deze is in onze tuinen ook bekend als *Pyrus japonica* en bloeit zeer vroeg in het voorjaar in vele nuances van wit, rood en rose.

Cytisus Laburnum, ... p. st. f 0.25
Algemeen bekende Goudenregen.

Deutzia crenata fl. albo pl. . . . . . p. st. f 0.20
Schoone heester met dubbele witte bloemen.

Deutzia Fortuneï . . . . p. st. f 0.25
Deze soort heeft enkele doch veel grootere bloemen.

Deutzia gracilis . . . . p. st. f 0.20
Vroegbloeiend laagblijvend heestertje.

Deutzia gracilis robusta, *nieuw,* . . . p. st. f 0.25
Deze is in alle opzichten een verbetering van de bekende Deutzia gracilis. Zij groeit veel forscher en de bloemen zijn veel grooter.

Deutzia Lemoinei, ... p. st. f 0.25
Uitmuntende sierheester met groote witte bloemen.

Eleagnus edulis . . . . p. st. f 0.45
Olijfwilg met bladeren die aan de onderzijde zilverwit zijn.

Forsythia viridissima, ... p. st. f 0.25
Vroegbloeiend en met lichtgroene bladeren en takken.

Hydrangea paniculata grandiflora . . . p. st. f 0.20
Met kolossale witte bloemtrossen, die tot 30 cM. lang worden.

halfstam kroonboompjes . . . . . . p. st. f 0.50

Hypericum major . . . . p. st. f 0.20
Laaggroeiend heestergewasje met groote gele bloemen.

Kerria japonica fol. var. . . . . p. st. f 0.25
Dit heestertje heeft fijn zilverbont blad.

Kerria japonica fl. pl., ... „ „ - 0.30
Met dubbele goudgele bloemen.

Lonicera Ledebouri, bloeit rood met geel „ „ - 0.25

Lonicera tartarica fl. albo . . . . . „ „ - 0.25
Een der fraaist witbloeiende heesters.

Philadelphus coronarius . . . . . . „ „ - 0.20
Algemeen bekende Boerenjasmijn.

Philadelphus grandiflorus . . . . . . p. st. - 0.20
Grootbloemige witte Jasmijn.

Philadelphus Lemoinei erectus . . . . „ „ - 0.25
Zeer schoone rechtop groeiende nieuwe heester, die overdekt is met witte bloemen.

Prunus Pissardi . . . . p. st. f 0.65
Deze donkerbruinbladerige pruimsoort is een der schoonste heesters, niet alleen om het schoone blad waardoor zij in perken en als alleenstaande heester reeds van verre de aandacht trekt, maar ook om de schoone licht rose bloemen, waarmee zij vroeg in het voorjaar, reeds vóór de bladeren verschijnen als bedekt is. Zware piramidevormige heesters.

Rhus cotinus . . . . p. st. f 0.40
Pruikeboom met groengele bloemen.

Ribes aureum. Goudgele Ribes . . . „ „ - 0.25
„ **sanguineum**. Roode Ribes, zeer vroeg bloeiend . . . . . „ „ - 0.25
„ „ **albidum**, met vleeschkleurige bloemen . . . . „ „ - 0.25

Sambucus nigra aurea. Goudvlier . . „ „ - 0.20
„ „ **fol. arg. var**. Zilverbonte Vlier . . . . „ „ - 0.25
„ „ **pulverulenta**, met zilverwit gestippeld blad . . „ „ - 0.40
„ „ **pyramidalis**, met rechtopgroeiende takken, zeer eigenaardig . . „ „ - 0.35

Spiraea Bumalda. Laagblijvend met rozeroode bloemschermen . . . . „ „ - 0.20
„ **Bumalda Anthony Waterer**. Nieuwe varieteit van de voorgaande met prachtige donkerpurperr. bloemen „ „ - 0.30
„ **callosa**. Laagblijvend met witte bloemschermen . . . . . . „ „ - 0.20
„ **Douglasi**, met aarvormige roode bloemtrossen . . . . „ „ - 0.20
„ **multiflora**, rijkbl. met rose bloemen „ „ - 0.20
„ **opulifolia aurea**, m. goudgele bladeren „ „ - 0.20

Stephanandra Tanakae . . . . p. st. f 0.40
Nieuwe uit Japan ingevoerde heester, met bladeren, die in den herfst de meest verschillende kleurentinten vertoonen.

Symphoria racemosa . . . . p. st. f 0.20
Radijsboompje met ronde witte vruchtjes.

Syringa vulgaris. Gewone paarse Sering, zware heesters . . . „ „ - 0.30
„ „ **alba**. Witte Sering . . „ „ - 0.40
„ „ **Charles X**. Grootbloem. paarse Sering . . . „ „ - 0.70
„ „ **Marie Legraye** . . . „ „ - 0.70
Extra grootbloemige witte Sering.

Syringa vulgaris Lemoinei fl. pl. . . . „ „ - 0.70
Met dubbele paarse bloemen.

Tamarix afrikana . . . . „ „ - 0.40
Zeer schoone fijnbladerige heester m. rechtopgaande takken.

Viburnum Lantana . . . . p. st. f 0.30
Deze heester heeft lichtgrijze wolachtige bladeren en witte bloemen. Zij geeft bessen, die eerst groen, daarna rood en eindelijk zwart worden.

Viburnum opulus, Schermbloemige Sneeuwbal p. st. f 0.25
„ „ **sterile** . . . . „ „ - 0.35
Echte Sneeuwbal of Geldersche roos, algemeen bekende heester met witte bloemen.

Weigelia rosea nana fol. arg. var. . . p. st. f 0.25
Bontbladerige Weigelia.

Weigelia candida, zuivere witte . . . . „ „ - 0.25
„ **purpurea**, donderrood . . . . „ „ - 0.25
„ **van Houttei** . . . . „ „ - 0.25
Karmijn en rozerood met wit, van binnen licht violet.

Weigelia hortensis nivea, wit doorbloeiend p. st. f 0.25

25 Heesters in 5 soorten naar mijne keus f 3.25
25 „ „ 10 „ „ „ „ - 4.25
100 „ „ 10 „ „ „ „ - 15.—

E. KLIMPLANTEN.

Onderstaand sortiment kan ik ten zeerste aanbevelen tot het bedekken van muren of schuttingen, tot het bekleeden van waranda's en prieëltjes of wel om oude boomstammen aan het oog te onttrekken. Enkele klimplanten, die 's winters afsterven, als *Tropaeolum speciosum*, *Thladiantha dubia*, *Boussingaultia Baselloïdes*, enz. zijn onder de rubriek: „Vaste planten" opgenomen.

Actinidia Polygama . . . . p. st. f 0.45
Schoone sterkgroeiende klimplant met glanzige donkergroene bladeren. Een paar jaar geleden werd van deze plant zeer veel ophef gemaakt en men beweert dat zij zeer smakelijke vruchten oplevert, die ik er echter in mijne kweekerij nog niet aan heb gezien.

Ampelopsis quinquefolia . . . . . . p. st. f 0.30
Algemeen bekende wilde wingerd, die veel wordt gebruikt voor prieëlen en waranda's, In den herfst neemt het blad een prachtig roode kleur aan.

Ampelopsis Veitchi . . . . p. st. f 0.50
Zelfklimmende wilde wingerd, Deze moet gedurende den eersten winter na de planting worden gedekt. Zij is bij uitstek geschikt voor bedekking van muren en schuttingen, daar zij zich door zuigworteltjes daaraan vasthecht en de loten vlak tegen den muur aangroeien, waardoor zij in 't geheel niet behoeft te worden aangebonden. Het blad wordt ook fraai bloedrood in den herfst.

Aristolochia Sipho . . . . p. st. f 0.60
Duitsche Pijpenbloem met groote hartvormige bladeren; een der schoonste klimplanten.

Clematis Jackmanni . . . . p. st. f 0.80
Prachtige donkerblauwe Clematis.

Clematis paniculata . . . . p. st. f 0.90
Prachtige japansche klimplant, die zeer snel groeit. In September wordt de geheele plant als het ware overdekt met zuiverwitte bloemen, die een heerlijken geur verspreiden.

Clematis, in vele schoone soorten op naam p. st. f 0.70
Glycine sinensis. Blauwe regen, bek. klimpl. „ „ - 0.90
Hedera Helix. Gewone Klimop . . . „ „ - 0.35
Hedera hibernica. Grootbladerige Klimop „ „ - 0.40
Lonicera (Caprifolium,) in soorten . . . „ „ - 0.40
Vitis Labrusca . . . . „ „ - 0.50
Wingerd met zeer groote bladeren en lange bladsteelen, groote bloemen en zwartblauwe bessen.

F. VEEREN, HAAG- en BOSCHPLANTSOEN.

Onderstaande heesters, die het meest worden gebruikt tot het vormen van heggen, singels enz. munten uit door krachtig wortelgestel, waardoor ze zich zonder nadeel laten verplanten.

	Hoogte in centimeters.	Prijs per 100
Acer Pseudo-Platanus, *Eschdoorn*	150—200	f 5.—
Alnus glutonosa, *Els*	150—200	- 2.50
„ „ „	200—300	- 3.50
Carpinus Betulus, *Haagbeuk* . .		- 7.—
Crataegus Oxyacantha, *Haagdoorn*	50—60	- 1.—
„ „ „ zwaar	90—120	- 2.50
Fagus sylvatica, *Beuk*	100—150	- 5.—
„ „ „	150—200	- 9.—
„ „ „	200—250	- 12.—
Fraxinus excelcior, *Esch*	100—150	- 5.—
„ „ „	150—200	- 7.—
Ligustrum vulgare. *Liguster* . .	90—120	- 6.—
Quercus americana, *Amerik. Eik* .	150—200	- 8.50
„ **robur,** gewone „ .	150—200	- 3.50
„ „	200—300	- 5.—
Robinia Pseudacacia, *Acacia* . .	100—150	- 7.—
„ „	150—200	- 12.—
Sorbus Aucuparia, *Lijsterbes* . .	150—200	- 6.50
„ „ „ . .	200—300	- 10.—
Ulmus campestris, *Iep of Olm* .	150—200	- 8.—
„ „ „ „ „ .	200—250	- 12.—

G. Piramide en Opgaande Sierboomen, Laan en Woudboomen.

Geënte pyramide Heesters, naar gelang der zwaarte en soorten . . . . per stuk f 0.60 — f 1.—
Opgaande sierboomen, in verschillende afmetingen en veredelde soorten . . . . . „ „ - 1.00 — - 2.50
Treurboomen, in vele soorten . . . . „ „ - 1.00 — - 2.50
Bruine Beuken . . . . „ „ - 0.90 — - 1.50

DIVERSE HEESTERS en BOOMEN.

Acer dasycarpum, mooie boomen van 12—15 cM. omtrek . . . . per stuk f 0.40
Ailanthus glandulosa, Hemelboom, zware heesters . . . . „ „ - 0.25
Fraxinus excelsior, gewone Esch, 11—13 cM. . . . . „ „ - 0.45
Larix leptolepsis, prachtige nieuwe Japansche soort, zeer sterk groeiend en aanbevelenswaardig, 1.50 M. hoog . . . . „ „ - 0.25
Populus balsamea, Populier, 3—4 M. hoog . . . . „ „ - 0.30
„ **canadensis,** Canadapopulier, prachtige gave boomen, groote voorraad . . . „ „ - 0.20 — f 0.35
„ **digitata,** Italiaansche Populier, 10—12 cM. . . . . „ „ - 0.25
Salix britzliensis, Wilg met rood hout, 3 M. hoog . . . . „ „ - 0.20
„ **vitilina pendula,** Treurwilg, 3 M. hoog . . . . „ „ - 0.30
Ulmus hollandica, grootblad Iep, prachtige rechte stammen 10—18 cM. . . . . „ „ - 0.40 — - 0.70
„ „ Iepenveeren, prachtige qualiteit . . . . „ „ - 0.15

H. VRUCHTBOOMEN EN STRUIKEN.

De beste tijd voor het verplanten der vruchtboomen is van af half October tot begin December en van af begin of half Maart tot einde April. Vóór het planten moeten de wortels met een scherp mes een weinig worden ingekort en wel zoodanig dat het snijvlak naar onderen is gekeerd. Beschadigde of gebroken wortels worden tot en met de beschadigde plaats afgesneden. De gaten waarin de boomen moeten worden geplant, worden liefst eenigen tijd te voren gespit en moeten minstens 1 Meter in middellijn hebben. Nog beter is het om het geheele terrein diep om te werken. De wortels worden in de gaten in alle richtingen schuin naar onderen uitgespreid en dan het gat voor de helft met goede tuinaarde gevuld. Nu vulle men het gat met water en zoodra dit is weggezakt, wordt het verder met aarde gevuld en luchtig aangetreden. De pas geplante boomen worden in April gesnoeid. Het snoeien der fruitboomen is niet met een paar woorden mede te deelen en moet steeds door een deskundige geschieden. Vooral op koude, vochtige gronden is het aan te bevelen de vruchtboomen zeer hoog te planten, zoodat de boom als 't ware op een heuveltje komt te staan, terwijl het stevig aanbinden aan een stok of paal in geen geval mag worden verzuimd.

Wanneer vruchtboomen bij strenge vorst mochten aankomen mogen ze vooral niet direct worden uitgepakt. Men berge de pakken op een vorstvrije plaats in schuur of kelder en late ze eerst langzaam ontdooien.

N.B. Bij het bestellen van vruchtboomen kan het voorkomen dat de gevraagde soorten niet in de verlangde vormen voorhanden zijn. In dat geval zal ik zoo vrij zijn deze door de meest nabij komende soorten te vervangen. Het verdient aanbeveling altijd eenige soorten meer op te geven dan het aantal dat men bestelt.

APPELS,	**hoogstam Kroonboomen,** in de beste soorten	p. st.	f 1.25	à f 2.50
„	**pyramiden** „ „ „ „	„ „	- 1.—	„ - 1.50
PEREN,	**hoogstam Kroonboomen,** „ „ „ „	„ „	- 1.50	„ - 2.75
„	**pyramiden** „ „ „ „	„ „	- 1.—	„ - 1.50
KERSEN,	**hoogstam Kroonboomen,** „ „ „ „	„ „	- 1.—	„ - 1.75
PRUIMEN,	„ „ „ „ „ „	„ „	- 1.20	„ - 2.—
MOERBEZIËN,	„ „ „ „ „ „	„ „	- 5.—	
WALNOTEN,	„ „ „ „ „ „	„ „	- 2.—	„ - 2.50
KWEEPEREN,	**halfstam** „	„ „	- 1.—	„ - 1.50
MISPELS,	„ „	„ „	- 1.—	„ - 1.50
PERZIKEN,	**laagstam leiboomen,** in de beste soorten, ruim 2 M. vlucht	„ „	- 2.50	
ABRIKOZEN,	„ „ vroege en dubbele oranje „ 2 „ „	„ „	- 2.50	
MORELLEN,	„ „ zure	„ „	- 1.25	„ - 2.—

Vruchtstruiken en diverse Ooftgewassen.

Aalbes, witte van Bar -le Duc, *Nieuw,* krachtige jonge struiken . . . . p. st. f 0.75

Deze nieuwe variëteit groeit buitengewoon sterk en de vruchten bevatten nagenoeg geen pitjes, zoodat ze bizonder fijn zijn voor gelei. Zeer zeldzaam.

Aalbes, Hollandsche roode grootvruchtige
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.12

„ „ rose grootvruchtige
p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15

„ Fay's Prolific, nieuwe grootvruchtige
p. 10 st. f 1.75, p. st. f 0.20

„ zwarte **Goliath,** *Nieuw,* krachtig jonge struiken
p. st. f 0.30

De grootte der vruchten van deze nieuwe soort moet die van alle andere overtreffen.

Aalbes, Hollandsche zwarte, grootvruchtige
p. 10 st. f 0.90, p. st. f 0.10

„ Lee's Prolific, nieuwe grootvruchtige zwarte
p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.12



Aardbei-Framboos.

Aardbei-Framboos, . . p. 10 st. f 1.—, p. st. f 0.15

Eigenaardig gewas met prachtige vruchten. De smaak is eenigszins wrang.

Braam, Amerikaansche grootvruchtige
p. 10 st. f 2.75, p. st. f 0.30

Framboos, Cumberland . . . . . . p. st. f 0.50
„ Hornet, bekende uitmuntende soort
p. 100 st. f 4—, p. 10 st. f 0.50, p. st. f 0.10
„ Superlative, rijkdragend en geurig
p. 100 st. f 6.— p. 10 st. f 0.75, p. st. f 0.10
„ Surpr. d'automme, zeer laatdragende gele soort
p. 100 st. f 6.— p. 10 st. f 0.75, p. st. f 0.10

Hazelnoot, grootvruchtige p. 10 st. f 2.—, p. st. f 0.25



Kruisbessen, Whinham's Industry.

Kruisbes, Früheste von Nieuwied, *Nieuw,* krachtige jonge struiken . . . . p. st. f 0.40

Van alle grootvruchtige kruisbessen is deze zonder twijfel de vroegste. Zij rijpen reeds einde Juni. De kolossale vruchten zijn doorschijnend groen met een zeer dunne schil en de smaak is bizonder fijn en zoet.

Kruisbes, Triumph, *Nieuw,* krachtige jonge struiken
p. st. f 0.75

Nieuwe soort, die zeer sterk groeit met recht opstaande takken, die in één jaar dikwijls 1 M. lang worden. De groote vruchten zijn licht groen en zeer zoet; buitengewoon rijkdragend.

Kruisbes, Victoria, *Nieuw,* krachtige jonge planten
p. st. f 0.40

Deze nieuwe soort wordt vooral voor den aanplant in het groot zeer aanbevolen.

Zij bloeit laat, waardoor de bloemen niet zoo licht bevriezen en men ook in minder beschutte tuinen meer kans heeft op een goeden oogst. Ook is zij zeer rijkdragend, zoo zelfs, dat 3 jaar oude struiken ruim 25 pond vruchten droegen. De vruchten zijn zeer groot, donkerrood en heerlijk van smaak.

Kruisbes, grootvruchtige Engelsche witte
p. 10 st. f 1.20, p. st. f 0.15
„ Whinham's Industry, grootvruchtige roode
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20
„ grootvruchtige Engelsche soorten op naam
p. 10 st. f 1.50, p. st. f 0.20



Logan Bes.


Loganbes, . , ... p. st. f 0.60

Zeer geurige vruchten, het midden houdende tusschen braam en framboos.

Wijnbes, Japansche . . . . p. st. f 0.40

Geeft prachtige oranje-roode lekkere vruchten in September, als kleine frambozen.

DIVERSEN.



.*Aardappel, Kaiserkrone.*

POOTAARDAPPELEN.

N.B. *1 Hectoliter aardappelen wordt gerekend op 67 Kilo netto. Indien van eene soort geen zoogenaamde „poters” meer voorhanden zijn, zoo worden ook dikkere aardappelen verzonden. Deze kunnen echter gesneden worden; men zorge dat elk stuk 1 à 2 oogen heeft.*

Andijker of Streeker Muizen,
p. kilo f 0.10, p. 10 Kilo f 0.60, p. 100 kilo f 4.—

De allervroegste aardappel, die veel in het noorden van Noord-Holland wordt verbouwd en bij wagon- en scheepsladingen naar binnen en buitenland wordt verzonden. Het is een smakelijke langwerpig gele aardappel. In ’t voorjaar wanneer ze zijn uitgeloopen, geschiedt de verzending in kisten of manden om het beschadigen der kiemen te voorkomen.

Bravo, p. kilo f 0.10, p. 10 kilo 0.60, p. 100 kilo f 4.50

Deze nieuwe aardappel rijpt in Augustus, heeft een regelmatige vorm, en kan wegens de groote vruchtbaarheid en duurzaamheid ook voor den aanplant in het groot zeer worden aanbevolen.

Delicatess,
p. kilo f 0.15, p. 10 kilo f 1.—, p. 100 kilo f 6.—

Deze nieuwe soort, heeft bij eene proef in mijne kweekerij zeer goed voldaan. Ze heeft een schoone, langwerpige ronde vorm, een bleekroode kleur en is zeer goed van smaak. ’t Is een van de allervroegste soorten.

Eigenheimer,
p. kilo f 0.10, p. 10 kilo f 0.50, p. 100 kilo f 3.—

Deze nieuwe Hollandsche soort, kan een der beste voor de cultuur in ’t groot worden genoemd. Als de grond niet al te voedzaam is, is het een uimuntende tafelaardappel, zoowel op lichte als zware gronden. De knollen zijn ovaal en geel van kleur. Zij rijpt in Augustus.

Erfurter Goldkind,
p. kilo f 0.10, p. 10 kilo f 0.80, p. 100 kilo f 5.—

Deze prachtige nieuwe aardappel met haar schoonen regelmatigen vorm, gele schil en donkergeel vleesch rijpt begin September en behoudt zelfs op zware kleigronden haar heerlijke smaak. Ze is zeer vruchtbaar en is een uitnemende Herfst- en Winter-aardappel.

Eureka, p. kilo f 0.10, p. 10 kilo f 0.50, p. 100 kilo f 3.—

Mooie ronde aardappel die middelvroeg rijpt; haar vleesch is geel. Ze is zeer vruchtbaar, en goed van smaak.

Hallumer Gele,
p. kilo f 0.10, p. 10 kilo f 0.60, p. 100 kilo f 3.50

Late buitengewoon vruchtbare soort, die weinig vatbaar is voor aardappelziekte. Vooral op zandgrond is de kwaliteit uitmuntend.

Kaiserkrone,
p. kilo f 0.10, p. 10 kilo f 0.80, p. 100 kilo f 6.—

Vroege, rijkdragende soort met groote dikke aardappelen. Goed van smaak. (Zie afbeelding.)

Prima, p. kilo f 0.10, p. 10 kilo f 0.60, p. 100 kilo f 3.—

Deze prachtige aardappel kan niet genoeg worden aanbevolen. Ze rijpt laat, heeft een schoone ovaal-ronde vorm en is geel van kleur. De smaak is uitstekend en bovendien is ze buitengewoon vruchtbaar.

Sirdar, *Nieuw!* . . p. kilo f 0.15; p. 10 kilo f 1.—

Deze nieuwe soort werd in 1899 te Londen door de Royal Horticultural Society met een Certificaat van verdienste bekroond. Zij brengt een menigte regelmatige ovale knollen voorts van uitmuntende kwaliteit en slaagt in bijna elken grond.

Veenhuizer Witte Ruigen,
p. kilo f 0.10, p. 10 kilo f 0.50, p. 100 kilo f 3.—

De knollen dezer uitmuntende, zeer smakelijke soort zijn regelmatig rond en platrond, flink van stuk en wit, iets grauw van kleur.
Vooral op lichte gronden is dit een der allerbeste soorten. Zij rijpt midden September en geeft een hooge opbrengst.

Turfstrooisel.

Het gebruik van dit artikel in den landbouw zoowel als in den tuinbouw, is in de laatste jaren in sterke mate toegenomen. De grove kwaliteit wordt hoofdzakelijk gebruikt als strooisel in de stallen, waar het verre te verkiezen is boven stroo, daar het vee een drogere ligging heeft en de ammoniak der mest beter wordt gebonden.

Het fijne turfstrooisel komt in elken tuin van pas. Behalve dat het een uitmuntend strooisel is in kippenhokken, kan het met succes worden aangewend tot bedekking van perken met rozen, bloembollen enz., gedurende den winter; voorts in broeibakken en serres om er de potten in te plaatsen, voor het vermengen van grond op kleigrond, daar waar perken met Rhododendron, Coniferen enz. moeten worden aangelegd, voor vermenging van bakaarde, verder om er gedurende den winter Knol-Begonia's, Lelies enz. in te bewaren, en voor vele andere doeleinden.

Het wordt geleverd in geperste balen of pakken, wegende omstreeks 130 kilo.

Prijs per Correspondentie.

Proefbalen . . . . fijn f 2.25; grof f 2.—

Bloemenmest.

Het gebruik van **geconcentreerde kunstmest** of **bloemenmest** is in de laatste jaren verbazend toegenomen tengevolge van de prachtige resultaten die men heeft verkregen bij de behandeling van bloemen, gazons enz. Op de meest verschillende planten, als: Pelargonium's, Fuchsia's, Chrysanthemums, Primula's, Cineraria's, Begonia's, Rozen, Palmen, Azalea's enz. zijn proeven genomen, en het succes was verrassend. De bladeren worden forscher, de bloemen veel grooter, welriekender en talrijker.

Voor potplanten strooie men om de 4 à 5 weken een eierlepeltje vol op elken pot en verdeele de meststof zoo gelijkmatig mogelijk over de geheele oppervlakte, behalve bij Cyclamen, waar men ze op het schoteltje doet met wat water. Daar dezelve ook bestanddeelen bevat, die niet in water oplosbaar zijn, moet men dezen bloemenmest *niet* in een gieter doen.

Voor bloemen in den vollen grond strooit men voorzichtig tusschen de planten op de aarde, ongeveer $^1/_{10}$ kilo (één ons) per vierkanten meter, en herhaalt dit na 14 dagen nog eens. Ook kan men de mest vóór het beplanten uitstrooien en onderspitten.

Voor grasperken strooit men in Maart $^1/_{10}$ kilo (één ons) per vierkanten meter over het gras, waardoor het een schoone donkergroene kleur zal verkrijgen.

Het verdient aanbeveling de bloemenmest vóór het gebruik met wat fijne aarde te vermengen.

Bij het oppotten van planten is het zeer aan te raden den grond met bloemenmest te vermengen. Men neme 1 kilo op 1 hectoliter grond.

De bloemenmest is een reukeloos poeder, dat men, mits op een droge plaats, zeer lang bewaren kan.

Prijzen: per kilo f 0.40; bij minstens 5 kilo tegelijk f 0.30 per kilo.

RAFFIA-BINDBAST,

in gebreide strengen, 1e kwaliteit, lang en blank,

per kilo f 0,70.

Voor het aanbinden van bloemen enz., is dit het meest geschikte materiaal.

ADMIRAAL's KANKERWAS.

Radicaal geneesmiddel tegen kankerziekte in de vruchtboomen, op vele tentoonstellingen met de hoogste prijzen bekroond.

Per bus met gebruiksaanwijzing f 0.75.

ADMIRAAL's BLOEDLUISMIDDEL.

Beproefd middel tegen dezen voor den appelboom zoo gevaarlijken vijand.

Per bus met gebruiksaanwijzing f 1.—.

ENTWAS om koud te gebruiken.

Deze is zeer gemakkelijk te gebruiken en steeds voor het gebruik gereed.

Per bus f 0.60.

ENTWAS om warm te gebruiken.

Per 5 ons f 0.30.

ENGELSCHE SNOEIMESSEN, enz.

uit de beroemde fabriek van **Saynor.**

Deze zijn duurder dan de Duitsche, doch meestal ook duurzamer. Bovendien is de snede recht en niet gebogen zooals de Duitsche.

Snoeimes, 1e grootte, zwaar . . . . f 2.25
„ 2e „ iets kleiner, tevens geschikt voor entmes . . . . - 2.—
Oculeermes, met wit beenen heft . . . . . - 2.—
Rozenplukschaar, zeer doelmatig, daar zij de roos of bloem vasthoudt . . . . - 1.90

SNOEIMESSEN, enz.

uit de beroemde fabriek van KUNDE & SOHN.

No. 1. Zwart Gummi heft, lengte van het heft 10 cM. f 1.20
„ 2. „ „ „ „ „ „ „ 11 „ - 1.45
„ 3. „ „ „ „ „ „ „ 12 „ - 1.70
„ 4. Bruin houten „ „ „ „ „ 10 „ - 1.45
„ 5. „ „ „ „ „ „ „ 11 „ - 1.75
„ 6. „ „ „ „ „ „ „ 12 „ - 2.10
„ 7. **Oculeermessen,** nieuw model, voor rozen - 1.20
„ 8. „ „ „ „ boomen - 1.20
„ 9. **Entmessen,** voor vruchtboomen . . . . - 1.20

Snoeischaren, in diverse kwaliteiten,

vanaf f 1.80 tot f 4.80 p. stuk.

STEEK-ETIQUETTEN.

met olieverf geel geschilderd.

No.	lengte	breedte	p. 100 st.
No. 1	lengte 35 cM.,	breedte 3.5 cM.,	p. 100 st. f 1.45
„ 2	„ 25 „	„ 3.0 „	„ „ „ - 0.80
„ 3	„ 20 „	„ 3.0 „	„ „ „ - 0.60
„ 4	„ 16 „	„ 2.0 „	„ „ „ - 0.35
„ 5	„ 12 „	„ 2.0 „	„ „ „ - 0.30
„ 6	„ 10 „	„ 1.5 „	„ „ „ - 0.25

HANG-ETIQUETTEN,

met olieverf geel geschilderd en voorzien van gegalvaniseerd draad.

No.		lengte		breedte		p.		
No. 1	lengte	10 cM.,	breedte	3.0 cM.,	p.	100 st.	f	0.50
„ 2	„	8 „	„	3.0 „	„	„ „	-	0.45
„ 3	„	10 „	„	2.0 „	„	„ „	-	0.45

SNOEITEENEN.

Echte Fransche gele voor het aanbinden van vruchtboomen, enz. onmisbaar.

Prijs per schijf van ± 10 kilo . . . . f 0.70
(Minder dan 1 Schijf wordt niet geleverd.)

KURKSCHORS.

Voor het bekleeden van oude muren, wanden van serres enz. en waartusschen met succes varentjes enz. kunnen worden gekweekt.

Per kilo f 0.35, per 10 kilo f 3.—

TONKING TUINSTOKKEN.

Van Bamboes om bij Dahlia's, Stamrozen, enz. te plaatsen. Deze zijn zeer sterk en duurzaam; lengte ± 1.80 M.

Prijs per stuk f 0.05, per 100 f 4.—

Nederlandsche Tuinbouwalmanak voor 1902.

SAMENGESTELD DOOR

De H.H. Dr. J. Th. CATTIE, B. A. PLEMPER VAN BALEN en C. H. CLAASSEN.

Deze almanak, waarvan de vierde jaargang verschenen is, kan ik allen liefhebbers van den tuinbouw met warmte aanbevelen. Behalve voldoende ruimte voor aanteekeningen voor iederen dag vindt men daarin vele nuttige wenken, die voor elk liefhebber en vakman van dienst kunnen zijn, zooals maandkalender van werkzaamheden in tuin en boomgaard, levensduur der zaden bemesting, enz. enz. benevens allerlei tarieven van post, telegraaf, enz. Deze almanak is gebonden in zeer handig zakformaat en verkrijgbaar tegen den zelfden prijs als bij den uitgever.

Prijs . . f 0.75

KAMERPLANTEN

DOOR

J. K. BUDDE,

HORTULANUS TE UTRECHT.

Dit zooeven verschenen boek kan ik alle bloemenliefhebbers ten zeerste aanbevelen, daar het in een lang gevoelde behoefte voorziet. Het geeft een keur van de beste planten voor de kamer met de kweekwijze en is geschreven op den aan den schrijver eigen gezelligen toon.
Zeer geschikt voor cadeau.

Prijs . . f 1.25.

Het hierbij gevoegde prospectus over den Gartenbau Lexicon, kan ik zeer ter lezing aanbevelen. Gaarne wordt een proefaflevering van het onlangs verschenen standaardwerk ter inzage gezonden. Het is tegen den kostenden prijs bij mij verkrijgbaar.

Aanleg van Tuinen, Buitenplaatsen, enz.

Wenscht men hierbij, of bij veranderingen in bestaande aanlagen, mijn advies in te winnen, zoo ben ik hiertoe steeds gaarne bereid, en wordt daarvoor geen salaris, *doch alleen de verschotten als reiskosten enz. in rekening gebracht. Bij eventueele opdracht van een werk geschiedt het maken van planteekening eveneens gratis.*

☞ Tot mijn spijt moet in deze uitgaaf het gewone alfabetische register achterwege blijven, wegens de uitbreiding die dezen Catalogus weer heeft ondergaan bij het vorige jaar en ik anders het porto met 2½ cent voor elk ex. had moeten verhoogen. Daar alles in verschillende rubrieken is verdeeld, zal het niemand moeilijk vallen, om te vinden wat men wenscht.



LITH. LA RIVIÈRE & VOORHOEVE-ZWOLLE.